

Prestazioni Specialistiche di cui al PRGLA 2019-21 per zona presidio, priorità di accesso, % di garanzia entro i tempi previsti e giorni di attesa. Periodo di riferimento DICEMBRE 2020

101 - della Lunigiana

| Prestazioni diagnostica | Priorità | N Prestazioni | % Garanzia tempi attesa I disponibilità | Giorni di attesa I disp |
|--|---------------|---------------|---|-------------------------|
| TC delTorace | B | 11 | 100,0% | 3 |
| | D | 9 | 100,0% | 9 |
| | P | 6 | 100,0% | 4 |
| | 0 | 16 | 100,0% | 9 |
| | Totale | 42 | 100,0% | 7 |
| TC delTorace senza e con MDC | B | 20 | 90,0% | 5 |
| | D | 9 | 100,0% | 6 |
| | P | 1 | 100,0% | 2 |
| | 0 | 1 | 100,0% | 1 |
| | Totale | 31 | 93,5% | 5 |
| TC dell Addome superiore senza e con MDC | B | 2 | 100,0% | 5 |
| | D | 1 | 100,0% | 2 |
| | Totale | 3 | 100,0% | 4 |
| TC dell Addome inferiore | B | 1 | 100,0% | 7 |
| | Totale | 1 | 100,0% | 7 |
| TC dell Addome completo | B | 1 | 100,0% | 6 |
| | D | 2 | 100,0% | 4 |
| | 0 | 3 | 100,0% | 2 |
| | Totale | 6 | 100,0% | 3 |
| TC dell Addome completo senza e con MDC | B | 26 | 96,2% | 5 |
| | D | 13 | 100,0% | 6 |
| | 0 | 3 | 100,0% | 1 |
| | Totale | 42 | 97,6% | 5 |
| TC del Capo | U | 1 | 100,0% | 1 |
| | B | 17 | 100,0% | 1 |
| | D | 11 | 100,0% | 1 |
| | P | 1 | 100,0% | 7 |
| | 0 | 2 | 100,0% | 1 |
| | Totale | 32 | 100,0% | 2 |
| TC del Capo senza e con MDC | B | 3 | 66,7% | 8 |
| | D | 3 | 100,0% | 7 |
| | P | 1 | 100,0% | 2 |
| | Totale | 7 | 85,7% | 7 |
| | B | 7 | 100,0% | 4 |

| | | | | |
|---|--------|-----|--------|----|
| TC del Rachide e dello speco vertebrale | D | 11 | 100,0% | 4 |
| | P | 2 | 100,0% | 1 |
| | 0 | 1 | 100,0% | 3 |
| | Totale | 21 | 100,0% | 4 |
| TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC | D | 1 | 100,0% | 3 |
| | P | 1 | 100,0% | 0 |
| | Totale | 2 | 100,0% | 2 |
| TC di Bacino e articolazioni sacroiliache | B | 2 | 100,0% | 4 |
| | Totale | 2 | 100,0% | 4 |
| RM dell Encefalo e del tronco encefalico | B | 2 | 100,0% | 9 |
| | D | 10 | 100,0% | 30 |
| | 0 | 1 | 100,0% | 7 |
| | Totale | 13 | 100,0% | 25 |
| RM di addome inferiore e scavo pelvico | B | 1 | | 25 |
| | D | 1 | 100,0% | 13 |
| | 0 | 1 | 100,0% | 7 |
| | Totale | 3 | 66,7% | 15 |
| RM della Colonna | B | 16 | 50,0% | 13 |
| | D | 42 | 100,0% | 20 |
| | P | 3 | 100,0% | 12 |
| | 0 | 10 | 100,0% | 8 |
| | Totale | 71 | 88,7% | 16 |
| RM Muscoloscheletrica | B | 39 | 97,4% | 4 |
| | D | 45 | 100,0% | 8 |
| | P | 8 | 100,0% | 6 |
| | 0 | 13 | 100,0% | 6 |
| | Totale | 105 | 99,0% | 6 |
| Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici | B | 5 | 100,0% | 2 |
| | D | 26 | 100,0% | 4 |
| | P | 6 | 100,0% | 16 |
| | 0 | 9 | 100,0% | 4 |
| | Totale | 46 | 100,0% | 5 |
| Diagnostica ecografica del Capo e del collo | B | 8 | 100,0% | 1 |
| | D | 28 | 100,0% | 1 |
| | P | 3 | 66,7% | 61 |
| | 0 | 14 | 85,7% | 18 |
| | Totale | 53 | 94,3% | 9 |
| Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo) | B | 48 | 100,0% | 3 |
| | D | 84 | 100,0% | 5 |
| | P | 10 | 100,0% | 9 |
| | 0 | 26 | 96,2% | 10 |
| | Totale | 168 | 99,4% | 5 |

| | | | | |
|--|--------|-----|--------|----|
| Ecografia Ostetrica | P | 39 | 100,0% | 5 |
| | Totale | 39 | 100,0% | 5 |
| Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa | B | 13 | 100,0% | 2 |
| | D | 13 | 100,0% | 2 |
| | P | 4 | 100,0% | 5 |
| | 0 | 5 | 100,0% | 6 |
| | Totale | 35 | 100,0% | 3 |
| Colonscopia | B | 1 | 100,0% | 7 |
| | D | 12 | 100,0% | 7 |
| | P | 4 | 100,0% | 4 |
| | 0 | 6 | 50,0% | 42 |
| | Totale | 23 | 87,0% | 16 |
| Esofago-gastroduodenoscopia | B | 5 | 100,0% | 4 |
| | D | 14 | 100,0% | 4 |
| | P | 2 | 100,0% | 3 |
| | Totale | 21 | 100,0% | 4 |
| Elettrocardiogramma | U | 1 | 100,0% | 0 |
| | B | 13 | 100,0% | 0 |
| | D | 31 | 100,0% | 0 |
| | P | 13 | 100,0% | 0 |
| | 0 | 14 | 100,0% | 0 |
| | Totale | 72 | 100,0% | 0 |
| Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | D | 5 | 20,0% | 35 |
| | 0 | 3 | 33,3% | 33 |
| | Totale | 8 | 25,0% | 35 |
| Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro | B | 1 | | 11 |
| | D | 5 | 80,0% | 27 |
| | P | 2 | 100,0% | 8 |
| | 0 | 3 | 66,7% | 41 |
| | Totale | 11 | 72,7% | 26 |
| Esame audiometrico tonale | B | 1 | 100,0% | 1 |
| | D | 9 | 100,0% | 6 |
| | P | 1 | 100,0% | 0 |
| | 0 | 10 | 100,0% | 23 |
| | Totale | 21 | 100,0% | 13 |
| Esame del fundus oculi | D | 5 | 100,0% | 1 |
| | P | 4 | 100,0% | 10 |
| | 0 | 5 | 80,0% | 9 |
| | Totale | 14 | 92,9% | 7 |
| Totale | | 892 | 96,5% | |

| Prestazioni diagnostica | Priorità | N Prestazioni | % Garanzia tempi attesa I disponibilità | Giorni di attesa I disp |
|--|---------------|---------------|---|-------------------------|
| Mammografia bilaterale | U | 1 | 100,0% | 1 |
| | B | 9 | 100,0% | 3 |
| | Totale | 10 | 100,0% | 3 |
| TC delTorace | B | 11 | 100,0% | 4 |
| | D | 5 | 100,0% | 6 |
| | Totale | 16 | 100,0% | 5 |
| TC delTorace senza e con MDC | B | 19 | 94,7% | 5 |
| | D | 8 | 100,0% | 9 |
| | Totale | 27 | 96,3% | 6 |
| TC dell Addome completo | B | 5 | 100,0% | 2 |
| | D | 3 | 100,0% | 4 |
| | Totale | 8 | 100,0% | 2 |
| TC dell Addome completo senza e con MDC | B | 31 | 93,5% | 5 |
| | D | 7 | 100,0% | 7 |
| | 0 | 2 | 100,0% | 8 |
| | Totale | 40 | 95,0% | 5 |
| TC del Capo | U | 1 | 100,0% | 1 |
| | B | 11 | 100,0% | 2 |
| | D | 2 | 100,0% | 1 |
| | Totale | 14 | 100,0% | 2 |
| TC del Capo senza e con MDC | B | 7 | 100,0% | 5 |
| | D | 2 | 100,0% | 7 |
| | Totale | 9 | 100,0% | 5 |
| TC del Rachide e dello speco vertebrale | B | 4 | 100,0% | 5 |
| | D | 3 | 100,0% | 7 |
| | Totale | 7 | 100,0% | 6 |
| TC di Bacino e articolazioni sacroiliache | P | 1 | 100,0% | 1 |
| | Totale | 1 | 100,0% | 1 |
| RM dell Encefalo e del tronco encefalico | B | 4 | 100,0% | 8 |
| | D | 4 | 100,0% | 28 |
| | 0 | 2 | 100,0% | 5 |
| | Totale | 10 | 100,0% | 15 |
| RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC | B | 11 | 72,7% | 15 |
| | D | 22 | 100,0% | 29 |
| | P | 3 | 100,0% | 28 |
| | Totale | 36 | 91,7% | 24 |
| RM di addome inferiore e scavo pelvico | B | 1 | 100,0% | 9 |
| | Totale | 1 | 100,0% | 9 |
| | B | 5 | 80,0% | 15 |

| | | | | |
|--|--------|-----|--------|----|
| RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC | D | 7 | 100,0% | 32 |
| | Totale | 12 | 91,7% | 25 |
| | | | | |
| RM della Colonna | B | 9 | 100,0% | 6 |
| | D | 15 | 100,0% | 18 |
| | Totale | 24 | 100,0% | 13 |
| RM della Colonna senza e con MDC | B | 6 | 83,3% | 14 |
| | D | 5 | 100,0% | 38 |
| | Totale | 11 | 90,9% | 25 |
| RM Muscoloscheletrica | B | 2 | 100,0% | 9 |
| | D | 4 | 100,0% | 24 |
| | Totale | 6 | 100,0% | 19 |
| RM Muscoloscheletrica senza e con MDC | B | 3 | 100,0% | 9 |
| | D | 3 | 100,0% | 38 |
| | Totale | 6 | 100,0% | 23 |
| Eco(color)dopplergrafia cardiaca | B | 6 | 66,7% | 17 |
| | D | 15 | 73,3% | 14 |
| | P | 1 | 100,0% | 52 |
| | 0 | 5 | 40,0% | 76 |
| | Totale | 27 | 66,7% | 28 |
| Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici | B | 22 | 100,0% | 2 |
| | D | 79 | 100,0% | 4 |
| | P | 20 | 100,0% | 8 |
| | 0 | 32 | 93,8% | 16 |
| | Totale | 153 | 98,7% | 7 |
| Diagnostica ecografica del Capo e del collo | B | 8 | 100,0% | 2 |
| | D | 37 | 100,0% | 1 |
| | 0 | 3 | 100,0% | 1 |
| | Totale | 48 | 100,0% | 1 |
| Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo) | B | 29 | 100,0% | 6 |
| | D | 77 | 98,7% | 7 |
| | 0 | 3 | 66,7% | 16 |
| | Totale | 109 | 98,2% | 7 |
| Ecografia della Mammella bilaterale | U | 3 | 100,0% | 2 |
| | B | 26 | 100,0% | 4 |
| | D | 46 | 97,8% | 13 |
| | P | 12 | 91,7% | 35 |
| | 0 | 22 | 95,5% | 21 |
| | Totale | 109 | 97,2% | 15 |
| Ecografia della Mammella monolaterale | D | 1 | 100,0% | 5 |
| | 0 | 1 | 100,0% | 7 |
| | Totale | 2 | 100,0% | 6 |
| | D | 36 | 100,0% | 7 |

| | | | | |
|--|--------|-----|--------|-----|
| Ecografia Ostetrica | P | 114 | 100,0% | 8 |
| | Totale | 150 | 100,0% | 8 |
| Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa | B | 45 | 100,0% | 2 |
| | D | 73 | 97,3% | 7 |
| | P | 18 | 100,0% | 7 |
| | 0 | 26 | 92,3% | 10 |
| | Totale | 162 | 97,5% | 6 |
| Colonscopia | B | 26 | 100,0% | 4 |
| | D | 52 | 100,0% | 4 |
| | P | 4 | 50,0% | 166 |
| | 0 | 25 | 92,0% | 30 |
| | Totale | 107 | 96,3% | 17 |
| Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile | D | 1 | 100,0% | 5 |
| | 0 | 1 | 100,0% | 4 |
| | Totale | 2 | 100,0% | 5 |
| Esofago-gastroduodenoscopia | B | 29 | 100,0% | 3 |
| | D | 58 | 100,0% | 3 |
| | P | 4 | 75,0% | 114 |
| | 0 | 11 | 90,9% | 25 |
| | Totale | 102 | 98,0% | 10 |
| Elettrocardiogramma | B | 126 | 100,0% | 1 |
| | D | 245 | 100,0% | 1 |
| | P | 44 | 100,0% | 3 |
| | 0 | 148 | 98,6% | 2 |
| | Totale | 563 | 99,6% | 1 |
| Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | B | 29 | 93,1% | 5 |
| | D | 47 | 38,3% | 29 |
| | P | 20 | 100,0% | 32 |
| | 0 | 20 | 15,0% | 34 |
| | Totale | 116 | 58,6% | 24 |
| Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro | U | 1 | 100,0% | 1 |
| | B | 13 | 92,3% | 5 |
| | D | 21 | 100,0% | 6 |
| | P | 6 | 100,0% | 9 |
| | 0 | 7 | 100,0% | 7 |
| | Totale | 48 | 97,9% | 6 |
| Esame audiometrico tonale | B | 3 | 100,0% | 2 |
| | D | 36 | 100,0% | 7 |
| | P | 3 | 100,0% | 32 |
| | 0 | 45 | 100,0% | 20 |
| | Totale | 87 | 100,0% | 15 |
| | B | 4 | 100,0% | 3 |
| | D | 29 | 96,6% | 7 |

| | | | | |
|------------------------|---------------|-------------|--------------|----------|
| Esame del fundus oculi | P | 12 | 100,0% | 9 |
| | 0 | 43 | 95,3% | 7 |
| | Totale | 88 | 96,6% | 7 |
| Totale | | 2111 | 95,8% | |

102 - della Piana di Lucca

| Prestazioni diagnostica | Priorità | N Prestazioni | % Garanzia tempi attesa I disponibilità | Giorni di attesa I disp |
|--|---------------|---------------|---|-------------------------|
| Mammografia bilaterale | B | 14 | 100,0% | 5 |
| | D | 65 | 100,0% | 15 |
| | P | 25 | 52,0% | 189 |
| | 0 | 137 | 69,3% | 126 |
| | Totale | 241 | 77,6% | 96 |
| Mammografia monolaterale | D | 1 | 100,0% | 10 |
| | P | 1 | 100,0% | 10 |
| | 0 | 8 | 100,0% | 15 |
| | Totale | 10 | 100,0% | 14 |
| TC delTorace | B | 28 | 100,0% | 4 |
| | D | 56 | 100,0% | 3 |
| | P | 20 | 100,0% | 4 |
| | 0 | 45 | 100,0% | 3 |
| | Totale | 149 | 100,0% | 3 |
| TC delTorace senza e con MDC | U | 1 | 100,0% | 1 |
| | B | 29 | 100,0% | 5 |
| | D | 50 | 100,0% | 19 |
| | P | 7 | 100,0% | 8 |
| | 0 | 58 | 100,0% | 14 |
| | Totale | 145 | 100,0% | 14 |
| TC dell Addome superiore | D | 2 | 100,0% | 0 |
| | P | 1 | 100,0% | 2 |
| | Totale | 3 | 100,0% | 1 |
| TC dell Addome superiore senza e con MDC | B | 2 | 100,0% | 8 |
| | 0 | 7 | 100,0% | 18 |
| | Totale | 9 | 100,0% | 16 |
| TC dell Addome inferiore | B | 2 | 100,0% | 5 |
| | D | 1 | 100,0% | 1 |
| | Totale | 3 | 100,0% | 4 |
| TC dell Addome inferiore senza e con MDC | B | 1 | 100,0% | 9 |
| | D | 1 | 100,0% | 23 |
| | 0 | 4 | 100,0% | 23 |
| | Totale | 6 | 100,0% | 21 |

| | | | | |
|--|--------|-----|--------|----|
| TC dell Addome completo | B | 7 | 100,0% | 2 |
| | D | 9 | 100,0% | 6 |
| | 0 | 12 | 100,0% | 7 |
| | Totale | 28 | 100,0% | 5 |
| TC dell Addome completo senza e con MDC | B | 39 | 97,4% | 6 |
| | D | 54 | 100,0% | 19 |
| | P | 4 | 100,0% | 6 |
| | 0 | 56 | 100,0% | 15 |
| | Totale | 153 | 99,3% | 14 |
| TC del Capo | U | 2 | 100,0% | 1 |
| | B | 28 | 96,4% | 4 |
| | D | 45 | 100,0% | 2 |
| | P | 7 | 100,0% | 2 |
| | 0 | 30 | 100,0% | 3 |
| | Totale | 112 | 99,1% | 3 |
| TC del Capo senza e con MDC | B | 1 | 100,0% | 9 |
| | D | 17 | 100,0% | 14 |
| | 0 | 13 | 100,0% | 13 |
| | Totale | 31 | 100,0% | 14 |
| TC del Rachide e dello speco vertebrale | U | 2 | 100,0% | 1 |
| | B | 16 | 100,0% | 2 |
| | D | 20 | 100,0% | 3 |
| | P | 10 | 100,0% | 4 |
| | 0 | 15 | 100,0% | 5 |
| | Totale | 63 | 100,0% | 3 |
| TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC | 0 | 1 | 100,0% | 15 |
| | Totale | 1 | 100,0% | 15 |
| TC di Bacino e articolazioni sacroiliache | B | 1 | 100,0% | 7 |
| | P | 1 | 100,0% | 1 |
| | 0 | 1 | 100,0% | 0 |
| | Totale | 3 | 100,0% | 3 |
| RM dell Encefalo e del tronco encefalico | B | 19 | 89,5% | 5 |
| | D | 63 | 100,0% | 4 |
| | P | 15 | 100,0% | 4 |
| | 0 | 43 | 100,0% | 4 |
| | Totale | 140 | 98,6% | 4 |
| RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC | B | 38 | 97,4% | 5 |
| | D | 37 | 100,0% | 17 |
| | P | 10 | 60,0% | 61 |
| | 0 | 73 | 67,1% | 58 |
| | Totale | 158 | 81,6% | 36 |
| RM di addome inferiore e scavo pelvico | D | 1 | 100,0% | 2 |
| | 0 | 3 | 100,0% | 22 |

| | | | | |
|---|---------------|------------|---------------|-----------|
| | Totale | 4 | 100,0% | 17 |
| RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC | B | 2 | 100,0% | 6 |
| | D | 2 | 100,0% | 26 |
| | P | 1 | 100,0% | 5 |
| | 0 | 6 | 100,0% | 9 |
| | Totale | 11 | 100,0% | 11 |
| RM della Colonna | B | 100 | 97,0% | 4 |
| | D | 243 | 100,0% | 6 |
| | P | 59 | 96,6% | 11 |
| | 0 | 133 | 98,5% | 7 |
| | Totale | 535 | 98,7% | 6 |
| RM della Colonna senza e con MDC | B | 6 | 83,3% | 7 |
| | D | 5 | 100,0% | 8 |
| | P | 2 | | 152 |
| | 0 | 39 | 51,3% | 76 |
| | Totale | 52 | 57,7% | 64 |
| RM Muscoloscheletrica | B | 58 | 94,8% | 5 |
| | D | 199 | 100,0% | 11 |
| | P | 28 | 96,4% | 9 |
| | 0 | 114 | 97,4% | 13 |
| | Totale | 399 | 98,2% | 10 |
| RM Muscoloscheletrica senza e con MDC | B | 3 | 100,0% | 1 |
| | D | 6 | 100,0% | 16 |
| | P | 1 | 100,0% | 5 |
| | 0 | 7 | 100,0% | 5 |
| | Totale | 17 | 100,0% | 8 |
| Eco(color)dopplergrafia cardiaca | B | 1 | 100,0% | 4 |
| | D | 1 | 100,0% | 1 |
| | P | 2 | 50,0% | 74 |
| | 0 | 1 | 100,0% | 0 |
| | Totale | 5 | 80,0% | 30 |
| Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici | B | 24 | 100,0% | 1 |
| | D | 237 | 100,0% | 2 |
| | P | 58 | 100,0% | 2 |
| | 0 | 125 | 100,0% | 2 |
| | Totale | 444 | 100,0% | 2 |
| Diagnostica ecografica del Capo e del collo | B | 21 | 100,0% | 3 |
| | D | 134 | 99,3% | 4 |
| | P | 26 | 100,0% | 3 |
| | 0 | 215 | 96,7% | 25 |
| | Totale | 396 | 98,0% | 15 |
| | U | 2 | 100,0% | 2 |
| | B | 108 | 87,0% | 6 |

| | | | | |
|--|--------|-----|--------|-----|
| Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo) | D | 300 | 99,0% | 4 |
| | P | 57 | 86,0% | 51 |
| | 0 | 305 | 95,1% | 19 |
| | Totale | 772 | 94,8% | 14 |
| Ecografia della Mammella bilaterale | B | 15 | 100,0% | 3 |
| | D | 99 | 100,0% | 5 |
| | P | 16 | 75,0% | 66 |
| | 0 | 119 | 91,6% | 13 |
| | Totale | 249 | 94,4% | 13 |
| Ecografia della Mammella monolaterale | B | 2 | 100,0% | 3 |
| | D | 3 | 100,0% | 4 |
| | P | 5 | 100,0% | 4 |
| | 0 | 1 | 100,0% | 7 |
| | Totale | 11 | 100,0% | 4 |
| Ecografia Ostetrica | B | 1 | 100,0% | 1 |
| | P | 72 | 88,9% | 46 |
| | 0 | 38 | 92,1% | 13 |
| | Totale | 111 | 90,1% | 34 |
| Ecografia Ginecologica | 0 | 4 | 100,0% | 15 |
| | Totale | 4 | 100,0% | 15 |
| Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa | U | 1 | 100,0% | 0 |
| | B | 44 | 97,7% | 2 |
| | D | 101 | 100,0% | 3 |
| | P | 27 | 100,0% | 2 |
| | 0 | 109 | 100,0% | 3 |
| | Totale | 282 | 99,6% | 3 |
| Colonscopia | B | 15 | 100,0% | 4 |
| | D | 80 | 100,0% | 16 |
| | P | 9 | 88,9% | 25 |
| | 0 | 42 | 95,2% | 20 |
| | Totale | 146 | 97,9% | 16 |
| Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile | D | 2 | 100,0% | 25 |
| | Totale | 2 | 100,0% | 25 |
| Esofago-gastroduodenoscopia | B | 12 | 91,7% | 6 |
| | D | 40 | 100,0% | 23 |
| | P | 6 | 50,0% | 170 |
| | 0 | 23 | 78,3% | 54 |
| | Totale | 81 | 88,9% | 40 |
| Elettrocardiogramma | B | 98 | 100,0% | 1 |
| | D | 212 | 100,0% | 2 |
| | P | 49 | 98,0% | 4 |
| | 0 | 193 | 100,0% | 1 |
| | Totale | 552 | 99,8% | 2 |

| | | | | |
|---|--------|------|--------|----|
| Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | B | 21 | 100,0% | 3 |
| | D | 30 | 93,3% | 8 |
| | P | 10 | 100,0% | 3 |
| | 0 | 28 | 96,4% | 7 |
| | Totale | 89 | 96,6% | 6 |
| Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro | B | 6 | 100,0% | 5 |
| | D | 31 | 74,2% | 43 |
| | P | 2 | 100,0% | 44 |
| | 0 | 17 | 76,5% | 40 |
| | Totale | 56 | 78,6% | 38 |
| Esame audiometrico tonale | B | 1 | 100,0% | 3 |
| | D | 4 | 100,0% | 7 |
| | P | 52 | 100,0% | 1 |
| | 0 | 17 | 100,0% | 3 |
| | Totale | 74 | 100,0% | 2 |
| Spirometria semplice | 0 | 5 | 100,0% | 16 |
| | Totale | 5 | 100,0% | 16 |
| Spirometria globale | B | 9 | 100,0% | 4 |
| | D | 45 | 95,6% | 26 |
| | P | 8 | 75,0% | 87 |
| | 0 | 36 | 91,7% | 40 |
| | Totale | 98 | 92,9% | 34 |
| Esame del fundus oculi | D | 1 | | 33 |
| | P | 26 | 100,0% | 15 |
| | 0 | 4 | | 40 |
| | Totale | 31 | 83,9% | 19 |
| Elettromiografia semplice | B | 36 | 88,9% | 10 |
| | D | 76 | 100,0% | 23 |
| | 0 | 40 | 100,0% | 18 |
| | Totale | 152 | 97,4% | 19 |
| Totale | | 5833 | 95,9% | |

102 - della Valle del Serchio

| Prestazioni diagnostica | Priorità | N Prestazioni | % Garanzia tempi attesa I disponibilità | Giorni di attesa I disp |
|--------------------------|----------|---------------|---|-------------------------|
| Mammografia bilaterale | P | 5 | 100,0% | 25 |
| | 0 | 2 | 100,0% | 25 |
| | Totale | 7 | 100,0% | 25 |
| Mammografia monolaterale | P | 3 | 100,0% | 25 |
| | 0 | 1 | 100,0% | 25 |

| | | | | |
|--|--------|----|--------|-----|
| | Totale | 4 | 100,0% | 25 |
| TC delTorace | D | 2 | 100,0% | 19 |
| | 0 | 3 | 66,7% | 51 |
| | Totale | 5 | 80,0% | 38 |
| TC delTorace senza e con MDC | 0 | 3 | 100,0% | 9 |
| | Totale | 3 | 100,0% | 9 |
| TC dell Addome completo senza e con MDC | D | 1 | 100,0% | 16 |
| | Totale | 1 | 100,0% | 16 |
| TC del Capo | D | 7 | 100,0% | 3 |
| | P | 1 | 100,0% | 5 |
| | 0 | 1 | 100,0% | 2 |
| | Totale | 9 | 100,0% | 3 |
| TC del Rachide e dello speco vertebrale | D | 1 | 100,0% | 1 |
| | Totale | 1 | 100,0% | 1 |
| Eco(color)dopplergrafia cardiaca | D | 1 | 100,0% | 7 |
| | Totale | 1 | 100,0% | 7 |
| Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici | B | 1 | 100,0% | 0 |
| | D | 8 | 100,0% | 2 |
| | P | 2 | 100,0% | 2 |
| | 0 | 14 | 100,0% | 1 |
| | Totale | 25 | 100,0% | 1 |
| Diagnostica ecografica del Capo e del collo | B | 1 | 100,0% | 1 |
| | D | 3 | 100,0% | 4 |
| | P | 17 | 88,2% | 25 |
| | 0 | 38 | 100,0% | 2 |
| | Totale | 59 | 96,6% | 9 |
| Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo) | B | 14 | 100,0% | 8 |
| | D | 42 | 100,0% | 14 |
| | P | 9 | 33,3% | 189 |
| | 0 | 16 | 81,3% | 77 |
| | Totale | 81 | 88,9% | 45 |
| Ecografia della Mammella bilaterale | B | 1 | 100,0% | 3 |
| | D | 1 | 100,0% | 2 |
| | P | 4 | 100,0% | 3 |
| | 0 | 17 | 76,5% | 29 |
| | Totale | 23 | 82,6% | 22 |
| Ecografia Ostetrica | P | 63 | 85,7% | 43 |
| | 0 | 11 | 81,8% | 19 |
| | Totale | 74 | 85,1% | 39 |
| Ecografia Ginecologica | B | 1 | 100,0% | 1 |
| | D | 5 | 40,0% | 30 |
| | P | 5 | 100,0% | 27 |

| | | | | |
|--|---------------|------------|---------------|------------|
| | 0 | 1 | 100,0% | 29 |
| | Totale | 12 | 75,0% | 26 |
| Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa | B | 4 | 100,0% | 1 |
| | D | 6 | 100,0% | 2 |
| | P | 2 | 100,0% | 3 |
| | 0 | 7 | 100,0% | 2 |
| | Totale | 19 | 100,0% | 2 |
| Colonscopia | D | 12 | 41,7% | 105 |
| | P | 6 | 50,0% | 108 |
| | 0 | 23 | 30,4% | 108 |
| | Totale | 41 | 36,6% | 107 |
| Esofago-gastroduodenoscopia | B | 1 | 100,0% | 3 |
| | D | 9 | 66,7% | 33 |
| | P | 2 | 100,0% | 64 |
| | 0 | 10 | 50,0% | 44 |
| | Totale | 22 | 63,6% | 39 |
| Elettrocardiogramma | B | 33 | 100,0% | 1 |
| | D | 33 | 100,0% | 2 |
| | P | 33 | 100,0% | 1 |
| | 0 | 112 | 100,0% | 1 |
| | Totale | 211 | 100,0% | 2 |
| Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | B | 9 | 100,0% | 1 |
| | D | 23 | 100,0% | 2 |
| | P | 11 | 100,0% | 2 |
| | 0 | 24 | 100,0% | 2 |
| | Totale | 67 | 100,0% | 2 |
| Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro | P | 2 | | 205 |
| | 0 | 6 | 100,0% | 21 |
| | Totale | 8 | 75,0% | 67 |
| Esame audiometrico tonale | 0 | 11 | 100,0% | 2 |
| | Totale | 11 | 100,0% | 2 |
| Esame del fundus oculi | B | 2 | 100,0% | 2 |
| | D | 1 | 100,0% | 7 |
| | P | 2 | 100,0% | 6 |
| | 0 | 3 | 66,7% | 17 |
| | Totale | 8 | 87,5% | 9 |
| Elettromiografia semplice | B | 8 | 100,0% | 7 |
| | D | 28 | 100,0% | 19 |
| | P | 4 | 100,0% | 6 |
| | 0 | 12 | 100,0% | 17 |
| | Totale | 52 | 100,0% | 16 |
| Totale | | 744 | 91,0% | |

105 - Alta Val di Cecina - Val d'Era

| Prestazioni diagnostica | Priorità | N Prestazioni | % Garanzia tempi attesa I disponibilità | Giorni di attesa I disp |
|--|---------------|---------------|---|-------------------------|
| Mammografia bilaterale | U | 6 | 33,3% | 5 |
| | B | 29 | 100,0% | 6 |
| | D | 23 | 100,0% | 20 |
| | P | 77 | 37,7% | 137 |
| | 0 | 106 | 56,6% | 83 |
| | Totale | 241 | 59,3% | 83 |
| Mammografia monolaterale | B | 5 | 100,0% | 5 |
| | P | 15 | 20,0% | 176 |
| | 0 | 19 | 42,1% | 104 |
| | Totale | 39 | 41,0% | 119 |
| TC delTorace | B | 12 | 58,3% | 10 |
| | D | 3 | 100,0% | 18 |
| | P | 9 | 77,8% | 52 |
| | 0 | 25 | 100,0% | 17 |
| | Totale | 49 | 85,7% | 22 |
| TC delTorace senza e con MDC | U | 4 | 50,0% | 4 |
| | B | 12 | 83,3% | 8 |
| | D | 13 | 100,0% | 30 |
| | P | 65 | 73,8% | 84 |
| | 0 | 47 | 83,0% | 32 |
| | Totale | 141 | 79,4% | 53 |
| TC dell Addome superiore senza e con MDC | U | 1 | 100,0% | 3 |
| | B | 2 | 50,0% | 13 |
| | Totale | 3 | 66,7% | 10 |
| TC dell Addome inferiore senza e con MDC | U | 1 | 100,0% | 3 |
| | B | 1 | 100,0% | 7 |
| | 0 | 1 | 100,0% | 30 |
| | Totale | 3 | 100,0% | 13 |
| TC dell Addome completo | B | 2 | 50,0% | 16 |
| | P | 2 | 100,0% | 9 |
| | 0 | 2 | 100,0% | 14 |
| | Totale | 6 | 83,3% | 13 |
| TC dell Addome completo senza e con MDC | U | 10 | 60,0% | 3 |
| | B | 23 | 73,9% | 9 |
| | D | 17 | 100,0% | 26 |
| | P | 70 | 75,7% | 80 |
| | 0 | 58 | 86,2% | 30 |

| | | | | |
|--|---------------|------------|---------------|-----------|
| | Totale | 178 | 80,3% | 45 |
| TC del Capo | U | 3 | 33,3% | 4 |
| | B | 11 | 63,6% | 11 |
| | D | 4 | 100,0% | 22 |
| | 0 | 14 | 100,0% | 15 |
| | Totale | 32 | 81,3% | 13 |
| TC del Capo senza e con MDC | B | 8 | 62,5% | 10 |
| | D | 5 | 100,0% | 28 |
| | P | 10 | 90,0% | 56 |
| | 0 | 12 | 100,0% | 18 |
| | Totale | 35 | 88,6% | 28 |
| TC del Rachide e dello speco vertebrale | U | 3 | 33,3% | 4 |
| | B | 7 | 42,9% | 13 |
| | D | 3 | 100,0% | 10 |
| | P | 2 | 100,0% | 21 |
| | 0 | 18 | 100,0% | 17 |
| | Totale | 33 | 81,8% | 15 |
| TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC | 0 | 2 | 100,0% | 21 |
| | Totale | 2 | 100,0% | 21 |
| TC di Bacino e articolazioni sacroiliache | U | 1 | | 4 |
| | 0 | 1 | 100,0% | 29 |
| | Totale | 2 | 50,0% | 17 |
| RM dell Encefalo e del tronco encefalico | U | 5 | 100,0% | 1 |
| | B | 14 | 92,9% | 6 |
| | D | 12 | 100,0% | 12 |
| | P | 5 | 100,0% | 18 |
| | 0 | 25 | 100,0% | 15 |
| | Totale | 61 | 98,4% | 11 |
| RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC | U | 3 | 100,0% | 0 |
| | B | 23 | 95,7% | 6 |
| | D | 9 | 100,0% | 16 |
| | P | 11 | 100,0% | 13 |
| | 0 | 17 | 100,0% | 10 |
| | Totale | 63 | 98,4% | 10 |
| RM di addome inferiore e scavo pelvico | U | 2 | 100,0% | 2 |
| | D | 1 | 100,0% | 30 |
| | P | 2 | 100,0% | 18 |
| | 0 | 1 | 100,0% | 7 |
| | Totale | 6 | 100,0% | 13 |
| RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC | U | 2 | 100,0% | 1 |
| | B | 5 | 100,0% | 7 |
| | P | 3 | 100,0% | 47 |
| | 0 | 6 | 100,0% | 8 |

| | | | | |
|---|---------------|------------|---------------|-----------|
| | Totale | 16 | 100,0% | 14 |
| RM della Colonna | U | 2 | 100,0% | 2 |
| | B | 70 | 85,7% | 8 |
| | D | 24 | 100,0% | 15 |
| | P | 16 | 100,0% | 13 |
| | 0 | 85 | 100,0% | 14 |
| | Totale | 197 | 94,9% | 11 |
| RM della Colonna senza e con MDC | U | 1 | 100,0% | 1 |
| | B | 3 | 66,7% | 15 |
| | D | 6 | 100,0% | 24 |
| | P | 10 | 100,0% | 18 |
| | 0 | 8 | 100,0% | 9 |
| | Totale | 28 | 96,4% | 16 |
| RM Muscoloscheletrica | U | 5 | 80,0% | 3 |
| | B | 29 | 100,0% | 6 |
| | D | 17 | 100,0% | 13 |
| | P | 20 | 100,0% | 10 |
| | 0 | 163 | 100,0% | 6 |
| | Totale | 234 | 99,6% | 7 |
| RM Muscoloscheletrica senza e con MDC | U | 2 | | 5 |
| | B | 1 | 100,0% | 1 |
| | D | 1 | 100,0% | 6 |
| | 0 | 3 | 100,0% | 34 |
| | Totale | 7 | 71,4% | 17 |
| Eco(color)dopplergrafia cardiaca | U | 2 | 100,0% | 1 |
| | B | 19 | 100,0% | 2 |
| | D | 5 | 100,0% | 9 |
| | P | 1 | 100,0% | 0 |
| | 0 | 77 | 84,4% | 20 |
| | Totale | 104 | 88,5% | 16 |
| Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici | B | 9 | 100,0% | 4 |
| | D | 18 | 100,0% | 20 |
| | P | 13 | 92,3% | 47 |
| | 0 | 134 | 90,3% | 22 |
| | Totale | 174 | 92,0% | 23 |
| Diagnostica ecografica del Capo e del collo | B | 3 | 100,0% | 3 |
| | D | 5 | 100,0% | 9 |
| | P | 7 | 100,0% | 5 |
| | 0 | 28 | 96,4% | 11 |
| | Totale | 43 | 97,7% | 9 |
| Ecografia dell Addome (superiore, inferiore | U | 3 | 66,7% | 2 |
| | B | 41 | 100,0% | 4 |
| | D | 39 | 97,4% | 5 |

| | | | | |
|--|--------|-----|--------|----|
| Ecografia con radome (superiore, inferiore, completo) | P | 131 | 100,0% | 4 |
| | 0 | 460 | 98,7% | 4 |
| | Totale | 674 | 98,8% | 4 |
| | | | | |
| Ecografia della Mammella bilaterale | U | 5 | 20,0% | 5 |
| | B | 29 | 96,6% | 5 |
| | D | 5 | 100,0% | 11 |
| | P | 6 | 100,0% | 10 |
| | 0 | 51 | 98,0% | 6 |
| | Totale | 96 | 93,8% | 6 |
| Ecografia della Mammella monolaterale | U | 1 | | 6 |
| | B | 3 | 100,0% | 5 |
| | D | 1 | 100,0% | 3 |
| | 0 | 4 | 100,0% | 2 |
| | Totale | 9 | 88,9% | 4 |
| Ecografia Ginecologica | B | 2 | 100,0% | 5 |
| | P | 7 | 100,0% | 53 |
| | 0 | 53 | 22,6% | 58 |
| | Totale | 62 | 33,9% | 56 |
| Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa | B | 3 | 100,0% | 5 |
| | D | 5 | 100,0% | 11 |
| | P | 4 | 100,0% | 6 |
| | 0 | 20 | 95,0% | 9 |
| | Totale | 32 | 96,9% | 8 |
| Colonscopia | B | 15 | 86,7% | 8 |
| | D | 12 | 100,0% | 23 |
| | P | 18 | 100,0% | 7 |
| | 0 | 119 | 76,5% | 24 |
| | Totale | 164 | 81,7% | 21 |
| Esofago-gastroduodenoscopia | B | 9 | 88,9% | 8 |
| | D | 11 | 81,8% | 22 |
| | P | 7 | 100,0% | 24 |
| | 0 | 53 | 66,0% | 29 |
| | Totale | 80 | 73,8% | 26 |
| Elettrocardiogramma | U | 2 | 100,0% | 2 |
| | B | 50 | 98,0% | 4 |
| | D | 18 | 100,0% | 6 |
| | P | 15 | 100,0% | 5 |
| | 0 | 200 | 89,5% | 12 |
| | Totale | 285 | 92,3% | 10 |
| Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | D | 4 | 75,0% | 18 |
| | P | 5 | 100,0% | 17 |
| | 0 | 52 | 94,2% | 15 |
| | Totale | 61 | 93,4% | 15 |

| | | | | |
|---|--------|------|--------|----|
| Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro | B | 3 | 100,0% | 1 |
| | 0 | 4 | 100,0% | 4 |
| | Totale | 7 | 100,0% | 3 |
| Esame audiometrico tonale | B | 1 | 100,0% | 4 |
| | D | 1 | 100,0% | 7 |
| | P | 6 | 100,0% | 4 |
| | 0 | 24 | 100,0% | 5 |
| | Totale | 32 | 100,0% | 5 |
| Spirometria semplice | P | 3 | 100,0% | 3 |
| | 0 | 2 | 100,0% | 3 |
| | Totale | 5 | 100,0% | 3 |
| Spirometria globale | 0 | 7 | 100,0% | 5 |
| | Totale | 7 | 100,0% | 5 |
| Esame del fundus oculi | P | 2 | 100,0% | 55 |
| | 0 | 91 | 50,5% | 41 |
| | Totale | 93 | 51,6% | 42 |
| Elettromiografia semplice | B | 20 | 100,0% | 5 |
| | D | 27 | 100,0% | 15 |
| | P | 20 | 100,0% | 17 |
| | 0 | 51 | 100,0% | 19 |
| | Totale | 118 | 100,0% | 15 |
| Totale | | 3422 | 87,3% | |

105 - Pisana

| Prestazioni diagnostica | Priorità | N Prestazioni | % Garanzia tempi attesa I disponibilità | Giorni di attesa I disp |
|--------------------------|----------|---------------|---|-------------------------|
| Mammografia bilaterale | B | 2 | 100,0% | 8 |
| | D | 23 | 82,6% | 31 |
| | P | 131 | 96,2% | 34 |
| | 0 | 180 | 90,0% | 31 |
| | Totale | 336 | 92,0% | 32 |
| Mammografia monolaterale | D | 1 | 100,0% | 56 |
| | P | 7 | 100,0% | 52 |
| | 0 | 6 | 83,3% | 34 |
| | Totale | 14 | 92,9% | 45 |
| TC delTorace | B | 1 | | 29 |
| | D | 4 | 100,0% | 32 |
| | 0 | 20 | 100,0% | 26 |
| | Totale | 25 | 96,0% | 27 |
| | D | 3 | 100,0% | 30 |

| | | | | |
|--|--------|----|--------|----|
| TC delTorace senza e con MDC | P | 4 | 100,0% | 30 |
| | 0 | 18 | 100,0% | 20 |
| | Totale | 25 | 100,0% | 23 |
| TC dell Addome superiore | P | 1 | 100,0% | 30 |
| | Totale | 1 | 100,0% | 30 |
| TC dell Addome inferiore | 0 | 1 | 100,0% | 28 |
| | Totale | 1 | 100,0% | 28 |
| TC dell Addome inferiore senza e con MDC | B | 1 | | 28 |
| | Totale | 1 | | 28 |
| TC dell Addome completo | U | 1 | | 29 |
| | B | 2 | | 27 |
| | D | 1 | 100,0% | 28 |
| | 0 | 4 | 100,0% | 25 |
| | Totale | 8 | 62,5% | 27 |
| TC dell Addome completo senza e con MDC | D | 4 | 100,0% | 27 |
| | P | 3 | 100,0% | 31 |
| | 0 | 27 | 100,0% | 20 |
| | Totale | 34 | 100,0% | 21 |
| TC del Capo | B | 1 | | 29 |
| | D | 4 | 100,0% | 28 |
| | P | 1 | 100,0% | 29 |
| | 0 | 12 | 100,0% | 25 |
| | Totale | 18 | 94,4% | 26 |
| TC del Capo senza e con MDC | D | 3 | 100,0% | 27 |
| | 0 | 4 | 100,0% | 21 |
| | Totale | 7 | 100,0% | 24 |
| TC del Rachide e dello speco vertebrale | D | 4 | 100,0% | 21 |
| | P | 2 | 100,0% | 28 |
| | 0 | 10 | 100,0% | 24 |
| | Totale | 16 | 100,0% | 23 |
| TC di Bacino e articolazioni sacroiliache | 0 | 1 | 100,0% | 17 |
| | Totale | 1 | 100,0% | 17 |
| RM dell Encefalo e del tronco encefalico | D | 2 | 100,0% | 34 |
| | 0 | 5 | 100,0% | 20 |
| | Totale | 7 | 100,0% | 24 |
| RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC | D | 2 | 100,0% | 28 |
| | P | 3 | 100,0% | 0 |
| | 0 | 6 | 100,0% | 28 |
| | Totale | 11 | 100,0% | 20 |
| RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC | 0 | 3 | 100,0% | 20 |
| | Totale | 3 | 100,0% | 20 |

| | | | | |
|--|--------|-----|--------|----|
| RM della Colonna | U | 1 | | 4 |
| | B | 3 | 66,7% | 12 |
| | D | 6 | 100,0% | 16 |
| | P | 9 | 100,0% | 16 |
| | 0 | 29 | 100,0% | 18 |
| | Totale | 48 | 95,8% | 17 |
| RM della Colonna senza e con MDC | 0 | 3 | 100,0% | 15 |
| | Totale | 3 | 100,0% | 15 |
| RM Muscoloscheletrica | B | 4 | 100,0% | 4 |
| | D | 12 | 100,0% | 8 |
| | P | 20 | 100,0% | 11 |
| | 0 | 63 | 100,0% | 9 |
| | Totale | 99 | 100,0% | 9 |
| Eco(color)dopplergrafia cardiaca | B | 5 | 100,0% | 2 |
| | D | 15 | 100,0% | 7 |
| | P | 5 | 100,0% | 9 |
| | 0 | 145 | 100,0% | 6 |
| | Totale | 170 | 100,0% | 6 |
| Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici | B | 6 | 100,0% | 3 |
| | D | 12 | 100,0% | 7 |
| | P | 46 | 100,0% | 10 |
| | 0 | 141 | 100,0% | 9 |
| | Totale | 205 | 100,0% | 9 |
| Diagnostica ecografica del Capo e del collo | B | 6 | 100,0% | 3 |
| | D | 7 | 100,0% | 2 |
| | P | 6 | 100,0% | 4 |
| | 0 | 37 | 100,0% | 3 |
| | Totale | 56 | 100,0% | 3 |
| Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo) | U | 3 | 100,0% | 1 |
| | B | 36 | 100,0% | 3 |
| | D | 35 | 100,0% | 3 |
| | P | 82 | 100,0% | 3 |
| | 0 | 209 | 100,0% | 3 |
| | Totale | 365 | 100,0% | 3 |
| Ecografia della Mammella bilaterale | P | 1 | 100,0% | 10 |
| | Totale | 1 | 100,0% | 10 |
| Ecografia Ginecologica | B | 1 | 100,0% | 5 |
| | D | 1 | 100,0% | 5 |
| | Totale | 2 | 100,0% | 5 |
| Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa | U | 1 | | 7 |
| | B | 43 | 79,1% | 5 |
| | D | 27 | 100,0% | 8 |
| | P | 54 | 100,0% | 7 |

| | | | | |
|---|--------|------|--------|----|
| | 0 | 162 | 100,0% | 6 |
| | Totale | 287 | 96,5% | 6 |
| Elettrocardiogramma | B | 27 | 100,0% | 4 |
| | D | 34 | 100,0% | 5 |
| | P | 26 | 100,0% | 6 |
| | 0 | 293 | 100,0% | 4 |
| | Totale | 380 | 100,0% | 4 |
| Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | B | 2 | 100,0% | 10 |
| | D | 2 | 100,0% | 7 |
| | 0 | 6 | 83,3% | 14 |
| | Totale | 10 | 90,0% | 12 |
| Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro | P | 1 | 100,0% | 31 |
| | 0 | 3 | 100,0% | 19 |
| | Totale | 4 | 100,0% | 22 |
| Fotografia del fundus | 0 | 2 | | 36 |
| | Totale | 2 | | 36 |
| Esame del fundus oculi | B | 1 | 100,0% | 1 |
| | D | 3 | 100,0% | 1 |
| | P | 8 | 100,0% | 23 |
| | 0 | 27 | 77,8% | 31 |
| | Totale | 39 | 84,6% | 26 |
| Totale | | 2179 | 97,5% | |

106 - Bassa Val di Cecina - Val di Cornia

| Prestazioni diagnostica | Priorità | N Prestazioni | % Garanzia tempi attesa l disponibilità | Giorni di attesa l disp |
|------------------------------|----------|---------------|---|-------------------------|
| Mammografia bilaterale | B | 1 | 100,0% | 9 |
| | D | 32 | 100,0% | 25 |
| | P | 2 | 100,0% | 28 |
| | Totale | 35 | 100,0% | 24 |
| Mammografia monolaterale | D | 1 | 100,0% | 27 |
| | Totale | 1 | 100,0% | 27 |
| TC delTorace | B | 1 | 100,0% | 5 |
| | D | 5 | 80,0% | 16 |
| | P | 11 | 90,9% | 50 |
| | Totale | 17 | 88,2% | 38 |
| TC delTorace senza e con MDC | D | 22 | 100,0% | 18 |
| | P | 37 | 97,3% | 27 |
| | Totale | 59 | 98,3% | 24 |
| | D | 1 | 100,0% | 18 |

| | | | | |
|---|--------|----|--------|-----|
| TC dell Addome superiore senza e con MDC | Totale | 1 | 100,0% | 18 |
| | | | | |
| TC dell Addome completo | P | 1 | | 129 |
| | Totale | 1 | | 129 |
| TC dell Addome completo senza e con MDC | B | 1 | 100,0% | 6 |
| | D | 21 | 100,0% | 19 |
| | P | 38 | 92,1% | 33 |
| | Totale | 60 | 95,0% | 28 |
| TC del Capo | B | 4 | 100,0% | 1 |
| | D | 8 | 100,0% | 2 |
| | P | 13 | 100,0% | 28 |
| | Totale | 25 | 100,0% | 15 |
| TC del Capo senza e con MDC | D | 13 | 100,0% | 6 |
| | P | 6 | 100,0% | 24 |
| | Totale | 19 | 100,0% | 11 |
| TC del Rachide e dello speco vertebrale | B | 4 | 100,0% | 1 |
| | D | 10 | 100,0% | 2 |
| | P | 11 | 100,0% | 20 |
| | Totale | 25 | 100,0% | 10 |
| TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC | D | 2 | 100,0% | 6 |
| | P | 1 | 100,0% | 99 |
| | Totale | 3 | 100,0% | 37 |
| RM dell Encefalo e del tronco encefalico | B | 6 | 100,0% | 3 |
| | D | 7 | 100,0% | 3 |
| | P | 11 | 100,0% | 11 |
| | Totale | 24 | 100,0% | 6 |
| RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC | B | 12 | 91,7% | 7 |
| | D | 18 | 100,0% | 10 |
| | P | 21 | 100,0% | 26 |
| | Totale | 51 | 98,0% | 16 |
| RM della Colonna | B | 5 | 100,0% | 2 |
| | D | 34 | 100,0% | 4 |
| | P | 14 | 100,0% | 23 |
| | Totale | 53 | 100,0% | 9 |
| RM della Colonna senza e con MDC | B | 3 | 100,0% | 6 |
| | D | 7 | 100,0% | 8 |
| | P | 10 | 100,0% | 28 |
| | Totale | 20 | 100,0% | 18 |
| RM Muscoloscheletrica | D | 8 | 100,0% | 9 |
| | P | 1 | 100,0% | 3 |
| | Totale | 9 | 100,0% | 8 |
| Eco(color)dopplergrafia cardiaca | B | 6 | 100,0% | 7 |
| | D | 8 | 100,0% | 16 |

| | | | | |
|--|---------------|------------|---------------|-----------|
| | Totale | 14 | 100,0% | 12 |
| Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici | B | 2 | 100,0% | 2 |
| | D | 21 | 100,0% | 2 |
| | P | 2 | 100,0% | 16 |
| | Totale | 25 | 100,0% | 3 |
| Diagnostica ecografica del Capo e del collo | B | 1 | 100,0% | 0 |
| | D | 16 | 100,0% | 3 |
| | P | 4 | 75,0% | 43 |
| | Totale | 21 | 95,2% | 10 |
| Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo) | B | 2 | 100,0% | 5 |
| | D | 26 | 100,0% | 22 |
| | P | 4 | 100,0% | 10 |
| | Totale | 32 | 100,0% | 19 |
| Ecografia della Mammella bilaterale | D | 10 | 100,0% | 20 |
| | P | 1 | 100,0% | 8 |
| | Totale | 11 | 100,0% | 18 |
| Ecografia Ostetrica | D | 83 | 79,5% | 16 |
| | P | 28 | 100,0% | 30 |
| | Totale | 111 | 84,7% | 20 |
| Ecografia Ginecologica | D | 4 | 100,0% | 4 |
| | P | 1 | 100,0% | 0 |
| | Totale | 5 | 100,0% | 3 |
| Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa | B | 3 | 100,0% | 2 |
| | D | 3 | 100,0% | 10 |
| | P | 9 | 100,0% | 24 |
| | Totale | 15 | 100,0% | 17 |
| Colonscopia | B | 14 | 100,0% | 5 |
| | D | 59 | 100,0% | 20 |
| | P | 15 | 100,0% | 30 |
| | Totale | 88 | 100,0% | 19 |
| Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile | D | 1 | 100,0% | 1 |
| | Totale | 1 | 100,0% | 1 |
| Esofago-gastroduodenoscopia | B | 24 | 95,8% | 6 |
| | D | 51 | 100,0% | 10 |
| | P | 11 | 90,9% | 34 |
| | Totale | 86 | 97,7% | 12 |
| Elettrocardiogramma | B | 25 | 100,0% | 2 |
| | D | 123 | 100,0% | 0 |
| | P | 82 | 100,0% | 1 |
| | Totale | 230 | 100,0% | 1 |
| | B | 5 | 100,0% | 6 |
| | D | 48 | 100,0% | 13 |

| | | | | |
|---|--------|------|--------|----|
| Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | P | 42 | 100,0% | 50 |
| | Totale | 95 | 100,0% | 29 |
| | | | | |
| Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro | B | 3 | 100,0% | 4 |
| | D | 21 | 100,0% | 22 |
| | P | 4 | 100,0% | 14 |
| | Totale | 28 | 100,0% | 19 |
| Esame audiometrico tonale | B | 4 | 100,0% | 1 |
| | D | 28 | 100,0% | 2 |
| | P | 7 | 100,0% | 5 |
| | Totale | 39 | 100,0% | 2 |
| Spirometria globale | B | 1 | 100,0% | 5 |
| | P | 2 | 100,0% | 55 |
| | Totale | 3 | 100,0% | 38 |
| Esame del fundus oculi | D | 19 | 78,9% | 16 |
| | P | 16 | 87,5% | 36 |
| | Totale | 35 | 82,9% | 25 |
| Elettromiografia semplice | P | 17 | 100,0% | 1 |
| | Totale | 17 | 100,0% | 1 |
| Totale | | 1259 | 97,3% | |

106 - dell'Elba

| Prestazioni diagnostica | Priorità | N Prestazioni | % Garanzia tempi attesa I disponibilità | Giorni di attesa I disp |
|---|----------|---------------|---|-------------------------|
| Mammografia bilaterale | D | 9 | 100,0% | 21 |
| | P | 10 | 100,0% | 24 |
| | Totale | 19 | 100,0% | 23 |
| TC del Capo | B | 3 | 100,0% | 2 |
| | D | 2 | 100,0% | 1 |
| | Totale | 5 | 100,0% | 2 |
| TC del Rachide e dello speco vertebrale | B | 2 | 100,0% | 1 |
| | D | 2 | 100,0% | 1 |
| | P | 1 | 100,0% | 3 |
| | Totale | 5 | 100,0% | 1 |
| Eco(color)dopplergrafia cardiaca | B | 4 | 100,0% | 3 |
| | D | 13 | 100,0% | 16 |
| | P | 10 | 50,0% | 125 |
| | Totale | 27 | 81,5% | 55 |
| Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici | B | 4 | 100,0% | 2 |
| | D | 12 | 100,0% | 1 |
| | Totale | 16 | 100,0% | 2 |

| | | | | |
|--|--------|-----|--------|----|
| Diagnostica ecografica del Capo e del collo | D | 5 | 100,0% | 9 |
| | Totale | 5 | 100,0% | 9 |
| Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo) | B | 2 | 100,0% | 8 |
| | D | 47 | 100,0% | 9 |
| | P | 1 | 100,0% | 9 |
| | Totale | 50 | 100,0% | 9 |
| Ecografia della Mammella bilaterale | D | 15 | 100,0% | 9 |
| | P | 3 | 100,0% | 8 |
| | Totale | 18 | 100,0% | 9 |
| Ecografia della Mammella monolaterale | D | 2 | 100,0% | 8 |
| | Totale | 2 | 100,0% | 8 |
| Ecografia Ostetrica | D | 18 | 100,0% | 1 |
| | P | 5 | 100,0% | 7 |
| | Totale | 23 | 100,0% | 2 |
| Ecografia Ginecologica | B | 1 | 100,0% | 1 |
| | P | 2 | 100,0% | 11 |
| | Totale | 3 | 100,0% | 8 |
| Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa | B | 4 | 100,0% | 3 |
| | D | 11 | 100,0% | 2 |
| | Totale | 15 | 100,0% | 2 |
| Colonscopia | B | 3 | 100,0% | 4 |
| | D | 15 | 100,0% | 20 |
| | P | 11 | 100,0% | 29 |
| | Totale | 29 | 100,0% | 22 |
| Esofago-gastroduodenoscopia | B | 2 | 100,0% | 3 |
| | D | 6 | 100,0% | 6 |
| | P | 3 | 100,0% | 14 |
| | Totale | 11 | 100,0% | 7 |
| Elettrocardiogramma | B | 31 | 100,0% | 1 |
| | D | 53 | 100,0% | 0 |
| | P | 33 | 100,0% | 1 |
| | Totale | 117 | 100,0% | 1 |
| Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | D | 9 | 88,9% | 27 |
| | P | 5 | 100,0% | 14 |
| | Totale | 14 | 92,9% | 22 |
| Esame audiometrico tonale | D | 6 | 100,0% | 4 |
| | P | 3 | 100,0% | 4 |
| | Totale | 9 | 100,0% | 4 |
| Spirometria semplice | B | 1 | 100,0% | 2 |
| | D | 10 | 100,0% | 7 |
| | P | 1 | 100,0% | 19 |
| | Totale | 12 | 100,0% | 7 |

| | | | | |
|---------------------------|--------|-----|--------|-----|
| Esame del fundus oculi | D | 1 | 100,0% | 14 |
| | Totale | 1 | 100,0% | 14 |
| Elettromiografia semplice | B | 1 | 100,0% | 7 |
| | D | 11 | 45,5% | 66 |
| | P | 7 | 42,9% | 108 |
| | Totale | 19 | 47,4% | 78 |
| Totale | | 400 | 96,0% | |

106 - Livornese

| Prestazioni diagnostica | Priorità | N Prestazioni | % Garanzia tempi attesa I disponibilità | Giorni di attesa I disp |
|--|----------|---------------|---|-------------------------|
| Mammografia bilaterale | D | 67 | 83,6% | 121 |
| | P | 7 | 100,0% | 13 |
| | Totale | 74 | 85,1% | 111 |
| Mammografia monolaterale | D | 2 | 100,0% | 0 |
| | P | 1 | | 662 |
| | Totale | 3 | 66,7% | 221 |
| TC delTorace | B | 22 | 95,5% | 3 |
| | D | 43 | 100,0% | 8 |
| | P | 7 | 100,0% | 32 |
| | Totale | 72 | 98,6% | 9 |
| TC delTorace senza e con MDC | B | 28 | 100,0% | 4 |
| | D | 26 | 100,0% | 18 |
| | P | 6 | 100,0% | 21 |
| | Totale | 60 | 100,0% | 12 |
| TC dell Addome superiore | P | 1 | 100,0% | 4 |
| | Totale | 1 | 100,0% | 4 |
| TC dell Addome superiore senza e con MDC | B | 2 | 50,0% | 15 |
| | P | 1 | 100,0% | 92 |
| | Totale | 3 | 66,7% | 40 |
| TC dell Addome inferiore | B | 2 | 100,0% | 1 |
| | Totale | 2 | 100,0% | 1 |
| TC dell Addome inferiore senza e con MDC | B | 3 | 100,0% | 6 |
| | D | 3 | 100,0% | 24 |
| | Totale | 6 | 100,0% | 15 |
| TC dell Addome completo | B | 10 | 100,0% | 2 |
| | D | 8 | 100,0% | 9 |
| | P | 1 | 100,0% | 1 |
| | Totale | 19 | 100,0% | 5 |

| | | | | |
|---|--------|-----|--------|----|
| TC dell Addome completo senza e con MDC | B | 33 | 100,0% | 5 |
| | D | 24 | 100,0% | 18 |
| | P | 4 | 100,0% | 19 |
| | Totale | 61 | 100,0% | 11 |
| TC del Capo | B | 28 | 100,0% | 3 |
| | D | 23 | 100,0% | 3 |
| | P | 2 | 100,0% | 7 |
| | Totale | 53 | 100,0% | 3 |
| TC del Capo senza e con MDC | B | 15 | 100,0% | 5 |
| | D | 14 | 100,0% | 4 |
| | P | 7 | 100,0% | 7 |
| | Totale | 36 | 100,0% | 5 |
| TC del Rachide e dello speco vertebrale | B | 16 | 100,0% | 3 |
| | D | 22 | 100,0% | 3 |
| | P | 6 | 100,0% | 3 |
| | Totale | 44 | 100,0% | 3 |
| TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC | B | 1 | 100,0% | 2 |
| | D | 2 | 100,0% | 3 |
| | Totale | 3 | 100,0% | 3 |
| TC di Bacino e articolazioni sacroiliache | B | 1 | 100,0% | 1 |
| | D | 4 | 100,0% | 8 |
| | P | 1 | 100,0% | 7 |
| | Totale | 6 | 100,0% | 7 |
| RM dell Encefalo e del tronco encefalico | B | 2 | 100,0% | 3 |
| | D | 13 | 100,0% | 3 |
| | P | 22 | 100,0% | 9 |
| | Totale | 37 | 100,0% | 7 |
| RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC | B | 5 | 100,0% | 5 |
| | D | 27 | 100,0% | 10 |
| | P | 76 | 100,0% | 16 |
| | Totale | 108 | 100,0% | 14 |
| RM della Colonna | B | 11 | 100,0% | 4 |
| | D | 54 | 100,0% | 4 |
| | P | 44 | 100,0% | 9 |
| | Totale | 109 | 100,0% | 6 |
| RM della Colonna senza e con MDC | B | 1 | 100,0% | 1 |
| | D | 1 | 100,0% | 7 |
| | P | 22 | 100,0% | 11 |
| | Totale | 24 | 100,0% | 10 |
| RM Muscoloscheletrica | B | 28 | 100,0% | 4 |
| | D | 127 | 100,0% | 8 |
| | P | 70 | 100,0% | 9 |

| | | | | |
|--|---------------|------------|---------------|-----------|
| | Totale | 225 | 100,0% | 8 |
| Eco(color)dopplergrafia cardiaca | P | 1 | 100,0% | 3 |
| | Totale | 1 | 100,0% | 3 |
| | | | | |
| Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici | B | 23 | 100,0% | 1 |
| | D | 116 | 100,0% | 2 |
| | P | 112 | 100,0% | 4 |
| | Totale | 251 | 100,0% | 3 |
| Diagnostica ecografica del Capo e del collo | B | 20 | 95,0% | 4 |
| | D | 93 | 98,9% | 6 |
| | P | 47 | 93,6% | 30 |
| | Totale | 160 | 96,9% | 13 |
| Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo) | B | 64 | 96,9% | 5 |
| | D | 131 | 100,0% | 11 |
| | P | 150 | 100,0% | 41 |
| | Totale | 345 | 99,4% | 23 |
| Ecografia della Mammella bilaterale | B | 1 | 100,0% | 5 |
| | D | 5 | 100,0% | 7 |
| | P | 1 | 100,0% | 7 |
| | Totale | 7 | 100,0% | 6 |
| Ecografia Ginecologica | D | 3 | 100,0% | 2 |
| | P | 3 | 100,0% | 5 |
| | Totale | 6 | 100,0% | 3 |
| Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa | B | 46 | 100,0% | 3 |
| | D | 88 | 100,0% | 4 |
| | P | 31 | 100,0% | 5 |
| | Totale | 165 | 100,0% | 4 |
| Colonscopia | B | 18 | 100,0% | 5 |
| | D | 22 | 100,0% | 16 |
| | P | 20 | 100,0% | 6 |
| | Totale | 60 | 100,0% | 9 |
| Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile | B | 1 | 100,0% | 7 |
| | P | 1 | 100,0% | 4 |
| | Totale | 2 | 100,0% | 6 |
| Esofago-gastroduodenoscopia | B | 17 | 94,1% | 5 |
| | D | 37 | 100,0% | 5 |
| | P | 18 | 100,0% | 3 |
| | Totale | 72 | 98,6% | 4 |
| Elettrocardiogramma | U | 1 | 100,0% | 1 |
| | B | 125 | 100,0% | 1 |
| | D | 283 | 99,6% | 1 |
| | P | 143 | 100,0% | 1 |
| | Totale | 552 | 99,8% | 1 |

| | | | | |
|---------------------------------------|--------|------|--------|-----|
| Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | B | 4 | 50,0% | 10 |
| | D | 47 | 100,0% | 19 |
| | P | 10 | 100,0% | 10 |
| | Totale | 61 | 96,7% | 17 |
| Esame audiometrico tonale | B | 10 | 100,0% | 1 |
| | D | 46 | 100,0% | 1 |
| | P | 7 | 100,0% | 2 |
| | Totale | 63 | 100,0% | 1 |
| Spirometria globale | D | 1 | 100,0% | 9 |
| | Totale | 1 | 100,0% | 9 |
| Esame del fundus oculi | D | 25 | 88,0% | 16 |
| | P | 66 | 69,7% | 46 |
| | Totale | 91 | 74,7% | 38 |
| Elettromiografia semplice | B | 4 | 100,0% | 8 |
| | D | 42 | 16,7% | 107 |
| | P | 29 | 55,2% | 121 |
| | Totale | 75 | 36,0% | 107 |
| Totale | | 2858 | 96,6% | |

112 - della Versilia

| Prestazioni diagnostica | Priorità | N Prestazioni | % Garanzia tempi attesa l disponibilità | Giorni di attesa l disp |
|--|----------|---------------|---|-------------------------|
| Mammografia bilaterale | B | 23 | 100,0% | 1 |
| | D | 6 | 100,0% | 12 |
| | P | 2 | 100,0% | 12 |
| | 0 | 10 | 100,0% | 6 |
| | Totale | 41 | 100,0% | 5 |
| TC delTorace | B | 6 | 66,7% | 17 |
| | D | 23 | 100,0% | 24 |
| | P | 1 | 100,0% | 2 |
| | 0 | 26 | 100,0% | 6 |
| | Totale | 56 | 96,4% | 14 |
| TC delTorace senza e con MDC | B | 15 | 100,0% | 6 |
| | D | 32 | 100,0% | 11 |
| | P | 3 | 100,0% | 1 |
| | 0 | 25 | 100,0% | 9 |
| | Totale | 75 | 100,0% | 9 |
| TC dell Addome inferiore senza e con MDC | D | 1 | 100,0% | 7 |
| | Totale | 1 | 100,0% | 7 |
| | B | 5 | 100,0% | 3 |

| | | | | |
|--|---------------|-----------|---------------|-----------|
| TC dell Addome completo | D | 5 | 100,0% | 8 |
| | P | 1 | 100,0% | 4 |
| | Totale | 11 | 100,0% | 5 |
| TC dell Addome completo senza e con MDC | U | 1 | | 21 |
| | B | 17 | 100,0% | 6 |
| | D | 30 | 100,0% | 12 |
| | P | 1 | 100,0% | 1 |
| | 0 | 28 | 100,0% | 10 |
| | Totale | 77 | 98,7% | 10 |
| TC del Capo | B | 10 | 90,0% | 7 |
| | D | 28 | 100,0% | 13 |
| | 0 | 8 | 100,0% | 17 |
| | Totale | 46 | 97,8% | 12 |
| TC del Capo senza e con MDC | B | 5 | 100,0% | 6 |
| | D | 5 | 100,0% | 16 |
| | 0 | 4 | 100,0% | 14 |
| | Totale | 14 | 100,0% | 11 |
| TC del Rachide e dello speco vertebrale | B | 3 | 100,0% | 7 |
| | D | 15 | 100,0% | 20 |
| | 0 | 3 | 100,0% | 4 |
| | Totale | 21 | 100,0% | 16 |
| TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC | D | 3 | 100,0% | 3 |
| | Totale | 3 | 100,0% | 3 |
| TC di Bacino e articolazioni sacroiliache | 0 | 1 | 100,0% | 28 |
| | Totale | 1 | 100,0% | 28 |
| RM dell Encefalo e del tronco encefalico | B | 6 | 83,3% | 7 |
| | D | 37 | 100,0% | 17 |
| | 0 | 19 | 100,0% | 14 |
| | Totale | 62 | 98,4% | 15 |
| RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC | B | 24 | 91,7% | 6 |
| | D | 48 | 100,0% | 13 |
| | 0 | 27 | 100,0% | 13 |
| | Totale | 99 | 98,0% | 11 |
| RM di addome inferiore e scavo pelvico | B | 1 | 100,0% | 2 |
| | D | 4 | 100,0% | 31 |
| | 0 | 1 | 100,0% | 35 |
| | Totale | 6 | 100,0% | 27 |
| RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC | B | 4 | 75,0% | 7 |
| | D | 6 | 100,0% | 30 |
| | 0 | 2 | 100,0% | 23 |
| | Totale | 12 | 91,7% | 21 |
| | B | 33 | 84,8% | 6 |

| | | | | |
|--|---------------|------------|---------------|-----------|
| RM della Colonna | D | 161 | 100,0% | 14 |
| | P | 1 | 100,0% | 0 |
| | 0 | 53 | 100,0% | 14 |
| | Totale | 248 | 98,0% | 13 |
| RM della Colonna senza e con MDC | B | 7 | 100,0% | 3 |
| | D | 8 | 100,0% | 12 |
| | 0 | 4 | 100,0% | 14 |
| | Totale | 19 | 100,0% | 9 |
| RM Muscoloscheletrica | B | 37 | 86,5% | 6 |
| | D | 142 | 100,0% | 15 |
| | P | 4 | 100,0% | 4 |
| | 0 | 36 | 100,0% | 14 |
| | Totale | 219 | 97,7% | 13 |
| RM Muscoloscheletrica senza e con MDC | B | 1 | | 39 |
| | D | 1 | 100,0% | 38 |
| | 0 | 1 | 100,0% | 40 |
| | Totale | 3 | 66,7% | 39 |
| Eco(color)dopplergrafia cardiaca | B | 2 | 100,0% | 4 |
| | D | 3 | 100,0% | 6 |
| | P | 1 | 100,0% | 0 |
| | 0 | 15 | 100,0% | 3 |
| | Totale | 21 | 100,0% | 4 |
| Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici | B | 7 | 100,0% | 1 |
| | D | 131 | 100,0% | 2 |
| | P | 19 | 100,0% | 3 |
| | 0 | 65 | 100,0% | 2 |
| | Totale | 222 | 100,0% | 2 |
| Diagnostica ecografica del Capo e del collo | B | 12 | 100,0% | 4 |
| | D | 74 | 95,9% | 10 |
| | P | 4 | 100,0% | 3 |
| | 0 | 146 | 84,9% | 23 |
| | Totale | 236 | 89,4% | 18 |
| Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo) | U | 1 | 100,0% | 1 |
| | B | 57 | 100,0% | 4 |
| | D | 223 | 96,9% | 6 |
| | 0 | 139 | 100,0% | 4 |
| | Totale | 420 | 98,3% | 5 |
| Ecografia della Mammella bilaterale | B | 50 | 100,0% | 4 |
| | D | 64 | 100,0% | 3 |
| | 0 | 30 | 100,0% | 2 |
| | Totale | 144 | 100,0% | 3 |
| | U | 2 | 100,0% | 0 |
| | B | 38 | 100,0% | 1 |

| | | | | |
|--|---------------|------------|---------------|-----------|
| Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa | D | 130 | 100,0% | 1 |
| | P | 17 | 100,0% | 1 |
| | 0 | 53 | 100,0% | 1 |
| | Totale | 240 | 100,0% | 1 |
| Colonscopia | B | 30 | 96,7% | 8 |
| | D | 14 | 50,0% | 49 |
| | 0 | 11 | 81,8% | 24 |
| | Totale | 55 | 81,8% | 22 |
| Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile | B | 1 | 100,0% | 6 |
| | D | 1 | 100,0% | 11 |
| | 0 | 2 | 100,0% | 10 |
| | Totale | 4 | 100,0% | 9 |
| Esofago-gastroduodenoscopia | B | 15 | 100,0% | 7 |
| | D | 43 | 48,8% | 35 |
| | 0 | 17 | 47,1% | 40 |
| | Totale | 75 | 58,7% | 31 |
| Elettrocardiogramma | B | 61 | 100,0% | 1 |
| | D | 231 | 100,0% | 1 |
| | P | 11 | 100,0% | 2 |
| | 0 | 124 | 100,0% | 1 |
| | Totale | 427 | 100,0% | 1 |
| Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | B | 6 | 100,0% | 9 |
| | D | 45 | 68,9% | 35 |
| | 0 | 8 | 100,0% | 16 |
| | Totale | 59 | 76,3% | 30 |
| Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro | B | 1 | | 16 |
| | D | 11 | 100,0% | 21 |
| | 0 | 1 | 100,0% | 28 |
| | Totale | 13 | 92,3% | 21 |
| Spirometria semplice | B | 3 | 100,0% | 4 |
| | D | 27 | 100,0% | 4 |
| | P | 1 | 100,0% | 2 |
| | 0 | 15 | 100,0% | 4 |
| | Totale | 46 | 100,0% | 4 |
| Esame del fundus oculi | B | 1 | 100,0% | 3 |
| | D | 16 | 100,0% | 7 |
| | 0 | 3 | 100,0% | 6 |
| | Totale | 20 | 100,0% | 7 |
| Elettromiografia semplice | B | 2 | 50,0% | 44 |
| | D | 30 | 53,3% | 60 |
| | 0 | 24 | 33,3% | 74 |
| | Totale | 56 | 44,6% | 65 |

| | | |
|--------|------|-------|
| Totale | 3052 | 95,5% |
|--------|------|-------|