

101 - della Lunigiana

| Prestazioni diagnostica | Priorità | N Prestazioni | % Garanzia tempi attesa I disponibilità | Giorni di attesa I disp | % Priorità |
|--|----------|---------------|---|-------------------------|------------|
| TC delTorace | B | 18 | 38,9% | 17 | 40,0% |
| | D | 24 | 95,8% | 34 | 53,3% |
| | P | 3 | 100,0% | 24 | 6,7% |
| | Totale | 45 | 73,3% | 27 | 100,0% |
| TC delTorace senza e con MDC | B | 17 | 29,4% | 17 | 41,5% |
| | D | 21 | 100,0% | 21 | 51,2% |
| | P | 3 | 100,0% | 49 | 7,3% |
| | Totale | 41 | 70,7% | 21 | 100,0% |
| TC dell Addome superiore senza e con MDC | D | 2 | 100,0% | 14 | 100,0% |
| | Totale | 2 | 100,0% | 14 | 100,0% |
| TC dell Addome inferiore | B | 1 | | 11 | 100,0% |
| | Totale | 1 | | 11 | 100,0% |
| TC dell Addome inferiore senza e con MDC | D | 2 | 100,0% | 29 | 100,0% |
| | Totale | 2 | 100,0% | 29 | 100,0% |
| TC dell Addome completo | B | 6 | 66,7% | 13 | 35,3% |
| | D | 9 | 100,0% | 34 | 52,9% |
| | P | 1 | 100,0% | 48 | 5,9% |
| | 0 | 1 | 100,0% | 39 | 5,9% |
| | Totale | 17 | 88,2% | 28 | 100,0% |
| TC dell Addome completo senza e con MDC | B | 20 | 15,0% | 21 | 40,8% |
| | D | 25 | 100,0% | 21 | 51,0% |
| | P | 4 | 100,0% | 40 | 8,2% |
| | Totale | 49 | 65,3% | 23 | 100,0% |
| TC del Capo | B | 21 | 33,3% | 16 | 47,7% |
| | D | 20 | 95,0% | 39 | 45,5% |
| | 0 | 3 | 100,0% | 44 | 6,8% |
| | Totale | 44 | 65,9% | 28 | 100,0% |
| TC del Capo senza e con MDC | B | 3 | | 23 | 25,0% |
| | D | 8 | 100,0% | 21 | 66,7% |
| | P | 1 | 100,0% | 55 | 8,3% |
| | Totale | 12 | 75,0% | 24 | 100,0% |
| TC del Rachide e dello speco vertebrale | B | 10 | 30,0% | 20 | 26,3% |
| | D | 25 | 96,0% | 32 | 65,8% |
| | P | 1 | 100,0% | 42 | 2,6% |

| | | | | | |
|--|--------|-----|--------|-----|--------|
| | 0 | 2 | 100,0% | 48 | 5,3% |
| | Totale | 38 | 78,9% | 30 | 100,0% |
| TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC | B | 1 | | 28 | 100,0% |
| | Totale | 1 | | 28 | 100,0% |
| TC di Bacino e articolazioni sacroiliache | D | 1 | 100,0% | 31 | 100,0% |
| | Totale | 1 | 100,0% | 31 | 100,0% |
| RM dell Encefalo e del tronco encefalico | B | 1 | 100,0% | 7 | 6,3% |
| | D | 14 | 100,0% | 45 | 87,5% |
| | 0 | 1 | 100,0% | 52 | 6,3% |
| | Totale | 16 | 100,0% | 43 | 100,0% |
| RM di addome inferiore e scavo pelvico | D | 1 | 100,0% | 6 | 100,0% |
| | Totale | 1 | 100,0% | 6 | 100,0% |
| RM della Colonna | B | 4 | 100,0% | 4 | 11,4% |
| | D | 31 | 100,0% | 50 | 88,6% |
| | Totale | 35 | 100,0% | 45 | 100,0% |
| RM Muscoloscheletrica | B | 16 | 62,5% | 11 | 16,3% |
| | D | 72 | 77,8% | 39 | 73,5% |
| | P | 8 | 100,0% | 37 | 8,2% |
| | 0 | 2 | 100,0% | 15 | 2,0% |
| | Totale | 98 | 77,6% | 34 | 100,0% |
| Eco(color)dopplergrafia cardiaca | B | 6 | 50,0% | 16 | 18,2% |
| | D | 23 | 4,3% | 118 | 69,7% |
| | P | 3 | 100,0% | 86 | 9,1% |
| | 0 | 1 | | 137 | 3,0% |
| | Totale | 33 | 21,2% | 97 | 100,0% |
| Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici | B | 12 | 33,3% | 11 | 11,7% |
| | D | 83 | 28,9% | 187 | 80,6% |
| | 0 | 8 | 50,0% | 135 | 7,8% |
| | Totale | 103 | 31,1% | 163 | 100,0% |
| Diagnostica ecografica del Capo e del collo | B | 20 | 100,0% | 1 | 20,2% |
| | D | 59 | 98,3% | 12 | 59,6% |
| | P | 4 | 100,0% | 44 | 4,0% |
| | 0 | 16 | 87,5% | 17 | 16,2% |
| | Totale | 99 | 97,0% | 12 | 100,0% |
| Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo) | B | 68 | 58,8% | 14 | 24,4% |
| | D | 187 | 33,2% | 50 | 67,0% |
| | P | 6 | 66,7% | 90 | 2,2% |
| | 0 | 18 | 22,2% | 48 | 6,5% |
| | Totale | 279 | 39,4% | 42 | 100,0% |
| Ecografia Ostetrica | P | 35 | 100,0% | 4 | 94,6% |
| | 0 | 2 | 100,0% | 0 | 5,4% |

| | | | | | |
|---|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|
| | Totale | 37 | 100,0% | 3 | 100,0% |
| Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa | D | 7 | 100,0% | 25 | 100,0% |
| | Totale | 7 | 100,0% | 25 | 100,0% |
| Colonscopia | B | 14 | 21,4% | 16 | 29,2% |
| | D | 31 | 19,4% | 91 | 64,6% |
| | P | 1 | | 146 | 2,1% |
| | 0 | 2 | | 122 | 4,2% |
| | Totale | 48 | 18,8% | 72 | 100,0% |
| Esofago-gastroduodenoscopia | B | 15 | 100,0% | 4 | 33,3% |
| | D | 25 | 72,0% | 19 | 55,6% |
| | P | 4 | 50,0% | 95 | 8,9% |
| | 0 | 1 | | 70 | 2,2% |
| | Totale | 45 | 77,8% | 22 | 100,0% |
| Elettrocardiogramma | B | 45 | 93,3% | 2 | 17,6% |
| | D | 165 | 93,3% | 9 | 64,5% |
| | P | 15 | 100,0% | 1 | 5,9% |
| | 0 | 31 | 100,0% | 0 | 12,1% |
| | Totale | 256 | 94,5% | 6 | 100,0% |
| Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | B | 3 | 100,0% | 1 | 4,1% |
| | D | 60 | 48,3% | 31 | 81,1% |
| | P | 11 | 100,0% | 21 | 14,9% |
| | Totale | 74 | 58,1% | 28 | 100,0% |
| Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro | D | 20 | 30,0% | 68 | 74,1% |
| | P | 2 | 100,0% | 77 | 7,4% |
| | 0 | 5 | 60,0% | 33 | 18,5% |
| | Totale | 27 | 40,7% | 62 | 100,0% |
| Esame audiometrico tonale | B | 4 | 100,0% | 3 | 16,7% |
| | D | 20 | 35,0% | 55 | 83,3% |
| | Totale | 24 | 45,8% | 46 | 100,0% |
| Esame del fundus oculi | B | 1 | 100,0% | 5 | 6,7% |
| | D | 10 | 70,0% | 19 | 66,7% |
| | P | 2 | 100,0% | 16 | 13,3% |
| | 0 | 2 | 100,0% | 0 | 13,3% |
| | Totale | 15 | 80,0% | 15 | 100,0% |
| Totale | | 1450 | 66,3% | | |

101 - delle Apuane

| Prestazioni diagnostica | Priorità | N Prestazioni | % Garanzia tempi attesa I disponibilità | Giorni di attesa I disp | % Priorità |
|-------------------------|----------|---------------|---|-------------------------|------------|
|-------------------------|----------|---------------|---|-------------------------|------------|

| | | | | | |
|--|--------|-----|--------|-----|--------|
| Mammografia bilaterale | B | 12 | 100,0% | 3 | 9,2% |
| | D | 99 | 72,7% | 40 | 76,2% |
| | P | 18 | 88,9% | 26 | 13,8% |
| | 0 | 1 | 100,0% | 3 | 0,8% |
| | Totale | 130 | 77,7% | 34 | 100,0% |
| Mammografia monolaterale | D | 4 | 100,0% | 2 | 66,7% |
| | P | 2 | 50,0% | 101 | 33,3% |
| | Totale | 6 | 83,3% | 35 | 100,0% |
| TC delTorace | B | 22 | 77,3% | 10 | 40,7% |
| | D | 31 | 100,0% | 31 | 57,4% |
| | 0 | 1 | 100,0% | 38 | 1,9% |
| | Totale | 54 | 90,7% | 22 | 100,0% |
| TC delTorace senza e con MDC | B | 12 | 91,7% | 9 | 26,1% |
| | D | 26 | 100,0% | 23 | 56,5% |
| | P | 7 | 100,0% | 54 | 15,2% |
| | 0 | 1 | 100,0% | 0 | 2,2% |
| | Totale | 46 | 97,8% | 23 | 100,0% |
| TC dell Addome superiore | B | 1 | | 12 | 100,0% |
| | Totale | 1 | | 12 | 100,0% |
| TC dell Addome superiore senza e con MDC | D | 2 | 100,0% | 29 | 100,0% |
| | Totale | 2 | 100,0% | 29 | 100,0% |
| TC dell Addome inferiore | D | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% |
| | Totale | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% |
| TC dell Addome completo | B | 3 | 100,0% | 10 | 23,1% |
| | D | 9 | 100,0% | 33 | 69,2% |
| | 0 | 1 | 100,0% | 35 | 7,7% |
| | Totale | 13 | 100,0% | 28 | 100,0% |
| TC dell Addome completo senza e con MDC | B | 31 | 83,9% | 8 | 41,9% |
| | D | 28 | 96,4% | 23 | 37,8% |
| | P | 12 | 100,0% | 45 | 16,2% |
| | 0 | 3 | 100,0% | 17 | 4,1% |
| | Totale | 74 | 91,9% | 20 | 100,0% |
| TC del Capo | B | 11 | 72,7% | 10 | 25,0% |
| | D | 33 | 100,0% | 41 | 75,0% |
| | Totale | 44 | 93,2% | 33 | 100,0% |
| TC del Capo senza e con MDC | B | 4 | 75,0% | 8 | 18,2% |
| | D | 13 | 76,9% | 59 | 59,1% |
| | P | 4 | 100,0% | 21 | 18,2% |
| | 0 | 1 | 100,0% | 46 | 4,5% |
| | Totale | 22 | 81,8% | 42 | 100,0% |
| | B | 7 | 71,4% | 10 | 23,3% |

| | | | | | |
|---|--------|-----|--------|-----|--------|
| TC del Rachide e dello speco vertebrale | D | 23 | 100,0% | 37 | 76,7% |
| | Totale | 30 | 93,3% | 31 | 100,0% |
| RM dell Encefalo e del tronco encefalico | B | 20 | 100,0% | 6 | 29,9% |
| | D | 46 | 78,3% | 66 | 68,7% |
| | 0 | 1 | 100,0% | 50 | 1,5% |
| | Totale | 67 | 85,1% | 48 | 100,0% |
| RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC | B | 42 | 100,0% | 5 | 41,2% |
| | D | 55 | 98,2% | 29 | 53,9% |
| | P | 2 | 100,0% | 7 | 2,0% |
| | 0 | 3 | 100,0% | 24 | 2,9% |
| | Totale | 102 | 99,0% | 18 | 100,0% |
| RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC, o diffusione in eta evolutiva anni 0-10 | D | 1 | | 174 | 100,0% |
| | Totale | 1 | | 174 | 100,0% |
| RM di addome inferiore e scavo pelvico | B | 3 | 100,0% | 9 | 50,0% |
| | D | 3 | 100,0% | 34 | 50,0% |
| | Totale | 6 | 100,0% | 21 | 100,0% |
| RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC | B | 11 | 100,0% | 6 | 40,7% |
| | D | 14 | 100,0% | 36 | 51,9% |
| | P | 2 | 100,0% | 20 | 7,4% |
| | Totale | 27 | 100,0% | 22 | 100,0% |
| RM della Colonna | B | 122 | 96,7% | 7 | 39,0% |
| | D | 184 | 85,3% | 57 | 58,8% |
| | 0 | 7 | 100,0% | 31 | 2,2% |
| | Totale | 313 | 90,1% | 37 | 100,0% |
| RM della Colonna senza e con MDC | B | 7 | 100,0% | 6 | 36,8% |
| | D | 11 | 100,0% | 27 | 57,9% |
| | 0 | 1 | 100,0% | 13 | 5,3% |
| | Totale | 19 | 100,0% | 18 | 100,0% |
| RM Muscoloscheletrica | B | 62 | 83,9% | 9 | 45,9% |
| | D | 70 | 80,0% | 60 | 51,9% |
| | 0 | 3 | 100,0% | 45 | 2,2% |
| | Totale | 135 | 82,2% | 36 | 100,0% |
| RM Muscoloscheletrica senza e con MDC | B | 8 | 87,5% | 3 | 42,1% |
| | D | 11 | 90,9% | 31 | 57,9% |
| | Totale | 19 | 89,5% | 19 | 100,0% |
| Eco(color)dopplergrafia cardiaca | B | 98 | 82,7% | 8 | 23,0% |
| | D | 277 | 28,9% | 70 | 65,0% |
| | P | 33 | 87,9% | 54 | 7,7% |
| | 0 | 18 | 44,4% | 48 | 4,2% |
| | Totale | 426 | 46,5% | 53 | 100,0% |
| | B | 29 | 58,6% | 10 | 14,9% |

| | | | | | |
|--|--------|-----|--------|-----|--------|
| Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici | D | 151 | 49,7% | 80 | 77,4% |
| | P | 9 | 11,1% | 311 | 4,6% |
| | 0 | 6 | 83,3% | 79 | 3,1% |
| | Totale | 195 | 50,3% | 80 | 100,0% |
| Diagnostica ecografica del Capo e del collo | B | 19 | 100,0% | 2 | 11,2% |
| | D | 138 | 96,4% | 15 | 81,7% |
| | P | 1 | 100,0% | 2 | 0,6% |
| | 0 | 11 | 63,6% | 23 | 6,5% |
| | Totale | 169 | 94,7% | 14 | 100,0% |
| Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo) | B | 48 | 89,6% | 11 | 12,0% |
| | D | 340 | 17,6% | 52 | 84,8% |
| | P | 6 | 66,7% | 61 | 1,5% |
| | 0 | 7 | 42,9% | 34 | 1,7% |
| | Totale | 401 | 27,4% | 47 | 100,0% |
| Ecografia della Mammella bilaterale | U | 3 | 100,0% | 3 | 2,7% |
| | B | 41 | 100,0% | 2 | 36,3% |
| | D | 65 | 38,5% | 58 | 57,5% |
| | P | 3 | 66,7% | 50 | 2,7% |
| | 0 | 1 | | 60 | 0,9% |
| | Totale | 113 | 62,8% | 36 | 100,0% |
| Ecografia della Mammella monolaterale | B | 3 | 100,0% | 1 | 50,0% |
| | D | 3 | 33,3% | 70 | 50,0% |
| | Totale | 6 | 66,7% | 36 | 100,0% |
| Ecografia Ostetrica | D | 2 | 100,0% | 2 | 1,0% |
| | P | 200 | 99,0% | 7 | 99,0% |
| | Totale | 202 | 99,0% | 7 | 100,0% |
| Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa | B | 43 | 34,9% | 17 | 22,2% |
| | D | 140 | 39,3% | 97 | 72,2% |
| | P | 6 | 33,3% | 212 | 3,1% |
| | 0 | 5 | 20,0% | 158 | 2,6% |
| | Totale | 194 | 37,6% | 84 | 100,0% |
| Colonscopia | U | 1 | 100,0% | 0 | 0,5% |
| | B | 66 | 33,3% | 16 | 32,5% |
| | D | 128 | 25,0% | 73 | 63,1% |
| | P | 7 | 28,6% | 241 | 3,4% |
| | 0 | 1 | | 69 | 0,5% |
| | Totale | 203 | 28,1% | 60 | 100,0% |
| Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile | B | 1 | | 20 | 100,0% |
| | Totale | 1 | | 20 | 100,0% |
| Esofago-gastroduodenoscopia | B | 52 | 75,0% | 8 | 30,8% |
| | D | 111 | 45,0% | 52 | 65,7% |
| | P | 2 | 50,0% | 105 | 1,2% |

| | | | | | |
|---|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|
| | 0 | 4 | 50,0% | 67 | 2,4% |
| | Totale | 169 | 54,4% | 39 | 100,0% |
| Elettrocardiogramma | B | 218 | 95,4% | 2 | 21,2% |
| | D | 649 | 89,2% | 12 | 63,0% |
| | P | 100 | 98,0% | 9 | 9,7% |
| | 0 | 63 | 84,1% | 14 | 6,1% |
| | Totale | 1030 | 91,1% | 9 | 100,0% |
| Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | B | 38 | 97,4% | 4 | 30,6% |
| | D | 73 | 35,6% | 52 | 58,9% |
| | P | 10 | 80,0% | 55 | 8,1% |
| | 0 | 3 | 100,0% | 8 | 2,4% |
| | Totale | 124 | 59,7% | 36 | 100,0% |
| Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro | B | 16 | 25,0% | 14 | 26,7% |
| | D | 41 | 12,2% | 67 | 68,3% |
| | P | 1 | 100,0% | 77 | 1,7% |
| | 0 | 2 | 50,0% | 40 | 3,3% |
| | Totale | 60 | 18,3% | 52 | 100,0% |
| Esame audiometrico tonale | B | 4 | 75,0% | 4 | 2,1% |
| | D | 141 | 50,4% | 38 | 73,4% |
| | P | 20 | 55,0% | 66 | 10,4% |
| | 0 | 27 | 40,7% | 86 | 14,1% |
| | Totale | 192 | 50,0% | 47 | 100,0% |
| Fotografia del fundus | D | 4 | 100,0% | 16 | 100,0% |
| | Totale | 4 | 100,0% | 16 | 100,0% |
| Esame del fundus oculi | B | 3 | 100,0% | 4 | 2,6% |
| | D | 88 | 60,2% | 21 | 76,5% |
| | P | 9 | 100,0% | 16 | 7,8% |
| | 0 | 15 | 60,0% | 19 | 13,0% |
| | Totale | 115 | 64,3% | 20 | 100,0% |
| Elettromiografia semplice | B | 92 | 34,8% | 13 | 22,1% |
| | D | 308 | 7,8% | 119 | 74,0% |
| | 0 | 16 | | 142 | 3,8% |
| | Totale | 416 | 13,5% | 96 | 100,0% |
| Totale | | 5132 | 64,4% | | |

102 - della Piana di Lucca

| Prestazioni diagnostica | Priorità | N Prestazioni | % Garanzia tempi attesa I disponibilità | Giorni di attesa I disp | % Priorità |
|-------------------------|----------|---------------|---|-------------------------|------------|
| | U | 1 | 100,0% | 1 | 0,4% |

| | | | | | |
|--|--------|-----|--------|-----|--------|
| Mammografia bilaterale | B | 14 | 50,0% | 10 | 5,4% |
| | D | 115 | 60,9% | 68 | 44,6% |
| | P | 48 | 27,1% | 220 | 18,6% |
| | 0 | 80 | 62,5% | 103 | 31,0% |
| | Totale | 258 | 54,7% | 104 | 100,0% |
| Mammografia monolaterale | D | 2 | | 106 | 22,2% |
| | P | 1 | | 187 | 11,1% |
| | 0 | 6 | 50,0% | 86 | 66,7% |
| | Totale | 9 | 33,3% | 102 | 100,0% |
| TC delTorace | B | 54 | 70,4% | 8 | 32,3% |
| | D | 63 | 100,0% | 27 | 37,7% |
| | P | 2 | 100,0% | 21 | 1,2% |
| | 0 | 48 | 100,0% | 28 | 28,7% |
| | Totale | 167 | 90,4% | 21 | 100,0% |
| TC delTorace senza e con MDC | B | 44 | 59,1% | 11 | 32,6% |
| | D | 35 | 100,0% | 26 | 25,9% |
| | P | 4 | 75,0% | 85 | 3,0% |
| | 0 | 52 | 94,2% | 26 | 38,5% |
| | Totale | 135 | 83,7% | 23 | 100,0% |
| TC dell Addome superiore | D | 2 | 100,0% | 3 | 100,0% |
| | Totale | 2 | 100,0% | 3 | 100,0% |
| TC dell Addome superiore senza e con MDC | B | 4 | 50,0% | 13 | 57,1% |
| | D | 2 | 50,0% | 96 | 28,6% |
| | 0 | 1 | 100,0% | 10 | 14,3% |
| | Totale | 7 | 57,1% | 36 | 100,0% |
| TC dell Addome inferiore | B | 1 | 100,0% | 10 | 25,0% |
| | D | 1 | 100,0% | 34 | 25,0% |
| | P | 1 | 100,0% | 11 | 25,0% |
| | 0 | 1 | 100,0% | 3 | 25,0% |
| | Totale | 4 | 100,0% | 15 | 100,0% |
| TC dell Addome inferiore senza e con MDC | B | 2 | 50,0% | 11 | 40,0% |
| | 0 | 3 | 100,0% | 24 | 60,0% |
| | Totale | 5 | 80,0% | 18 | 100,0% |
| TC dell Addome completo | B | 9 | 77,8% | 9 | 34,6% |
| | D | 9 | 100,0% | 22 | 34,6% |
| | P | 1 | 100,0% | 0 | 3,8% |
| | 0 | 7 | 100,0% | 25 | 26,9% |
| | Totale | 26 | 92,3% | 17 | 100,0% |
| TC dell Addome completo senza e con MDC | B | 38 | 57,9% | 10 | 25,2% |
| | D | 44 | 100,0% | 29 | 29,1% |
| | P | 9 | 100,0% | 44 | 6,0% |
| | 0 | 60 | 95,0% | 25 | 39,7% |

| | | | | | |
|---|---------------|------------|---------------|-----------|---------------|
| | Totale | 151 | 87,4% | 24 | 100,0% |
| TC del Capo | B | 29 | 82,8% | 7 | 28,2% |
| | D | 47 | 100,0% | 25 | 45,6% |
| | P | 8 | 100,0% | 34 | 7,8% |
| | 0 | 19 | 100,0% | 21 | 18,4% |
| | Totale | 103 | 95,1% | 20 | 100,0% |
| TC del Capo senza e con MDC | B | 4 | 50,0% | 8 | 12,9% |
| | D | 6 | 100,0% | 25 | 19,4% |
| | P | 4 | 100,0% | 45 | 12,9% |
| | 0 | 17 | 88,2% | 30 | 54,8% |
| | Totale | 31 | 87,1% | 28 | 100,0% |
| TC del Rachide e dello speco vertebrale | B | 15 | 53,3% | 9 | 20,0% |
| | D | 41 | 100,0% | 25 | 54,7% |
| | P | 3 | 100,0% | 48 | 4,0% |
| | 0 | 16 | 100,0% | 26 | 21,3% |
| | Totale | 75 | 90,7% | 23 | 100,0% |
| TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC | 0 | 1 | 100,0% | 2 | 100,0% |
| | Totale | 1 | 100,0% | 2 | 100,0% |
| TC di Bacino e articolazioni sacroiliache | B | 3 | 66,7% | 4 | 60,0% |
| | 0 | 2 | 100,0% | 8 | 40,0% |
| | Totale | 5 | 80,0% | 6 | 100,0% |
| RM dell Encefalo e del tronco encefalico | B | 43 | 97,7% | 7 | 24,0% |
| | D | 107 | 82,2% | 43 | 59,8% |
| | P | 1 | 100,0% | 4 | 0,6% |
| | 0 | 28 | 89,3% | 39 | 15,6% |
| | Totale | 179 | 87,2% | 33 | 100,0% |
| RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC | B | 36 | 80,6% | 10 | 19,6% |
| | D | 70 | 98,6% | 28 | 38,0% |
| | P | 7 | | 331 | 3,8% |
| | 0 | 71 | 85,9% | 61 | 38,6% |
| | Totale | 184 | 86,4% | 49 | 100,0% |
| RM di addome inferiore e scavo pelvico | B | 1 | 100,0% | 9 | 33,3% |
| | D | 2 | 100,0% | 30 | 66,7% |
| | Totale | 3 | 100,0% | 23 | 100,0% |
| RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC | B | 3 | 33,3% | 16 | 25,0% |
| | D | 6 | 16,7% | 90 | 50,0% |
| | 0 | 3 | 33,3% | 84 | 25,0% |
| | Totale | 12 | 25,0% | 70 | 100,0% |
| | U | 1 | 100,0% | 2 | 0,1% |
| | B | 149 | 98,0% | 6 | 20,6% |
| | D | 414 | 89,6% | 40 | 57,3% |

| | | | | | |
|--|--------|------|--------|-----|--------|
| RM della Colonna | P | 45 | 86,7% | 74 | 6,2% |
| | 0 | 114 | 84,2% | 37 | 15,8% |
| | Totale | 723 | 90,3% | 35 | 100,0% |
| | | | | | |
| RM della Colonna senza e con MDC | B | 19 | 63,2% | 11 | 31,1% |
| | D | 7 | 57,1% | 47 | 11,5% |
| | P | 2 | | 149 | 3,3% |
| | 0 | 33 | 90,9% | 43 | 54,1% |
| | Totale | 61 | 75,4% | 37 | 100,0% |
| | | | | | |
| RM Muscoloscheletrica | B | 95 | 80,0% | 8 | 18,6% |
| | D | 303 | 65,7% | 46 | 59,3% |
| | P | 41 | 85,4% | 61 | 8,0% |
| | 0 | 72 | 75,0% | 38 | 14,1% |
| | Totale | 511 | 71,2% | 39 | 100,0% |
| | | | | | |
| RM Muscoloscheletrica senza e con MDC | B | 5 | 40,0% | 15 | 45,5% |
| | D | 5 | 40,0% | 84 | 45,5% |
| | 0 | 1 | 100,0% | 3 | 9,1% |
| | Totale | 11 | 45,5% | 45 | 100,0% |
| | | | | | |
| Eco(color)dopplergrafia cardiaca | B | 75 | 96,0% | 6 | 11,2% |
| | D | 394 | 95,4% | 15 | 59,1% |
| | P | 31 | 90,3% | 59 | 4,6% |
| | 0 | 167 | 91,6% | 22 | 25,0% |
| | Totale | 667 | 94,3% | 18 | 100,0% |
| | | | | | |
| Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici | B | 26 | 100,0% | 5 | 3,1% |
| | D | 528 | 90,0% | 32 | 63,6% |
| | P | 75 | 82,7% | 60 | 9,0% |
| | 0 | 201 | 90,0% | 30 | 24,2% |
| | Totale | 830 | 89,6% | 33 | 100,0% |
| | | | | | |
| Diagnostica ecografica del Capo e del collo | B | 64 | 96,9% | 5 | 9,7% |
| | D | 321 | 82,2% | 16 | 48,4% |
| | P | 65 | 100,0% | 21 | 9,8% |
| | 0 | 213 | 92,0% | 14 | 32,1% |
| | Totale | 663 | 88,5% | 15 | 100,0% |
| | | | | | |
| Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo) | U | 1 | 100,0% | 1 | 0,1% |
| | B | 215 | 96,7% | 5 | 17,2% |
| | D | 634 | 60,4% | 26 | 50,6% |
| | P | 114 | 97,4% | 51 | 9,1% |
| | 0 | 288 | 56,6% | 33 | 23,0% |
| | Totale | 1252 | 69,2% | 26 | 100,0% |
| | | | | | |
| Ecografia della Mammella bilaterale | B | 27 | 29,6% | 21 | 15,6% |
| | D | 57 | 12,3% | 71 | 32,9% |
| | P | 24 | 29,2% | 270 | 13,9% |
| | 0 | 65 | 23,1% | 201 | 37,6% |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | Totale | 173 | 21,4% | 139 | 100,0% |
| Ecografia della Mammella monolaterale | B | 1 | 100,0% | 10 | 100,0% |
| | Totale | 1 | 100,0% | 10 | 100,0% |
| Ecografia Ostetrica | D | 2 | 100,0% | 4 | 1,4% |
| | P | 39 | 100,0% | 5 | 26,7% |
| | 0 | 105 | 82,9% | 19 | 71,9% |
| | Totale | 146 | 87,7% | 15 | 100,0% |
| Ecografia Ginecologica | D | 4 | 50,0% | 26 | 50,0% |
| | P | 3 | 100,0% | 18 | 37,5% |
| | 0 | 1 | 100,0% | 1 | 12,5% |
| | Totale | 8 | 75,0% | 20 | 100,0% |
| Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa | U | 7 | 100,0% | 0 | 1,2% |
| | B | 126 | 96,8% | 7 | 21,0% |
| | D | 292 | 69,5% | 45 | 48,6% |
| | P | 48 | 89,6% | 53 | 8,0% |
| | 0 | 128 | 91,4% | 29 | 21,3% |
| | Totale | 601 | 81,9% | 34 | 100,0% |
| Colonscopia | B | 108 | 57,4% | 9 | 29,5% |
| | D | 183 | 35,5% | 46 | 50,0% |
| | P | 17 | 64,7% | 117 | 4,6% |
| | 0 | 58 | 50,0% | 59 | 15,8% |
| | Totale | 366 | 45,6% | 40 | 100,0% |
| Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile | B | 2 | 50,0% | 14 | 66,7% |
| | 0 | 1 | 100,0% | 13 | 33,3% |
| | Totale | 3 | 66,7% | 13 | 100,0% |
| Esofago-gastroduodenoscopia | B | 69 | 76,8% | 8 | 34,8% |
| | D | 86 | 24,4% | 82 | 43,4% |
| | P | 7 | 42,9% | 150 | 3,5% |
| | 0 | 36 | 66,7% | 58 | 18,2% |
| | Totale | 198 | 51,0% | 54 | 100,0% |
| Elettrocardiogramma | B | 147 | 98,6% | 1 | 15,7% |
| | D | 530 | 99,1% | 2 | 56,6% |
| | P | 66 | 100,0% | 2 | 7,0% |
| | 0 | 194 | 98,5% | 2 | 20,7% |
| | Totale | 937 | 98,9% | 2 | 100,0% |
| Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | B | 47 | 76,6% | 8 | 26,1% |
| | D | 94 | 33,0% | 44 | 52,2% |
| | P | 13 | 69,2% | 83 | 7,2% |
| | 0 | 26 | 38,5% | 60 | 14,4% |
| | Totale | 180 | 47,8% | 40 | 100,0% |
| | B | 15 | 6,7% | 19 | 23,4% |

| | | | | | |
|---|--------|------|--------|-----|--------|
| Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro | D | 39 | 43,6% | 77 | 60,9% |
| | P | 1 | | 393 | 1,6% |
| | 0 | 9 | 44,4% | 96 | 14,1% |
| | Totale | 64 | 34,4% | 71 | 100,0% |
| Esame audiometrico tonale | B | 4 | 50,0% | 6 | 2,5% |
| | D | 46 | 82,6% | 34 | 28,2% |
| | P | 35 | 97,1% | 14 | 21,5% |
| | 0 | 78 | 97,4% | 12 | 47,9% |
| | Totale | 163 | 92,0% | 18 | 100,0% |
| Spirometria semplice | B | 1 | | 12 | 4,2% |
| | D | 21 | 14,3% | 121 | 87,5% |
| | 0 | 2 | | 147 | 8,3% |
| | Totale | 24 | 12,5% | 119 | 100,0% |
| Spirometria globale | B | 18 | 11,1% | 16 | 21,2% |
| | D | 44 | 95,5% | 32 | 51,8% |
| | P | 5 | 100,0% | 31 | 5,9% |
| | 0 | 18 | 94,4% | 29 | 21,2% |
| | Totale | 85 | 77,6% | 28 | 100,0% |
| Fotografia del fundus | D | 2 | 100,0% | 6 | 50,0% |
| | P | 2 | 100,0% | 49 | 50,0% |
| | Totale | 4 | 100,0% | 28 | 100,0% |
| Esame del fundus oculi | B | 1 | 100,0% | 7 | 4,0% |
| | D | 8 | 100,0% | 10 | 32,0% |
| | P | 2 | 100,0% | 18 | 8,0% |
| | 0 | 14 | 100,0% | 11 | 56,0% |
| | Totale | 25 | 100,0% | 11 | 100,0% |
| Elettromiografia semplice | B | 92 | 73,9% | 10 | 17,7% |
| | D | 364 | 72,5% | 54 | 70,0% |
| | 0 | 64 | 93,8% | 25 | 12,3% |
| | Totale | 520 | 75,4% | 43 | 100,0% |
| Totale | | 9573 | 79,4% | | |

102 - della Valle del Serchio

| Prestazioni diagnostica | Priorità | N Prestazioni | % Garanzia tempi attesa I disponibilità | Giorni di attesa I disp | % Priorità |
|-------------------------|----------|---------------|---|-------------------------|------------|
| Mammografia bilaterale | B | 2 | 50,0% | 10 | 10,0% |
| | D | 11 | 100,0% | 22 | 55,0% |
| | 0 | 7 | 57,1% | 50 | 35,0% |
| | Totale | 20 | 80,0% | 31 | 100,0% |

| | | | | | |
|---|--------|----|--------|-----|--------|
| TC delTorace | B | 4 | 100,0% | 9 | 28,6% |
| | D | 3 | 100,0% | 27 | 21,4% |
| | P | 2 | 50,0% | 84 | 14,3% |
| | 0 | 5 | 80,0% | 41 | 35,7% |
| | Totale | 14 | 85,7% | 35 | 100,0% |
| TC delTorace senza e con MDC | B | 3 | 100,0% | 8 | 50,0% |
| | D | 2 | 50,0% | 94 | 33,3% |
| | 0 | 1 | 100,0% | 10 | 16,7% |
| | Totale | 6 | 83,3% | 37 | 100,0% |
| TC dell Addome inferiore senza e con MDC | D | 2 | 50,0% | 97 | 100,0% |
| | Totale | 2 | 50,0% | 97 | 100,0% |
| TC dell Addome completo | B | 2 | 100,0% | 10 | 100,0% |
| | Totale | 2 | 100,0% | 10 | 100,0% |
| TC dell Addome completo senza e con MDC | B | 1 | 100,0% | 9 | 25,0% |
| | D | 3 | | 144 | 75,0% |
| | Totale | 4 | 25,0% | 111 | 100,0% |
| TC del Capo | B | 3 | 100,0% | 3 | 16,7% |
| | D | 12 | 83,3% | 38 | 66,7% |
| | P | 2 | 50,0% | 141 | 11,1% |
| | 0 | 1 | 100,0% | 1 | 5,6% |
| | Totale | 18 | 83,3% | 41 | 100,0% |
| TC del Rachide e dello speco vertebrale | B | 2 | 50,0% | 10 | 28,6% |
| | D | 4 | 50,0% | 52 | 57,1% |
| | P | 1 | | 157 | 14,3% |
| | Totale | 7 | 42,9% | 55 | 100,0% |
| TC di Bacino e articolazioni sacroiliache | 0 | 1 | 100,0% | 2 | 100,0% |
| | Totale | 1 | 100,0% | 2 | 100,0% |
| Eco(color)dopplergrafia cardiaca | B | 2 | 100,0% | 10 | 5,3% |
| | D | 23 | 87,0% | 15 | 60,5% |
| | P | 1 | 100,0% | 93 | 2,6% |
| | 0 | 12 | 91,7% | 21 | 31,6% |
| | Totale | 38 | 89,5% | 19 | 100,0% |
| Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici | B | 12 | 100,0% | 6 | 44,4% |
| | D | 7 | 100,0% | 14 | 25,9% |
| | 0 | 8 | 100,0% | 8 | 29,6% |
| | Totale | 27 | 100,0% | 9 | 100,0% |
| Diagnostica ecografica del Capo e del collo | B | 4 | 100,0% | 6 | 4,3% |
| | D | 33 | 84,8% | 12 | 35,9% |
| | P | 5 | 100,0% | 23 | 5,4% |
| | 0 | 50 | 84,0% | 17 | 54,3% |
| | Totale | 92 | 85,9% | 15 | 100,0% |

| | | | | | |
|--|--------|-----|--------|-----|--------|
| Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo) | B | 28 | 100,0% | 5 | 47,5% |
| | D | 10 | 30,0% | 101 | 16,9% |
| | 0 | 21 | 52,4% | 71 | 35,6% |
| | Totale | 59 | 71,2% | 45 | 100,0% |
| Ecografia Ostetrica | P | 54 | 100,0% | 5 | 77,1% |
| | 0 | 16 | 75,0% | 19 | 22,9% |
| | Totale | 70 | 94,3% | 8 | 100,0% |
| Ecografia Ginecologica | B | 7 | 57,1% | 9 | 31,8% |
| | D | 11 | 18,2% | 38 | 50,0% |
| | P | 3 | 100,0% | 30 | 13,6% |
| | 0 | 1 | 100,0% | 6 | 4,5% |
| | Totale | 22 | 45,5% | 26 | 100,0% |
| Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa | B | 17 | 100,0% | 6 | 68,0% |
| | D | 5 | 100,0% | 27 | 20,0% |
| | 0 | 3 | 100,0% | 25 | 12,0% |
| | Totale | 25 | 100,0% | 13 | 100,0% |
| Colonscopia | B | 1 | 100,0% | 1 | 2,3% |
| | D | 18 | 27,8% | 91 | 40,9% |
| | P | 1 | 100,0% | 1 | 2,3% |
| | 0 | 24 | 83,3% | 21 | 54,5% |
| | Totale | 44 | 61,4% | 49 | 100,0% |
| Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile | D | 1 | | 97 | 100,0% |
| | Totale | 1 | | 97 | 100,0% |
| Esofago-gastroduodenoscopia | B | 2 | 50,0% | 7 | 5,4% |
| | D | 23 | 34,8% | 39 | 62,2% |
| | P | 4 | 100,0% | 18 | 10,8% |
| | 0 | 8 | 75,0% | 29 | 21,6% |
| | Totale | 37 | 51,4% | 33 | 100,0% |
| Elettrocardiogramma | B | 40 | 100,0% | 1 | 15,1% |
| | D | 120 | 100,0% | 1 | 45,3% |
| | P | 17 | 100,0% | 4 | 6,4% |
| | 0 | 88 | 100,0% | 1 | 33,2% |
| | Totale | 265 | 100,0% | 1 | 100,0% |
| Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | B | 5 | 40,0% | 14 | 5,7% |
| | D | 51 | 21,6% | 46 | 58,0% |
| | P | 6 | 100,0% | 45 | 6,8% |
| | 0 | 26 | 30,8% | 43 | 29,5% |
| | Totale | 88 | 30,7% | 43 | 100,0% |
| Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro | D | 7 | | 118 | 35,0% |
| | P | 3 | 33,3% | 94 | 15,0% |
| | 0 | 10 | | 123 | 50,0% |
| | Totale | 20 | 5,0% | 117 | 100,0% |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|-----|--------|-----|--------|
| Esame audiometrico tonale | P | 2 | 100,0% | 11 | 8,0% |
| | O | 23 | 95,7% | 16 | 92,0% |
| | Totale | 25 | 96,0% | 15 | 100,0% |
| Spirometria globale | D | 16 | 100,0% | 25 | 39,0% |
| | P | 7 | 100,0% | 21 | 17,1% |
| | O | 18 | 100,0% | 32 | 43,9% |
| | Totale | 41 | 100,0% | 27 | 100,0% |
| Esame del fundus oculi | D | 2 | | 194 | 20,0% |
| | O | 8 | 25,0% | 152 | 80,0% |
| | Totale | 10 | 20,0% | 160 | 100,0% |
| Elettromiografia semplice | B | 4 | 100,0% | 2 | 7,7% |
| | D | 20 | 100,0% | 42 | 38,5% |
| | P | 8 | 100,0% | 49 | 15,4% |
| | O | 20 | 100,0% | 24 | 38,5% |
| | Totale | 52 | 100,0% | 33 | 100,0% |
| Totale | | 990 | 80,5% | | |

105 - Alta Val di Cecina - Val d'Era

| Prestazioni diagnostica | Priorità | N Prestazioni | % Garanzia tempi attesa I disponibilità | Giorni di attesa I disp | % Priorità |
|--|----------|---------------|---|-------------------------|------------|
| Mammografia bilaterale | B | 5 | 100,0% | 6 | 11,9% |
| | D | 12 | 50,0% | 41 | 28,6% |
| | P | 23 | 95,7% | 30 | 54,8% |
| | O | 2 | 100,0% | 12 | 4,8% |
| | Totale | 42 | 83,3% | 29 | 100,0% |
| Mammografia monolaterale | D | 1 | 100,0% | 12 | 50,0% |
| | P | 1 | 100,0% | 18 | 50,0% |
| | Totale | 2 | 100,0% | 15 | 100,0% |
| TC delTorace | B | 23 | 52,2% | 10 | 67,6% |
| | D | 8 | 100,0% | 22 | 23,5% |
| | P | 3 | 100,0% | 8 | 8,8% |
| | Totale | 34 | 67,6% | 12 | 100,0% |
| TC delTorace senza e con MDC | B | 34 | 52,9% | 9 | 82,9% |
| | D | 2 | | 149 | 4,9% |
| | P | 4 | 100,0% | 4 | 9,8% |
| | O | 1 | 100,0% | 2 | 2,4% |
| | Totale | 41 | 56,1% | 15 | 100,0% |
| TC dell Addome superiore senza e con MDC | B | 1 | | 14 | 50,0% |
| | D | 1 | | 148 | 50,0% |

| | | | | | |
|--|--------|----|--------|-----|--------|
| | Totale | 2 | | 81 | 100,0% |
| | | | | | |
| TC dell Addome inferiore senza e con MDC | B | 2 | | 13 | 100,0% |
| | Totale | 2 | | 13 | 100,0% |
| TC dell Addome completo | B | 4 | 25,0% | 12 | 44,4% |
| | D | 4 | 50,0% | 101 | 44,4% |
| | P | 1 | 100,0% | 11 | 11,1% |
| | Totale | 9 | 44,4% | 52 | 100,0% |
| TC dell Addome completo senza e con MDC | B | 41 | 53,7% | 9 | 68,3% |
| | D | 8 | 75,0% | 51 | 13,3% |
| | P | 9 | 100,0% | 9 | 15,0% |
| | 0 | 2 | 100,0% | 26 | 3,3% |
| | Totale | 60 | 65,0% | 16 | 100,0% |
| TC del Capo | B | 15 | 60,0% | 9 | 48,4% |
| | D | 11 | 63,6% | 59 | 35,5% |
| | P | 4 | 100,0% | 12 | 12,9% |
| | 0 | 1 | 100,0% | 14 | 3,2% |
| | Totale | 31 | 67,7% | 27 | 100,0% |
| TC del Capo senza e con MDC | B | 8 | 87,5% | 8 | 66,7% |
| | D | 2 | 50,0% | 95 | 16,7% |
| | P | 1 | 100,0% | 3 | 8,3% |
| | 0 | 1 | 100,0% | 34 | 8,3% |
| | Totale | 12 | 83,3% | 24 | 100,0% |
| TC del Rachide e dello speco vertebrale | B | 11 | 36,4% | 10 | 50,0% |
| | D | 9 | 100,0% | 16 | 40,9% |
| | P | 1 | 100,0% | 0 | 4,5% |
| | 0 | 1 | 100,0% | 60 | 4,5% |
| | Totale | 22 | 68,2% | 14 | 100,0% |
| TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC | B | 1 | | 14 | 100,0% |
| | Totale | 1 | | 14 | 100,0% |
| RM dell Encefalo e del tronco encefalico | B | 51 | 58,8% | 9 | 63,0% |
| | D | 25 | 80,0% | 44 | 30,9% |
| | P | 2 | 100,0% | 11 | 2,5% |
| | 0 | 3 | 100,0% | 14 | 3,7% |
| | Totale | 81 | 67,9% | 20 | 100,0% |
| RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC | B | 26 | 46,2% | 11 | 68,4% |
| | D | 5 | 100,0% | 39 | 13,2% |
| | P | 4 | 75,0% | 49 | 10,5% |
| | 0 | 3 | 100,0% | 21 | 7,9% |
| | Totale | 38 | 60,5% | 19 | 100,0% |
| RM di addome inferiore e scavo pelvico | B | 3 | 33,3% | 11 | 75,0% |
| | D | 1 | | 149 | 25,0% |

| | | | | | |
|--|---------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| | Totale | 4 | 25,0% | 46 | 100,0% |
| RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC | B | 3 | 66,7% | 6 | 75,0% |
| | 0 | 1 | 100,0% | 52 | 25,0% |
| | Totale | 4 | 75,0% | 17 | 100,0% |
| | | | | | |
| RM della Colonna | B | 74 | 35,1% | 12 | 38,9% |
| | D | 84 | 61,9% | 64 | 44,2% |
| | P | 17 | 41,2% | 100 | 8,9% |
| | 0 | 15 | 66,7% | 52 | 7,9% |
| | Totale | 190 | 50,0% | 46 | 100,0% |
| RM della Colonna senza e con MDC | B | 4 | 50,0% | 11 | 57,1% |
| | D | 1 | | 143 | 14,3% |
| | 0 | 2 | 50,0% | 56 | 28,6% |
| | Totale | 7 | 42,9% | 42 | 100,0% |
| RM Muscoloscheletrica | B | 49 | 20,4% | 15 | 14,9% |
| | D | 122 | 98,4% | 24 | 37,1% |
| | P | 131 | 96,2% | 25 | 39,8% |
| | 0 | 27 | 96,3% | 18 | 8,2% |
| | Totale | 329 | 85,7% | 23 | 100,0% |
| RM Muscoloscheletrica senza e con MDC | B | 6 | | 15 | 85,7% |
| | 0 | 1 | 100,0% | 9 | 14,3% |
| | Totale | 7 | 14,3% | 14 | 100,0% |
| Eco(color)dopplergrafia cardiaca | U | 1 | 100,0% | 2 | 0,5% |
| | B | 31 | 90,3% | 7 | 16,0% |
| | D | 74 | 43,2% | 72 | 38,1% |
| | P | 64 | 76,6% | 57 | 33,0% |
| | 0 | 24 | 45,8% | 76 | 12,4% |
| | Totale | 194 | 62,4% | 57 | 100,0% |
| Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici | B | 33 | 60,6% | 15 | 25,4% |
| | D | 66 | 28,8% | 110 | 50,8% |
| | P | 17 | 52,9% | 81 | 13,1% |
| | 0 | 14 | 92,9% | 26 | 10,8% |
| | Totale | 130 | 46,9% | 73 | 100,0% |
| Diagnostica ecografica del Capo e del collo | B | 27 | 70,4% | 10 | 31,0% |
| | D | 23 | 43,5% | 64 | 26,4% |
| | P | 27 | 77,8% | 64 | 31,0% |
| | 0 | 10 | 90,0% | 29 | 11,5% |
| | Totale | 87 | 67,8% | 43 | 100,0% |
| Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo) | B | 88 | 79,5% | 8 | 25,2% |
| | D | 117 | 62,4% | 33 | 33,5% |
| | P | 85 | 98,8% | 25 | 24,4% |
| | 0 | 59 | 94,9% | 8 | 16,9% |
| | Totale | 349 | 81,1% | 20 | 100,0% |

| | | | | | |
|--|--------|-----|--------|-----|--------|
| Ecografia della Mammella bilaterale | B | 24 | 83,3% | 9 | 46,2% |
| | D | 14 | 50,0% | 57 | 26,9% |
| | P | 13 | 69,2% | 66 | 25,0% |
| | 0 | 1 | 100,0% | 23 | 1,9% |
| | Totale | 52 | 71,2% | 36 | 100,0% |
| Ecografia della Mammella monolaterale | B | 1 | 100,0% | 7 | 50,0% |
| | P | 1 | 100,0% | 41 | 50,0% |
| | Totale | 2 | 100,0% | 24 | 100,0% |
| Ecografia Ostetrica | P | 50 | 100,0% | 4 | 89,3% |
| | 0 | 6 | 100,0% | 8 | 10,7% |
| | Totale | 56 | 100,0% | 4 | 100,0% |
| Ecografia Ginecologica | B | 2 | 100,0% | 2 | 2,3% |
| | D | 14 | 21,4% | 63 | 16,1% |
| | P | 64 | 100,0% | 13 | 73,6% |
| | 0 | 7 | 100,0% | 13 | 8,0% |
| | Totale | 87 | 87,4% | 21 | 100,0% |
| Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa | B | 28 | 42,9% | 14 | 42,4% |
| | D | 26 | 42,3% | 86 | 39,4% |
| | P | 8 | 100,0% | 24 | 12,1% |
| | 0 | 4 | 25,0% | 104 | 6,1% |
| | Totale | 66 | 48,5% | 49 | 100,0% |
| Colonscopia | B | 30 | 46,7% | 12 | 26,8% |
| | D | 39 | 71,8% | 46 | 34,8% |
| | P | 36 | 97,2% | 15 | 32,1% |
| | 0 | 7 | 71,4% | 40 | 6,3% |
| | Totale | 112 | 73,2% | 26 | 100,0% |
| Esofago-gastroduodenoscopia | B | 16 | 81,3% | 8 | 19,3% |
| | D | 27 | 96,3% | 9 | 32,5% |
| | P | 30 | 96,7% | 11 | 36,1% |
| | 0 | 10 | 90,0% | 10 | 12,0% |
| | Totale | 83 | 92,8% | 10 | 100,0% |
| Elettrocardiogramma | U | 1 | 100,0% | 2 | 0,2% |
| | B | 46 | 95,7% | 7 | 10,6% |
| | D | 175 | 66,9% | 40 | 40,2% |
| | P | 173 | 89,6% | 29 | 39,8% |
| | 0 | 40 | 55,0% | 50 | 9,2% |
| | Totale | 435 | 77,9% | 33 | 100,0% |
| Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | B | 8 | 75,0% | 6 | 7,7% |
| | P | 80 | 82,5% | 54 | 76,9% |
| | 0 | 16 | 43,8% | 84 | 15,4% |
| | Totale | 104 | 76,0% | 55 | 100,0% |

| | | | | | |
|---|--------|------|--------|----|--------|
| Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro | D | 2 | 100,0% | 3 | 100,0% |
| | Totale | 2 | 100,0% | 3 | 100,0% |
| Esame audiometrico tonale | B | 1 | 100,0% | 1 | 1,1% |
| | D | 28 | 100,0% | 4 | 31,1% |
| | P | 43 | 100,0% | 4 | 47,8% |
| | 0 | 18 | 100,0% | 5 | 20,0% |
| | Totale | 90 | 100,0% | 4 | 100,0% |
| Spirometria semplice | B | 6 | 33,3% | 14 | 9,7% |
| | P | 38 | 100,0% | 10 | 61,3% |
| | 0 | 18 | 88,9% | 28 | 29,0% |
| | Totale | 62 | 90,3% | 16 | 100,0% |
| Spirometria globale | B | 7 | 28,6% | 19 | 15,6% |
| | D | 8 | 75,0% | 85 | 17,8% |
| | P | 14 | 92,9% | 31 | 31,1% |
| | 0 | 16 | 93,8% | 17 | 35,6% |
| | Totale | 45 | 80,0% | 34 | 100,0% |
| Esame del fundus oculi | D | 17 | 100,0% | 3 | 47,2% |
| | P | 3 | 100,0% | 41 | 8,3% |
| | 0 | 16 | 100,0% | 4 | 44,4% |
| | Totale | 36 | 100,0% | 6 | 100,0% |
| Elettromiografia semplice | B | 47 | 70,2% | 12 | 26,7% |
| | D | 65 | 86,2% | 35 | 36,9% |
| | P | 30 | 100,0% | 72 | 17,0% |
| | 0 | 34 | 73,5% | 38 | 19,3% |
| | Totale | 176 | 81,8% | 36 | 100,0% |
| Totale | | 3086 | 74,6% | | |

105 - Pisana

| Prestazioni diagnostica | Priorità | N Prestazioni | % Garanzia tempi attesa I disponibilità | Giorni di attesa I disp | % Priorità |
|--------------------------|----------|---------------|---|-------------------------|------------|
| Mammografia bilaterale | D | 75 | 89,3% | 30 | 29,1% |
| | P | 156 | 95,5% | 20 | 60,5% |
| | 0 | 27 | 85,2% | 32 | 10,5% |
| | Totale | 258 | 92,6% | 24 | 100,0% |
| Mammografia monolaterale | P | 6 | 100,0% | 12 | 100,0% |
| | Totale | 6 | 100,0% | 12 | 100,0% |
| TC delTorace | B | 10 | 100,0% | 8 | 30,3% |
| | D | 11 | 100,0% | 8 | 33,3% |
| | P | 10 | 100,0% | 8 | 30,3% |

| | | | | | |
|---|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | 0 | 2 | 100,0% | 10 | 6,1% |
| | Totale | 33 | 100,0% | 8 | 100,0% |
| TC delTorace senza e con MDC | B | 4 | 100,0% | 10 | 22,2% |
| | D | 3 | 100,0% | 10 | 16,7% |
| | P | 4 | 100,0% | 9 | 22,2% |
| | 0 | 7 | 100,0% | 10 | 38,9% |
| | Totale | 18 | 100,0% | 10 | 100,0% |
| TC dell Addome superiore | B | 1 | 100,0% | 9 | 50,0% |
| | 0 | 1 | 100,0% | 10 | 50,0% |
| | Totale | 2 | 100,0% | 10 | 100,0% |
| TC dell Addome superiore senza e con MDC | 0 | 1 | 100,0% | 10 | 100,0% |
| | Totale | 1 | 100,0% | 10 | 100,0% |
| TC dell Addome inferiore senza e con MDC | P | 1 | 100,0% | 10 | 50,0% |
| | 0 | 1 | 100,0% | 10 | 50,0% |
| | Totale | 2 | 100,0% | 10 | 100,0% |
| TC dell Addome completo | B | 2 | 100,0% | 10 | 33,3% |
| | D | 3 | 100,0% | 10 | 50,0% |
| | P | 1 | 100,0% | 10 | 16,7% |
| | Totale | 6 | 100,0% | 10 | 100,0% |
| TC dell Addome completo senza e con MDC | U | 1 | 100,0% | 2 | 4,2% |
| | B | 7 | 100,0% | 9 | 29,2% |
| | D | 5 | 100,0% | 9 | 20,8% |
| | P | 3 | 100,0% | 10 | 12,5% |
| | 0 | 8 | 100,0% | 9 | 33,3% |
| | Totale | 24 | 100,0% | 9 | 100,0% |
| TC del Capo | D | 2 | 100,0% | 2 | 18,2% |
| | P | 6 | 100,0% | 7 | 54,5% |
| | 0 | 3 | 100,0% | 7 | 27,3% |
| | Totale | 11 | 100,0% | 6 | 100,0% |
| TC del Capo senza e con MDC | B | 2 | 100,0% | 10 | 28,6% |
| | D | 3 | 100,0% | 10 | 42,9% |
| | P | 1 | 100,0% | 10 | 14,3% |
| | 0 | 1 | 100,0% | 10 | 14,3% |
| | Totale | 7 | 100,0% | 10 | 100,0% |
| TC del Rachide e dello speco vertebrale | D | 5 | 100,0% | 10 | 45,5% |
| | P | 3 | 100,0% | 7 | 27,3% |
| | 0 | 3 | 100,0% | 10 | 27,3% |
| | Totale | 11 | 100,0% | 9 | 100,0% |
| TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC | D | 1 | 100,0% | 10 | 100,0% |
| | Totale | 1 | 100,0% | 10 | 100,0% |
| | D | 4 | 100,0% | 10 | 57,1% |

| | | | | | |
|--|--------|-----|--------|----|--------|
| RM dell Encefalo e del tronco encefalico | P | 3 | 100,0% | 10 | 42,9% |
| | Totale | 7 | 100,0% | 10 | 100,0% |
| RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC | B | 2 | 100,0% | 10 | 9,5% |
| | D | 9 | 100,0% | 9 | 42,9% |
| | P | 4 | 100,0% | 10 | 19,0% |
| | 0 | 6 | 100,0% | 9 | 28,6% |
| | Totale | 21 | 100,0% | 9 | 100,0% |
| RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC | B | 1 | 100,0% | 10 | 20,0% |
| | D | 1 | 100,0% | 10 | 20,0% |
| | P | 2 | 100,0% | 10 | 40,0% |
| | 0 | 1 | 100,0% | 10 | 20,0% |
| | Totale | 5 | 100,0% | 10 | 100,0% |
| RM della Colonna | B | 2 | 100,0% | 10 | 4,0% |
| | D | 25 | 100,0% | 18 | 50,0% |
| | P | 16 | 100,0% | 20 | 32,0% |
| | 0 | 7 | 100,0% | 13 | 14,0% |
| | Totale | 50 | 100,0% | 18 | 100,0% |
| RM della Colonna senza e con MDC | B | 3 | 100,0% | 10 | 100,0% |
| | Totale | 3 | 100,0% | 10 | 100,0% |
| RM Muscoloscheletrica | B | 9 | 88,9% | 12 | 19,6% |
| | D | 18 | 100,0% | 18 | 39,1% |
| | P | 18 | 100,0% | 22 | 39,1% |
| | 0 | 1 | 100,0% | 10 | 2,2% |
| | Totale | 46 | 97,8% | 18 | 100,0% |
| RM Muscoloscheletrica senza e con MDC | B | 1 | 100,0% | 10 | 25,0% |
| | P | 3 | 100,0% | 10 | 75,0% |
| | Totale | 4 | 100,0% | 10 | 100,0% |
| Eco(color)dopplergrafia cardiaca | B | 2 | 100,0% | 7 | 1,3% |
| | D | 46 | 97,8% | 19 | 30,5% |
| | P | 87 | 100,0% | 16 | 57,6% |
| | 0 | 16 | 100,0% | 8 | 10,6% |
| | Totale | 151 | 99,3% | 16 | 100,0% |
| Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici | B | 7 | 85,7% | 9 | 2,6% |
| | D | 87 | 100,0% | 14 | 32,3% |
| | P | 156 | 100,0% | 20 | 58,0% |
| | 0 | 19 | 100,0% | 14 | 7,1% |
| | Totale | 269 | 99,6% | 18 | 100,0% |
| Diagnostica ecografica del Capo e del collo | B | 14 | 100,0% | 7 | 14,6% |
| | D | 34 | 100,0% | 7 | 35,4% |
| | P | 37 | 100,0% | 10 | 38,5% |
| | 0 | 11 | 100,0% | 5 | 11,5% |
| | Totale | 96 | 100,0% | 8 | 100,0% |

| | | | | | |
|--|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|
| Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo) | B | 75 | 97,3% | 8 | 11,5% |
| | D | 169 | 100,0% | 8 | 25,9% |
| | P | 303 | 100,0% | 8 | 46,5% |
| | 0 | 105 | 100,0% | 7 | 16,1% |
| | Totale | 652 | 99,7% | 8 | 100,0% |
| Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa | B | 34 | 94,1% | 8 | 12,2% |
| | D | 104 | 100,0% | 14 | 37,4% |
| | P | 128 | 100,0% | 17 | 46,0% |
| | 0 | 12 | 100,0% | 8 | 4,3% |
| | Totale | 278 | 99,3% | 14 | 100,0% |
| Elettrocardiogramma | B | 31 | 93,5% | 8 | 8,2% |
| | D | 113 | 83,2% | 14 | 30,0% |
| | P | 210 | 100,0% | 14 | 55,7% |
| | 0 | 23 | 78,3% | 19 | 6,1% |
| | Totale | 377 | 93,1% | 14 | 100,0% |
| Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | B | 1 | 100,0% | 10 | 10,0% |
| | D | 1 | 100,0% | 10 | 10,0% |
| | P | 7 | 100,0% | 14 | 70,0% |
| | 0 | 1 | 100,0% | 1 | 10,0% |
| | Totale | 10 | 100,0% | 12 | 100,0% |
| Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro | P | 2 | 100,0% | 35 | 50,0% |
| | 0 | 2 | 100,0% | 31 | 50,0% |
| | Totale | 4 | 100,0% | 33 | 100,0% |
| Esame audiometrico tonale | D | 3 | 100,0% | 2 | 100,0% |
| | Totale | 3 | 100,0% | 2 | 100,0% |
| Spirometria semplice | B | 1 | | 29 | 20,0% |
| | D | 2 | 50,0% | 35 | 40,0% |
| | P | 2 | 50,0% | 98 | 40,0% |
| | Totale | 5 | 40,0% | 59 | 100,0% |
| Fotografia del fundus | D | 1 | 100,0% | 30 | 100,0% |
| | Totale | 1 | 100,0% | 30 | 100,0% |
| Esame del fundus oculi | B | 5 | 100,0% | 6 | 6,5% |
| | D | 20 | 70,0% | 19 | 26,0% |
| | P | 40 | 97,5% | 12 | 51,9% |
| | 0 | 12 | 75,0% | 22 | 15,6% |
| | Totale | 77 | 87,0% | 15 | 100,0% |
| Totale | | 2439 | 97,3% | | |

| Prestazioni diagnostica | Priorità | N Prestazioni | % Garanzia tempi attesa I disponibilità | Giorni di attesa I disp | % Priorità |
|--|----------|---------------|---|-------------------------|------------|
| Mammografia bilaterale | B | 13 | 100,0% | 4 | 9,5% |
| | D | 111 | 81,1% | 26 | 81,0% |
| | P | 13 | 69,2% | 55 | 9,5% |
| | Totale | 137 | 81,8% | 26 | 100,0% |
| Mammografia monolaterale | P | 1 | | 180 | 100,0% |
| | Totale | 1 | | 180 | 100,0% |
| TC delTorace | B | 12 | 100,0% | 4 | 31,6% |
| | D | 25 | 100,0% | 5 | 65,8% |
| | P | 1 | 100,0% | 27 | 2,6% |
| | Totale | 38 | 100,0% | 5 | 100,0% |
| TC delTorace senza e con MDC | P | 22 | 50,0% | 92 | 100,0% |
| | Totale | 22 | 50,0% | 92 | 100,0% |
| TC dell Addome completo senza e con MDC | P | 22 | 50,0% | 92 | 100,0% |
| | Totale | 22 | 50,0% | 92 | 100,0% |
| TC del Capo senza e con MDC | P | 2 | 100,0% | 27 | 100,0% |
| | Totale | 2 | 100,0% | 27 | 100,0% |
| RM dell Encefalo e del tronco encefalico | B | 11 | 100,0% | 9 | 34,4% |
| | D | 21 | 100,0% | 56 | 65,6% |
| | Totale | 32 | 100,0% | 39 | 100,0% |
| RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC | B | 13 | 100,0% | 7 | 34,2% |
| | D | 24 | 100,0% | 31 | 63,2% |
| | P | 1 | 100,0% | 1 | 2,6% |
| | Totale | 38 | 100,0% | 22 | 100,0% |
| RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC | B | 2 | 100,0% | 9 | 25,0% |
| | D | 6 | 100,0% | 39 | 75,0% |
| | Totale | 8 | 100,0% | 32 | 100,0% |
| RM della Colonna | B | 30 | 100,0% | 6 | 34,5% |
| | D | 55 | 100,0% | 31 | 63,2% |
| | P | 2 | 100,0% | 26 | 2,3% |
| | Totale | 87 | 100,0% | 22 | 100,0% |
| RM della Colonna senza e con MDC | B | 6 | 100,0% | 6 | 54,5% |
| | D | 5 | 100,0% | 21 | 45,5% |
| | Totale | 11 | 100,0% | 13 | 100,0% |
| RM Muscoloscheletrica | B | 34 | 100,0% | 7 | 35,1% |
| | D | 62 | 100,0% | 17 | 63,9% |
| | P | 1 | 100,0% | 20 | 1,0% |
| | Totale | 97 | 100,0% | 14 | 100,0% |
| | B | 2 | 100,0% | 9 | 40,0% |

| | | | | | |
|--|--------|-----|--------|----|--------|
| RM Muscoloscheletrica senza e con MDC | D | 3 | 100,0% | 15 | 60,0% |
| | Totale | 5 | 100,0% | 12 | 100,0% |
| Eco(color)dopplergrafia cardiaca | B | 86 | 98,8% | 7 | 68,3% |
| | D | 36 | 52,8% | 68 | 28,6% |
| | P | 4 | 100,0% | 7 | 3,2% |
| | Totale | 126 | 85,7% | 25 | 100,0% |
| Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici | B | 12 | 100,0% | 5 | 9,9% |
| | D | 89 | 84,3% | 45 | 73,6% |
| | P | 20 | 75,0% | 96 | 16,5% |
| | Totale | 121 | 84,3% | 49 | 100,0% |
| Diagnostica ecografica del Capo e del collo | B | 19 | 100,0% | 5 | 8,3% |
| | D | 185 | 84,9% | 14 | 80,8% |
| | P | 25 | 96,0% | 72 | 10,9% |
| | Totale | 229 | 87,3% | 20 | 100,0% |
| Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo) | B | 114 | 100,0% | 5 | 23,6% |
| | D | 271 | 74,5% | 23 | 56,1% |
| | P | 98 | 98,0% | 28 | 20,3% |
| | Totale | 483 | 85,3% | 20 | 100,0% |
| Ecografia della Mammella bilaterale | B | 11 | 100,0% | 6 | 14,7% |
| | D | 63 | 52,4% | 28 | 84,0% |
| | P | 1 | 100,0% | 74 | 1,3% |
| | Totale | 75 | 60,0% | 25 | 100,0% |
| Ecografia della Mammella monolaterale | B | 6 | 100,0% | 4 | 85,7% |
| | D | 1 | | 57 | 14,3% |
| | Totale | 7 | 85,7% | 12 | 100,0% |
| Ecografia Ostetrica | D | 216 | 56,5% | 40 | 95,6% |
| | P | 10 | 100,0% | 37 | 4,4% |
| | Totale | 226 | 58,4% | 40 | 100,0% |
| Ecografia Ginecologica | B | 1 | 100,0% | 1 | 14,3% |
| | D | 3 | 100,0% | 3 | 42,9% |
| | P | 3 | 100,0% | 51 | 42,9% |
| | Totale | 7 | 100,0% | 23 | 100,0% |
| Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa | B | 26 | 84,6% | 8 | 26,3% |
| | D | 62 | 74,2% | 56 | 62,6% |
| | P | 11 | 90,9% | 53 | 11,1% |
| | Totale | 99 | 78,8% | 43 | 100,0% |
| Colonscopia | B | 37 | 29,7% | 12 | 17,9% |
| | D | 116 | 39,7% | 54 | 56,0% |
| | P | 54 | 85,2% | 60 | 26,1% |
| | Totale | 207 | 49,8% | 48 | 100,0% |
| | B | 36 | 38,9% | 15 | 27,3% |

| | | | | | |
|---|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|
| Esofago-gastroduodenoscopia | D | 91 | 54,9% | 61 | 68,9% |
| | P | 5 | 60,0% | 78 | 3,8% |
| | Totale | 132 | 50,8% | 49 | 100,0% |
| Elettrocardiogramma | B | 160 | 99,4% | 5 | 28,8% |
| | D | 275 | 100,0% | 2 | 49,5% |
| | P | 121 | 100,0% | 4 | 21,8% |
| | Totale | 556 | 99,8% | 3 | 100,0% |
| Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | B | 25 | 24,0% | 12 | 42,4% |
| | D | 27 | 14,8% | 68 | 45,8% |
| | P | 7 | 100,0% | 10 | 11,9% |
| | Totale | 59 | 28,8% | 37 | 100,0% |
| Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro | B | 6 | 100,0% | 6 | 26,1% |
| | D | 10 | 100,0% | 8 | 43,5% |
| | P | 7 | 100,0% | 5 | 30,4% |
| | Totale | 23 | 100,0% | 7 | 100,0% |
| Esame audiometrico tonale | B | 4 | 100,0% | 1 | 4,1% |
| | D | 86 | 100,0% | 1 | 88,7% |
| | P | 7 | 100,0% | 3 | 7,2% |
| | Totale | 97 | 100,0% | 1 | 100,0% |
| Spirometria semplice | P | 1 | 100,0% | 7 | 100,0% |
| | Totale | 1 | 100,0% | 7 | 100,0% |
| Spirometria globale | B | 9 | 33,3% | 12 | 14,3% |
| | D | 46 | 97,8% | 7 | 73,0% |
| | P | 8 | 100,0% | 10 | 12,7% |
| | Totale | 63 | 88,9% | 8 | 100,0% |
| Esame del fundus oculi | B | 2 | 100,0% | 4 | 4,3% |
| | D | 10 | 80,0% | 18 | 21,3% |
| | P | 35 | 100,0% | 8 | 74,5% |
| | Totale | 47 | 95,7% | 10 | 100,0% |
| Elettromiografia semplice | B | 24 | 100,0% | 8 | 61,5% |
| | D | 14 | 100,0% | 4 | 35,9% |
| | P | 1 | 100,0% | 0 | 2,6% |
| | Totale | 39 | 100,0% | 7 | 100,0% |
| Totale | | 3097 | 82,2% | | |

106 - dell'Elba

| Prestazioni diagnostica | Priorità | N Prestazioni | % Garanzia tempi attesa I disponibilità | Giorni di attesa I disp | % Priorità |
|-------------------------|----------|---------------|---|-------------------------|------------|
| | D | 8 | 75,0% | 33 | 100,0% |

| | | | | | |
|--|--------|----|--------|----|--------|
| Mammografia bilaterale | Totale | 8 | 75,0% | 33 | 100,0% |
| | | | | | |
| TC delTorace | D | 7 | 100,0% | 8 | 100,0% |
| | Totale | 7 | 100,0% | 8 | 100,0% |
| TC delTorace senza e con MDC | B | 1 | 100,0% | 10 | 11,1% |
| | D | 7 | 100,0% | 8 | 77,8% |
| | P | 1 | 100,0% | 1 | 11,1% |
| | Totale | 9 | 100,0% | 7 | 100,0% |
| TC dell Addome superiore | D | 1 | 100,0% | 6 | 100,0% |
| | Totale | 1 | 100,0% | 6 | 100,0% |
| TC dell Addome superiore senza e con MDC | B | 1 | 100,0% | 2 | 100,0% |
| | Totale | 1 | 100,0% | 2 | 100,0% |
| TC dell Addome inferiore senza e con MDC | B | 1 | 100,0% | 2 | 100,0% |
| | Totale | 1 | 100,0% | 2 | 100,0% |
| TC dell Addome completo | D | 1 | 100,0% | 7 | 100,0% |
| | Totale | 1 | 100,0% | 7 | 100,0% |
| TC dell Addome completo senza e con MDC | B | 2 | 100,0% | 6 | 13,3% |
| | D | 11 | 100,0% | 4 | 73,3% |
| | P | 2 | 100,0% | 4 | 13,3% |
| | Totale | 15 | 100,0% | 4 | 100,0% |
| TC del Capo | D | 7 | 100,0% | 8 | 87,5% |
| | P | 1 | 100,0% | 6 | 12,5% |
| | Totale | 8 | 100,0% | 8 | 100,0% |
| TC del Capo senza e con MDC | D | 4 | 100,0% | 8 | 100,0% |
| | Totale | 4 | 100,0% | 8 | 100,0% |
| TC del Rachide e dello speco vertebrale | D | 4 | 100,0% | 8 | 100,0% |
| | Totale | 4 | 100,0% | 8 | 100,0% |
| RM dell Encefalo e del tronco encefalico | B | 4 | 50,0% | 16 | 30,8% |
| | D | 8 | 62,5% | 83 | 61,5% |
| | P | 1 | 100,0% | 14 | 7,7% |
| | Totale | 13 | 61,5% | 57 | 100,0% |
| RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC | B | 1 | 100,0% | 2 | 14,3% |
| | D | 5 | 80,0% | 27 | 71,4% |
| | P | 1 | 100,0% | 14 | 14,3% |
| | Totale | 7 | 85,7% | 22 | 100,0% |
| RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC | B | 1 | 100,0% | 10 | 100,0% |
| | Totale | 1 | 100,0% | 10 | 100,0% |
| RM della Colonna | B | 11 | 72,7% | 13 | 47,8% |
| | D | 12 | 91,7% | 52 | 52,2% |
| | Totale | 23 | 82,6% | 33 | 100,0% |

| | | | | | |
|--|--------|----|--------|-----|--------|
| RM della Colonna senza e con MDC | D | 3 | 100,0% | 21 | 100,0% |
| | Totale | 3 | 100,0% | 21 | 100,0% |
| RM Muscoloscheletrica | B | 10 | 80,0% | 11 | 32,3% |
| | D | 21 | 100,0% | 18 | 67,7% |
| | Totale | 31 | 93,5% | 16 | 100,0% |
| RM Muscoloscheletrica senza e con MDC | D | 4 | 75,0% | 62 | 100,0% |
| | Totale | 4 | 75,0% | 62 | 100,0% |
| Eco(color)dopplergrafia cardiaca | B | 5 | 100,0% | 8 | 17,2% |
| | D | 23 | 52,2% | 72 | 79,3% |
| | P | 1 | | 201 | 3,4% |
| | Totale | 29 | 58,6% | 65 | 100,0% |
| Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici | B | 4 | 75,0% | 7 | 13,8% |
| | D | 23 | 26,1% | 96 | 79,3% |
| | P | 2 | 50,0% | 138 | 6,9% |
| | Totale | 29 | 34,5% | 87 | 100,0% |
| Diagnostica ecografica del Capo e del collo | B | 8 | 100,0% | 2 | 10,4% |
| | D | 29 | 100,0% | 7 | 37,7% |
| | P | 40 | 100,0% | 4 | 51,9% |
| | Totale | 77 | 100,0% | 5 | 100,0% |
| Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo) | B | 4 | 100,0% | 1 | 5,3% |
| | D | 65 | 100,0% | 2 | 86,7% |
| | P | 6 | 100,0% | 5 | 8,0% |
| | Totale | 75 | 100,0% | 2 | 100,0% |
| Ecografia della Mammella bilaterale | B | 3 | 100,0% | 6 | 12,5% |
| | D | 21 | 38,1% | 35 | 87,5% |
| | Totale | 24 | 45,8% | 31 | 100,0% |
| Ecografia della Mammella monolaterale | D | 1 | 100,0% | 6 | 100,0% |
| | Totale | 1 | 100,0% | 6 | 100,0% |
| Ecografia Ostetrica | D | 16 | 100,0% | 7 | 66,7% |
| | P | 8 | 100,0% | 9 | 33,3% |
| | Totale | 24 | 100,0% | 8 | 100,0% |
| Ecografia Ginecologica | B | 1 | 100,0% | 3 | 20,0% |
| | D | 3 | | 80 | 60,0% |
| | P | 1 | 100,0% | 3 | 20,0% |
| | Totale | 5 | 40,0% | 49 | 100,0% |
| Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa | B | 5 | 60,0% | 10 | 50,0% |
| | D | 5 | 20,0% | 98 | 50,0% |
| | Totale | 10 | 40,0% | 54 | 100,0% |
| Colonscopia | B | 9 | 11,1% | 13 | 20,0% |
| | D | 21 | 47,6% | 53 | 46,7% |
| | P | 15 | 80,0% | 54 | 33,3% |

| | | | | | |
|--|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | Totale | 45 | 51,1% | 45 | 100,0% |
| Esofago-gastroduodenoscopia | B | 7 | 71,4% | 9 | 31,8% |
| | D | 14 | 92,9% | 18 | 63,6% |
| | P | 1 | 100,0% | 11 | 4,5% |
| | Totale | 22 | 86,4% | 15 | 100,0% |
| Elettrocardiogramma | B | 33 | 100,0% | 2 | 23,6% |
| | D | 96 | 100,0% | 2 | 68,6% |
| | P | 11 | 100,0% | 3 | 7,9% |
| | Totale | 140 | 100,0% | 2 | 100,0% |
| Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | D | 10 | 60,0% | 61 | 62,5% |
| | P | 6 | 16,7% | 168 | 37,5% |
| | Totale | 16 | 43,8% | 101 | 100,0% |
| Esame audiometrico tonale | D | 14 | 100,0% | 2 | 100,0% |
| | Totale | 14 | 100,0% | 2 | 100,0% |
| Spirometria semplice | D | 20 | 100,0% | 8 | 87,0% |
| | P | 3 | 100,0% | 16 | 13,0% |
| | Totale | 23 | 100,0% | 9 | 100,0% |
| Esame del fundus oculi | D | 4 | 100,0% | 16 | 26,7% |
| | P | 11 | 72,7% | 66 | 73,3% |
| | Totale | 15 | 80,0% | 53 | 100,0% |
| Elettromiografia semplice | B | 3 | 66,7% | 9 | 11,5% |
| | D | 19 | 31,6% | 99 | 73,1% |
| | P | 4 | 100,0% | 2 | 15,4% |
| | Totale | 26 | 46,2% | 74 | 100,0% |
| Totale | | 716 | 83,4% | | |

106 - Livornese

| Prestazioni diagnostica | Priorità | N Prestazioni | % Garanzia tempi attesa I disponibilità | Giorni di attesa I disp | % Priorità |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|--|--------------------------------|-------------------|
| Mammografia bilaterale | B | 1 | 100,0% | 5 | 0,5% |
| | D | 179 | 73,2% | 37 | 89,9% |
| | P | 19 | 78,9% | 77 | 9,5% |
| | Totale | 199 | 73,9% | 41 | 100,0% |
| Mammografia monolaterale | B | 1 | 100,0% | 7 | 7,7% |
| | D | 9 | 66,7% | 57 | 69,2% |
| | P | 3 | 100,0% | 6 | 23,1% |
| | Totale | 13 | 76,9% | 42 | 100,0% |
| | B | 20 | 85,0% | 8 | 28,6% |
| | D | 49 | 100,0% | 17 | 70,0% |

| | | | | | |
|---|--------|-----|--------|----|--------|
| TC delTorace | P | 1 | 100,0% | 14 | 1,4% |
| | Totale | 70 | 95,7% | 14 | 100,0% |
| TC delTorace senza e con MDC | B | 26 | 50,0% | 13 | 12,5% |
| | D | 169 | 100,0% | 17 | 81,3% |
| | P | 13 | 100,0% | 15 | 6,3% |
| | Totale | 208 | 93,8% | 16 | 100,0% |
| TC dell Addome superiore senza e con MDC | B | 2 | 100,0% | 3 | 40,0% |
| | D | 3 | 100,0% | 24 | 60,0% |
| | Totale | 5 | 100,0% | 16 | 100,0% |
| TC dell Addome inferiore senza e con MDC | B | 1 | | 14 | 25,0% |
| | D | 3 | 100,0% | 13 | 75,0% |
| | Totale | 4 | 75,0% | 14 | 100,0% |
| TC dell Addome completo | B | 10 | 80,0% | 10 | 32,3% |
| | D | 18 | 100,0% | 25 | 58,1% |
| | P | 3 | 100,0% | 23 | 9,7% |
| | Totale | 31 | 93,5% | 20 | 100,0% |
| TC dell Addome completo senza e con MDC | B | 35 | 57,1% | 11 | 16,1% |
| | D | 166 | 100,0% | 15 | 76,5% |
| | P | 16 | 100,0% | 12 | 7,4% |
| | Totale | 217 | 93,1% | 14 | 100,0% |
| TC del Capo | B | 29 | 75,9% | 12 | 39,7% |
| | D | 41 | 100,0% | 26 | 56,2% |
| | P | 3 | 100,0% | 34 | 4,1% |
| | Totale | 73 | 90,4% | 21 | 100,0% |
| TC del Capo senza e con MDC | B | 11 | 36,4% | 16 | 78,6% |
| | D | 3 | 100,0% | 19 | 21,4% |
| | Totale | 14 | 50,0% | 17 | 100,0% |
| TC del Rachide e dello speco vertebrale | B | 29 | 72,4% | 12 | 61,7% |
| | D | 18 | 100,0% | 19 | 38,3% |
| | Totale | 47 | 83,0% | 15 | 100,0% |
| TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC | B | 2 | | 29 | 100,0% |
| | Totale | 2 | | 29 | 100,0% |
| TC di Bacino e articolazioni sacroiliache | B | 2 | 100,0% | 5 | 40,0% |
| | D | 3 | 100,0% | 9 | 60,0% |
| | Totale | 5 | 100,0% | 7 | 100,0% |
| RM dell Encefalo e del tronco encefalico | B | 19 | 84,2% | 11 | 19,0% |
| | D | 79 | 91,1% | 51 | 79,0% |
| | P | 1 | 100,0% | 8 | 1,0% |
| | 0 | 1 | 100,0% | 9 | 1,0% |
| | Totale | 100 | 90,0% | 42 | 100,0% |
| | B | 13 | 30,8% | 21 | 14,9% |

| | | | | | |
|--|--------|------|--------|----|--------|
| RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC | D | 41 | 85,4% | 40 | 47,1% |
| | P | 33 | 100,0% | 29 | 37,9% |
| | Totale | 87 | 82,8% | 33 | 100,0% |
| | | | | | |
| RM della Colonna | B | 93 | 68,8% | 12 | 31,7% |
| | D | 198 | 74,2% | 57 | 67,6% |
| | P | 2 | 100,0% | 7 | 0,7% |
| | Totale | 293 | 72,7% | 42 | 100,0% |
| RM della Colonna senza e con MDC | B | 5 | 60,0% | 16 | 9,3% |
| | D | 27 | 88,9% | 49 | 50,0% |
| | P | 22 | 100,0% | 22 | 40,7% |
| | Totale | 54 | 90,7% | 35 | 100,0% |
| RM Muscoloscheletrica | B | 58 | 91,4% | 8 | 10,1% |
| | D | 513 | 100,0% | 18 | 89,4% |
| | P | 3 | 100,0% | 16 | 0,5% |
| | Totale | 574 | 99,1% | 17 | 100,0% |
| Eco(color)dopplergrafia cardiaca | B | 32 | 84,4% | 10 | 22,5% |
| | D | 105 | 48,6% | 80 | 73,9% |
| | P | 5 | 80,0% | 33 | 3,5% |
| | Totale | 142 | 57,7% | 63 | 100,0% |
| Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici | B | 49 | 91,8% | 7 | 19,8% |
| | D | 190 | 82,6% | 34 | 76,6% |
| | P | 9 | 100,0% | 30 | 3,6% |
| | Totale | 248 | 85,1% | 28 | 100,0% |
| Diagnostica ecografica del Capo e del collo | B | 46 | 100,0% | 4 | 10,2% |
| | D | 349 | 93,7% | 12 | 77,6% |
| | P | 55 | 100,0% | 14 | 12,2% |
| | Totale | 450 | 95,1% | 11 | 100,0% |
| Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo) | B | 95 | 100,0% | 4 | 8,8% |
| | D | 948 | 93,2% | 12 | 88,3% |
| | P | 31 | 93,5% | 50 | 2,9% |
| | Totale | 1074 | 93,9% | 13 | 100,0% |
| Ecografia della Mammella bilaterale | B | 20 | 100,0% | 4 | 10,5% |
| | D | 168 | 99,4% | 15 | 88,0% |
| | P | 3 | 100,0% | 48 | 1,6% |
| | Totale | 191 | 99,5% | 14 | 100,0% |
| Ecografia della Mammella monolaterale | B | 2 | 100,0% | 4 | 40,0% |
| | D | 3 | 100,0% | 10 | 60,0% |
| | Totale | 5 | 100,0% | 8 | 100,0% |
| Ecografia Ostetrica | D | 101 | 40,6% | 33 | 38,4% |
| | P | 162 | 100,0% | 7 | 61,6% |
| | Totale | 263 | 77,2% | 17 | 100,0% |

| | | | | | |
|--|--------|-----|--------|-----|--------|
| Ecografia Ginecologica | D | 3 | | 139 | 100,0% |
| | Totale | 3 | | 139 | 100,0% |
| Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa | B | 81 | 53,1% | 12 | 28,6% |
| | D | 182 | 93,4% | 24 | 64,3% |
| | P | 20 | 100,0% | 32 | 7,1% |
| | Totale | 283 | 82,3% | 21 | 100,0% |
| Colonscopia | B | 55 | 78,2% | 6 | 25,2% |
| | D | 68 | 47,1% | 57 | 31,2% |
| | P | 95 | 89,5% | 22 | 43,6% |
| | Totale | 218 | 73,4% | 29 | 100,0% |
| Esofago-gastroduodenoscopia | B | 48 | 64,6% | 9 | 25,7% |
| | D | 131 | 55,7% | 57 | 70,1% |
| | P | 8 | 50,0% | 92 | 4,3% |
| | Totale | 187 | 57,8% | 46 | 100,0% |
| Elettrocardiogramma | B | 111 | 97,3% | 6 | 13,1% |
| | D | 711 | 99,4% | 4 | 83,8% |
| | P | 26 | 96,2% | 8 | 3,1% |
| | Totale | 848 | 99,1% | 4 | 100,0% |
| Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | B | 30 | 6,7% | 16 | 22,4% |
| | D | 101 | 17,8% | 113 | 75,4% |
| | P | 3 | 100,0% | 8 | 2,2% |
| | Totale | 134 | 17,2% | 89 | 100,0% |
| Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro | D | 18 | | 196 | 81,8% |
| | P | 4 | 100,0% | 7 | 18,2% |
| | Totale | 22 | 18,2% | 162 | 100,0% |
| Esame audiometrico tonale | B | 1 | 100,0% | 1 | 0,9% |
| | D | 102 | 100,0% | 1 | 95,3% |
| | P | 4 | 100,0% | 1 | 3,7% |
| | Totale | 107 | 100,0% | 1 | 100,0% |
| Spirometria globale | D | 10 | 70,0% | 49 | 45,5% |
| | P | 12 | 100,0% | 3 | 54,5% |
| | Totale | 22 | 86,4% | 24 | 100,0% |
| Fotografia del fundus | P | 1 | 100,0% | 3 | 100,0% |
| | Totale | 1 | 100,0% | 3 | 100,0% |
| Esame del fundus oculi | B | 2 | 50,0% | 7 | 1,2% |
| | D | 155 | 96,1% | 13 | 95,1% |
| | P | 6 | 100,0% | 47 | 3,7% |
| | Totale | 163 | 95,7% | 14 | 100,0% |
| Elettromiografia semplice | D | 91 | 29,7% | 101 | 95,8% |
| | P | 4 | 100,0% | 1 | 4,2% |
| | Totale | 95 | 32,6% | 97 | 100,0% |

| | | | | |
|--------|--|------|-------|--|
| Totale | | 6452 | 86,4% | |
|--------|--|------|-------|--|

112 - della Versilia

| Prestazioni diagnostica | Priorità | N Prestazioni | % Garanzia tempi attesa I disponibilità | Giorni di attesa I disp | % Priorità |
|--|----------|---------------|---|-------------------------|------------|
| Mammografia bilaterale | B | 8 | 100,0% | 6 | 7,0% |
| | D | 67 | 94,0% | 22 | 58,3% |
| | P | 1 | 100,0% | 0 | 0,9% |
| | 0 | 39 | 71,8% | 38 | 33,9% |
| | Totale | 115 | 87,0% | 26 | 100,0% |
| TC delTorace | B | 24 | 54,2% | 10 | 15,7% |
| | D | 69 | 100,0% | 32 | 45,1% |
| | P | 13 | 100,0% | 57 | 8,5% |
| | 0 | 47 | 95,7% | 28 | 30,7% |
| | Totale | 153 | 91,5% | 29 | 100,0% |
| TC delTorace senza e con MDC | B | 13 | 100,0% | 3 | 16,9% |
| | D | 28 | 100,0% | 11 | 36,4% |
| | P | 8 | 87,5% | 57 | 10,4% |
| | 0 | 28 | 96,4% | 16 | 36,4% |
| | Totale | 77 | 97,4% | 16 | 100,0% |
| TC dell Addome superiore | B | 1 | 100,0% | 4 | 100,0% |
| | Totale | 1 | 100,0% | 4 | 100,0% |
| TC dell Addome superiore senza e con MDC | B | 3 | 100,0% | 1 | 42,9% |
| | D | 2 | 100,0% | 1 | 28,6% |
| | P | 1 | 100,0% | 42 | 14,3% |
| | 0 | 1 | 100,0% | 6 | 14,3% |
| | Totale | 7 | 100,0% | 8 | 100,0% |
| TC dell Addome inferiore | P | 1 | 100,0% | 63 | 50,0% |
| | 0 | 1 | 100,0% | 7 | 50,0% |
| | Totale | 2 | 100,0% | 35 | 100,0% |
| TC dell Addome inferiore senza e con MDC | B | 1 | 100,0% | 2 | 33,3% |
| | D | 2 | 100,0% | 14 | 66,7% |
| | Totale | 3 | 100,0% | 10 | 100,0% |
| TC dell Addome completo | B | 4 | 75,0% | 7 | 20,0% |
| | D | 8 | 100,0% | 20 | 40,0% |
| | P | 1 | 100,0% | 4 | 5,0% |
| | 0 | 7 | 100,0% | 20 | 35,0% |
| | Totale | 20 | 95,0% | 17 | 100,0% |

| | | | | | |
|--|--------|-----|--------|----|--------|
| TC dell Addome completo senza e con MDC | B | 28 | 92,9% | 4 | 18,7% |
| | D | 58 | 100,0% | 13 | 38,7% |
| | P | 17 | 100,0% | 34 | 11,3% |
| | 0 | 47 | 100,0% | 10 | 31,3% |
| | Totale | 150 | 98,7% | 13 | 100,0% |
| TC del Capo | B | 17 | 76,5% | 6 | 22,4% |
| | D | 31 | 100,0% | 31 | 40,8% |
| | P | 7 | 100,0% | 30 | 9,2% |
| | 0 | 21 | 95,2% | 33 | 27,6% |
| | Totale | 76 | 93,4% | 26 | 100,0% |
| TC del Capo senza e con MDC | B | 2 | 50,0% | 9 | 12,5% |
| | D | 11 | 100,0% | 7 | 68,8% |
| | P | 1 | 100,0% | 48 | 6,3% |
| | 0 | 2 | 100,0% | 17 | 12,5% |
| | Totale | 16 | 93,8% | 11 | 100,0% |
| TC del Rachide e dello speco vertebrale | B | 9 | 77,8% | 8 | 23,1% |
| | D | 20 | 100,0% | 39 | 51,3% |
| | P | 1 | 100,0% | 51 | 2,6% |
| | 0 | 9 | 100,0% | 27 | 23,1% |
| | Totale | 39 | 94,9% | 29 | 100,0% |
| TC di Bacino e articolazioni sacroiliache | B | 3 | 100,0% | 5 | 60,0% |
| | D | 2 | 100,0% | 45 | 40,0% |
| | Totale | 5 | 100,0% | 21 | 100,0% |
| RM dell Encefalo e del tronco encefalico | B | 22 | 50,0% | 9 | 18,2% |
| | D | 42 | 95,2% | 51 | 34,7% |
| | P | 24 | 91,7% | 74 | 19,8% |
| | 0 | 33 | 90,9% | 33 | 27,3% |
| | Totale | 121 | 85,1% | 43 | 100,0% |
| RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC | B | 16 | 68,8% | 12 | 17,4% |
| | D | 32 | 100,0% | 38 | 34,8% |
| | P | 9 | 100,0% | 62 | 9,8% |
| | 0 | 35 | 91,4% | 39 | 38,0% |
| | Totale | 92 | 91,3% | 36 | 100,0% |
| RM di addome inferiore e scavo pelvico | B | 2 | | 25 | 40,0% |
| | 0 | 3 | 100,0% | 35 | 60,0% |
| | Totale | 5 | 60,0% | 31 | 100,0% |
| RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC | B | 2 | 100,0% | 4 | 25,0% |
| | D | 3 | 66,7% | 57 | 37,5% |
| | 0 | 3 | 100,0% | 21 | 37,5% |
| | Totale | 8 | 87,5% | 31 | 100,0% |
| | B | 70 | 52,9% | 9 | 16,4% |
| | D | 213 | 91,5% | 53 | 50,0% |

| | | | | | |
|--|---------------|------------|---------------|-----------|---------------|
| RM della Colonna | P | 55 | 90,9% | 91 | 12,9% |
| | 0 | 88 | 94,3% | 30 | 20,7% |
| | Totale | 426 | 85,7% | 46 | 100,0% |
| RM della Colonna senza e con MDC | B | 4 | 100,0% | 4 | 26,7% |
| | D | 3 | 100,0% | 41 | 20,0% |
| | P | 1 | 100,0% | 45 | 6,7% |
| | 0 | 7 | 100,0% | 42 | 46,7% |
| | Totale | 15 | 100,0% | 32 | 100,0% |
| RM Muscoloscheletrica | B | 68 | 35,3% | 13 | 16,9% |
| | D | 204 | 97,5% | 47 | 50,6% |
| | P | 38 | 94,7% | 66 | 9,4% |
| | 0 | 93 | 94,6% | 29 | 23,1% |
| | Totale | 403 | 86,1% | 39 | 100,0% |
| RM Muscoloscheletrica senza e con MDC | B | 2 | 100,0% | 1 | 40,0% |
| | D | 3 | 66,7% | 43 | 60,0% |
| | Totale | 5 | 80,0% | 26 | 100,0% |
| Eco(color)dopplergrafia cardiaca | B | 40 | 95,0% | 8 | 8,6% |
| | D | 262 | 38,2% | 37 | 56,6% |
| | P | 19 | 94,7% | 62 | 4,1% |
| | 0 | 142 | 51,4% | 36 | 30,7% |
| | Totale | 463 | 49,5% | 35 | 100,0% |
| Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici | B | 19 | 31,6% | 20 | 5,0% |
| | D | 240 | 71,3% | 59 | 62,8% |
| | P | 27 | 74,1% | 93 | 7,1% |
| | 0 | 96 | 74,0% | 53 | 25,1% |
| | Totale | 382 | 70,2% | 58 | 100,0% |
| Diagnostica ecografica del Capo e del collo | B | 25 | 96,0% | 4 | 7,9% |
| | D | 159 | 96,2% | 7 | 50,0% |
| | P | 18 | 100,0% | 36 | 5,7% |
| | 0 | 116 | 96,6% | 5 | 36,5% |
| | Totale | 318 | 96,5% | 8 | 100,0% |
| Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo) | B | 90 | 57,8% | 13 | 16,5% |
| | D | 228 | 66,2% | 24 | 41,8% |
| | P | 43 | 95,3% | 40 | 7,9% |
| | 0 | 184 | 79,3% | 22 | 33,8% |
| | Totale | 545 | 71,6% | 23 | 100,0% |
| Ecografia della Mammella bilaterale | B | 15 | 40,0% | 19 | 14,9% |
| | D | 47 | 40,4% | 38 | 46,5% |
| | P | 9 | 77,8% | 70 | 8,9% |
| | 0 | 30 | 86,7% | 21 | 29,7% |
| | Totale | 101 | 57,4% | 33 | 100,0% |
| | D | 68 | 82,4% | 15 | 35,4% |

| | | | | | |
|--|--------|-----|--------|-----|--------|
| Ecografia Ostetrica | P | 115 | 100,0% | 6 | 59,9% |
| | 0 | 9 | 66,7% | 24 | 4,7% |
| | Totale | 192 | 92,2% | 10 | 100,0% |
| Ecografia Ginecologica | D | 15 | 93,3% | 12 | 62,5% |
| | 0 | 9 | 100,0% | 11 | 37,5% |
| | Totale | 24 | 95,8% | 11 | 100,0% |
| Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa | B | 58 | 32,8% | 20 | 17,7% |
| | D | 193 | 79,8% | 50 | 58,8% |
| | P | 21 | 85,7% | 83 | 6,4% |
| | 0 | 56 | 82,1% | 45 | 17,1% |
| | Totale | 328 | 72,3% | 46 | 100,0% |
| Colonscopia | B | 44 | 18,2% | 22 | 20,1% |
| | D | 92 | 22,8% | 56 | 42,0% |
| | 0 | 83 | 73,5% | 36 | 37,9% |
| | Totale | 219 | 41,1% | 42 | 100,0% |
| Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile | 0 | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% |
| | Totale | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% |
| Esofago-gastroduodenoscopia | B | 34 | 26,5% | 15 | 19,1% |
| | D | 97 | 33,0% | 54 | 54,5% |
| | 0 | 47 | 59,6% | 41 | 26,4% |
| | Totale | 178 | 38,8% | 43 | 100,0% |
| Elettrocardiogramma | B | 57 | 86,0% | 9 | 7,5% |
| | D | 435 | 81,1% | 22 | 57,0% |
| | P | 33 | 100,0% | 22 | 4,3% |
| | 0 | 238 | 78,6% | 23 | 31,2% |
| | Totale | 763 | 81,5% | 21 | 100,0% |
| Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | B | 17 | 17,6% | 22 | 20,2% |
| | D | 46 | 10,9% | 73 | 54,8% |
| | P | 3 | 33,3% | 148 | 3,6% |
| | 0 | 18 | 38,9% | 62 | 21,4% |
| | Totale | 84 | 19,0% | 63 | 100,0% |
| Esame audiometrico tonale | B | 13 | 61,5% | 9 | 10,7% |
| | D | 58 | 20,7% | 98 | 47,9% |
| | P | 6 | 16,7% | 113 | 5,0% |
| | 0 | 44 | 45,5% | 68 | 36,4% |
| | Totale | 121 | 33,9% | 78 | 100,0% |
| Spirometria semplice | B | 11 | 36,4% | 19 | 7,3% |
| | D | 99 | 100,0% | 40 | 66,0% |
| | P | 9 | 100,0% | 37 | 6,0% |
| | 0 | 31 | 100,0% | 36 | 20,7% |
| | Totale | 150 | 95,3% | 38 | 100,0% |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|------|--------|-----|--------|
| Spirometria globale | B | 3 | | 28 | 4,0% |
| | D | 34 | 100,0% | 42 | 45,3% |
| | P | 3 | 100,0% | 50 | 4,0% |
| | 0 | 35 | 100,0% | 43 | 46,7% |
| | Totale | 75 | 96,0% | 42 | 100,0% |
| Esame del fundus oculi | D | 33 | 78,8% | 50 | 68,8% |
| | P | 7 | 28,6% | 136 | 14,6% |
| | 0 | 8 | 62,5% | 81 | 16,7% |
| | Totale | 48 | 68,8% | 68 | 100,0% |
| Elettromiografia semplice | B | 3 | | 18 | 1,5% |
| | D | 140 | 38,6% | 77 | 69,7% |
| | P | 6 | 16,7% | 114 | 3,0% |
| | 0 | 52 | 53,8% | 56 | 25,9% |
| | Totale | 201 | 41,3% | 72 | 100,0% |
| Totale | | 5932 | 74,3% | | |