

101 - della Lunigiana

| Prestazioni diagnostica | Priorità | N Prestazioni | % Garanzia tempi attesa I disponibilità | Giorni di attesa I disp | % Priorità |
|------------------------------------------|----------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------|
| TC delTorace | B | 11 | 100,0% | 5 | 21,2% |
| | D | 26 | 92,3% | 12 | 50,0% |
| | P | 6 | 100,0% | 50 | 11,5% |
| | 0 | 9 | 100,0% | 5 | 17,3% |
| | Totale | 52 | 96,2% | 14 | 100,0% |
| TC delTorace senza e con MDC | B | 17 | 70,6% | 10 | 23,0% |
| | D | 21 | 100,0% | 15 | 28,4% |
| | P | 16 | 100,0% | 18 | 21,6% |
| | 0 | 20 | 95,0% | 10 | 27,0% |
| | Totale | 74 | 91,9% | 13 | 100,0% |
| TC dell Addome superiore | B | 1 | 100,0% | 5 | 50,0% |
| | D | 1 | 100,0% | 7 | 50,0% |
| | Totale | 2 | 100,0% | 6 | 100,0% |
| TC dell Addome superiore senza e con MDC | 0 | 2 | 50,0% | 59 | 100,0% |
| | Totale | 2 | 50,0% | 59 | 100,0% |
| TC dell Addome inferiore | B | 1 | 100,0% | 5 | 100,0% |
| | Totale | 1 | 100,0% | 5 | 100,0% |
| TC dell Addome completo | B | 8 | 37,5% | 17 | 38,1% |
| | D | 11 | 100,0% | 17 | 52,4% |
| | 0 | 2 | 100,0% | 32 | 9,5% |
| | Totale | 21 | 76,2% | 18 | 100,0% |
| TC dell Addome completo senza e con MDC | B | 24 | 58,3% | 11 | 26,4% |
| | D | 28 | 100,0% | 18 | 30,8% |
| | P | 17 | 100,0% | 19 | 18,7% |
| | 0 | 22 | 90,9% | 14 | 24,2% |
| | Totale | 91 | 86,8% | 16 | 100,0% |
| TC del Capo | B | 28 | 67,9% | 10 | 44,4% |
| | D | 29 | 100,0% | 13 | 46,0% |
| | P | 2 | 100,0% | 60 | 3,2% |
| | 0 | 4 | 50,0% | 36 | 6,3% |
| | Totale | 63 | 82,5% | 14 | 100,0% |
| | B | 9 | 55,6% | 11 | 45,0% |
| | D | 7 | 100,0% | 15 | 35,0% |

Zona di erogazione - Diagnostic

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------|--------|-----|--------|-----|--------|
| TC del Capo senza e con MDC | 0 | 4 | 100,0% | 7 | 20,0% |
| | Totale | 20 | 80,0% | 11 | 100,0% |
| TC del Rachide e dello speco vertebrale | B | 10 | 40,0% | 16 | 34,5% |
| | D | 15 | 100,0% | 14 | 51,7% |
| | P | 1 | 100,0% | 22 | 3,4% |
| | 0 | 3 | 100,0% | 56 | 10,3% |
| | Totale | 29 | 79,3% | 19 | 100,0% |
| TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC | D | 1 | 100,0% | 20 | 100,0% |
| | Totale | 1 | 100,0% | 20 | 100,0% |
| TC di Bacino e articolazioni sacroiliache | D | 1 | 100,0% | 8 | 100,0% |
| | Totale | 1 | 100,0% | 8 | 100,0% |
| RM dell Encefalo e del tronco encefalico | B | 1 | | 21 | 33,3% |
| | D | 2 | 100,0% | 45 | 66,7% |
| | Totale | 3 | 66,7% | 37 | 100,0% |
| RM della Colonna | B | 1 | 100,0% | 5 | 9,1% |
| | D | 10 | 100,0% | 17 | 90,9% |
| | Totale | 11 | 100,0% | 16 | 100,0% |
| RM Muscoloscheletrica | B | 21 | 9,5% | 23 | 43,8% |
| | D | 23 | 100,0% | 20 | 47,9% |
| | P | 1 | 100,0% | 0 | 2,1% |
| | 0 | 3 | 100,0% | 13 | 6,3% |
| | Totale | 48 | 60,4% | 20 | 100,0% |
| Eco(color)dopplergrafia cardiaca | B | 13 | 92,3% | 8 | 13,5% |
| | D | 64 | 21,9% | 76 | 66,7% |
| | P | 6 | 33,3% | 102 | 6,3% |
| | 0 | 13 | 76,9% | 24 | 13,5% |
| | Totale | 96 | 39,6% | 61 | 100,0% |
| Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici | D | 56 | 21,4% | 208 | 94,9% |
| | 0 | 3 | 33,3% | 199 | 5,1% |
| | Totale | 59 | 22,0% | 208 | 100,0% |
| Diagnostica ecografica del Capo e del collo | B | 14 | 100,0% | 5 | 11,2% |
| | D | 86 | 60,5% | 32 | 68,8% |
| | P | 3 | 33,3% | 99 | 2,4% |
| | 0 | 22 | 86,4% | 20 | 17,6% |
| | Totale | 125 | 68,8% | 29 | 100,0% |
| Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo) | B | 84 | 85,7% | 8 | 17,2% |
| | D | 299 | 63,2% | 33 | 61,4% |
| | P | 22 | 59,1% | 117 | 4,5% |
| | 0 | 82 | 64,6% | 67 | 16,8% |
| | Totale | 487 | 67,1% | 38 | 100,0% |

Zona di erogazione - Diagnostic

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|-----|--------|
| Ecografia Ostetrica | D | 1 | 100,0% | 0 | 1,4% |
| | P | 68 | 100,0% | 2 | 98,6% |
| | Totale | 69 | 100,0% | 2 | 100,0% |
| Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa | B | 11 | 100,0% | 6 | 55,0% |
| | D | 9 | 100,0% | 6 | 45,0% |
| | Totale | 20 | 100,0% | 6 | 100,0% |
| Colonscopia | B | 16 | 31,3% | 17 | 18,8% |
| | D | 59 | 20,3% | 95 | 69,4% |
| | P | 1 | | 187 | 1,2% |
| | O | 9 | 44,4% | 103 | 10,6% |
| | Totale | 85 | 24,7% | 82 | 100,0% |
| Esofago-gastroduodenoscopia | B | 12 | 75,0% | 7 | 13,5% |
| | D | 60 | 38,3% | 60 | 67,4% |
| | P | 4 | | 127 | 4,5% |
| | O | 13 | 30,8% | 82 | 14,6% |
| | Totale | 89 | 40,4% | 59 | 100,0% |
| Elettrocardiogramma | B | 64 | 98,4% | 3 | 14,7% |
| | D | 283 | 91,5% | 9 | 64,9% |
| | P | 32 | 100,0% | 7 | 7,3% |
| | O | 57 | 98,2% | 6 | 13,1% |
| | Totale | 436 | 94,0% | 8 | 100,0% |
| Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | B | 2 | 100,0% | 1 | 2,1% |
| | D | 67 | 22,4% | 47 | 69,8% |
| | P | 11 | 100,0% | 49 | 11,5% |
| | O | 16 | 12,5% | 52 | 16,7% |
| | Totale | 96 | 31,3% | 47 | 100,0% |
| Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro | B | 1 | 100,0% | 6 | 3,2% |
| | D | 23 | 17,4% | 78 | 74,2% |
| | P | 2 | 50,0% | 110 | 6,5% |
| | O | 5 | 40,0% | 72 | 16,1% |
| | Totale | 31 | 25,8% | 77 | 100,0% |
| Esame audiometrico tonale | B | 3 | 100,0% | 2 | 5,6% |
| | D | 45 | 100,0% | 10 | 83,3% |
| | O | 6 | 100,0% | 23 | 11,1% |
| | Totale | 54 | 100,0% | 11 | 100,0% |
| Esame del fundus oculi | D | 26 | 53,8% | 32 | 65,0% |
| | P | 3 | 100,0% | 25 | 7,5% |
| | O | 11 | 36,4% | 40 | 27,5% |
| | Totale | 40 | 52,5% | 34 | 100,0% |
| Totale | | 2106 | 70,5% | | |

101 - delle Apuane

| Prestazioni diagnostica | Priorità | N Prestazioni | % Garanzia tempi attesa I disponibilità | Giorni di attesa I disp | % Priorità |
|------------------------------------------|----------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------|
| Mammografia bilaterale | U | 1 | 100,0% | 3 | 0,4% |
| | B | 31 | 100,0% | 3 | 13,1% |
| | D | 94 | 47,9% | 79 | 39,8% |
| | P | 13 | 46,2% | 84 | 5,5% |
| | 0 | 97 | 96,9% | 20 | 41,1% |
| | Totale | 236 | 75,0% | 45 | 100,0% |
| Mammografia monolaterale | B | 2 | 100,0% | 8 | 18,2% |
| | D | 1 | 100,0% | 0 | 9,1% |
| | P | 2 | 100,0% | 4 | 18,2% |
| | 0 | 6 | 83,3% | 38 | 54,5% |
| | Totale | 11 | 90,9% | 23 | 100,0% |
| TC delTorace | B | 36 | 100,0% | 5 | 29,3% |
| | D | 60 | 98,3% | 8 | 48,8% |
| | P | 1 | 100,0% | 5 | 0,8% |
| | 0 | 26 | 100,0% | 6 | 21,1% |
| | Totale | 123 | 99,2% | 7 | 100,0% |
| TC delTorace senza e con MDC | B | 47 | 95,7% | 5 | 26,1% |
| | D | 38 | 89,5% | 26 | 21,1% |
| | P | 3 | 100,0% | 3 | 1,7% |
| | 0 | 92 | 98,9% | 6 | 51,1% |
| | Totale | 180 | 96,1% | 10 | 100,0% |
| TC dell Addome superiore | B | 2 | 50,0% | 15 | 66,7% |
| | D | 1 | 100,0% | 5 | 33,3% |
| | Totale | 3 | 66,7% | 12 | 100,0% |
| TC dell Addome superiore senza e con MDC | B | 4 | 100,0% | 4 | 57,1% |
| | D | 1 | | 151 | 14,3% |
| | 0 | 2 | 100,0% | 0 | 28,6% |
| | Totale | 7 | 85,7% | 24 | 100,0% |
| TC dell Addome inferiore | B | 1 | | 22 | 33,3% |
| | D | 2 | 100,0% | 4 | 66,7% |
| | Totale | 3 | 66,7% | 10 | 100,0% |
| TC dell Addome inferiore senza e con MDC | D | 2 | 100,0% | 10 | 100,0% |
| | Totale | 2 | 100,0% | 10 | 100,0% |
| TC dell Addome completo | B | 20 | 90,0% | 6 | 54,1% |
| | D | 16 | 100,0% | 9 | 43,2% |
| | 0 | 1 | 100,0% | 7 | 2,7% |

Zona di erogazione - Diagnostic

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------|--------|-----|--------|-----|--------|
| | Totale | 37 | 94,6% | 8 | 100,0% |
| TC dell Addome completo senza e con MDC | B | 72 | 93,1% | 5 | 33,2% |
| | D | 46 | 100,0% | 12 | 21,2% |
| | P | 6 | 100,0% | 6 | 2,8% |
| | 0 | 93 | 98,9% | 7 | 42,9% |
| | Totale | 217 | 97,2% | 8 | 100,0% |
| TC del Capo | B | 47 | 95,7% | 7 | 54,0% |
| | D | 38 | 100,0% | 12 | 43,7% |
| | 0 | 2 | 100,0% | 5 | 2,3% |
| | Totale | 87 | 97,7% | 9 | 100,0% |
| TC del Capo senza e con MDC | B | 19 | 100,0% | 4 | 33,9% |
| | D | 11 | 45,5% | 85 | 19,6% |
| | P | 2 | 100,0% | 7 | 3,6% |
| | 0 | 24 | 100,0% | 5 | 42,9% |
| | Totale | 56 | 89,3% | 20 | 100,0% |
| TC del Rachide e dello speco vertebrale | B | 26 | 100,0% | 5 | 53,1% |
| | D | 22 | 100,0% | 7 | 44,9% |
| | 0 | 1 | 100,0% | 1 | 2,0% |
| | Totale | 49 | 100,0% | 6 | 100,0% |
| TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC | D | 3 | 100,0% | 12 | 100,0% |
| | Totale | 3 | 100,0% | 12 | 100,0% |
| TC di Bacino e articolazioni sacroiliache | B | 3 | 100,0% | 8 | 33,3% |
| | D | 5 | 100,0% | 12 | 55,6% |
| | 0 | 1 | 100,0% | 1 | 11,1% |
| | Totale | 9 | 100,0% | 9 | 100,0% |
| RM dell Encefalo e del tronco encefalico | B | 12 | 66,7% | 10 | 20,0% |
| | D | 44 | 81,8% | 50 | 73,3% |
| | 0 | 4 | 50,0% | 97 | 6,7% |
| | Totale | 60 | 76,7% | 45 | 100,0% |
| RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC | B | 41 | 100,0% | 5 | 32,5% |
| | D | 62 | 93,5% | 25 | 49,2% |
| | P | 5 | 100,0% | 4 | 4,0% |
| | 0 | 18 | 94,4% | 14 | 14,3% |
| | Totale | 126 | 96,0% | 16 | 100,0% |
| RM di addome inferiore e scavo pelvico | B | 3 | 66,7% | 9 | 60,0% |
| | D | 1 | | 180 | 20,0% |
| | 0 | 1 | 100,0% | 16 | 20,0% |
| | Totale | 5 | 60,0% | 45 | 100,0% |
| | B | 6 | 100,0% | 4 | 27,3% |
| | D | 5 | 100,0% | 13 | 22,7% |

Zona di erogazione - Diagnostic

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------|--------|-----|--------|-----|--------|
| RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC | P | 1 | 100,0% | 3 | 4,5% |
| | 0 | 10 | 100,0% | 6 | 45,5% |
| | Totale | 22 | 100,0% | 7 | 100,0% |
| | | | | | |
| RM della Colonna | B | 60 | 75,0% | 10 | 24,0% |
| | D | 179 | 85,5% | 44 | 71,6% |
| | P | 2 | 100,0% | 5 | 0,8% |
| | 0 | 9 | 88,9% | 28 | 3,6% |
| | Totale | 250 | 83,2% | 35 | 100,0% |
| RM della Colonna senza e con MDC | B | 13 | 100,0% | 5 | 31,7% |
| | D | 21 | 100,0% | 6 | 51,2% |
| | 0 | 7 | 85,7% | 24 | 17,1% |
| | Totale | 41 | 97,6% | 9 | 100,0% |
| RM Muscoloscheletrica | B | 40 | 32,5% | 15 | 20,8% |
| | D | 146 | 89,0% | 42 | 76,0% |
| | P | 1 | 100,0% | 0 | 0,5% |
| | 0 | 5 | 100,0% | 25 | 2,6% |
| | Totale | 192 | 77,6% | 35 | 100,0% |
| RM Muscoloscheletrica senza e con MDC | B | 4 | 100,0% | 6 | 40,0% |
| | D | 3 | 100,0% | 22 | 30,0% |
| | P | 1 | 100,0% | 3 | 10,0% |
| | 0 | 2 | 100,0% | 0 | 20,0% |
| | Totale | 10 | 100,0% | 9 | 100,0% |
| Eco(color)dopplergrafia cardiaca | B | 105 | 89,5% | 9 | 12,0% |
| | D | 476 | 18,1% | 78 | 54,5% |
| | P | 189 | 95,8% | 35 | 21,6% |
| | 0 | 104 | 44,2% | 58 | 11,9% |
| | Totale | 874 | 46,6% | 58 | 100,0% |
| Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici | B | 40 | 87,5% | 7 | 10,2% |
| | D | 288 | 48,3% | 111 | 73,1% |
| | P | 22 | 22,7% | 272 | 5,6% |
| | 0 | 44 | 45,5% | 129 | 11,2% |
| | Totale | 394 | 50,5% | 111 | 100,0% |
| Diagnostica ecografica del Capo e del collo | B | 12 | 91,7% | 8 | 3,2% |
| | D | 36 | 97,2% | 13 | 9,7% |
| | P | 2 | 50,0% | 112 | 0,5% |
| | 0 | 323 | 97,5% | 3 | 86,6% |
| | Totale | 373 | 97,1% | 5 | 100,0% |
| Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo) | B | 42 | 90,5% | 10 | 24,3% |
| | D | 110 | 84,5% | 28 | 63,6% |
| | 0 | 21 | 76,2% | 23 | 12,1% |
| | Totale | 173 | 85,0% | 23 | 100,0% |

Zona di erogazione - Diagnostic

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|-----|--------|
| Ecografia della Mammella bilaterale | B | 54 | 100,0% | 2 | 50,0% |
| | D | 39 | 43,6% | 82 | 36,1% |
| | P | 12 | 66,7% | 50 | 11,1% |
| | 0 | 3 | 66,7% | 50 | 2,8% |
| | Totale | 108 | 75,0% | 38 | 100,0% |
| Ecografia della Mammella monolaterale | B | 3 | 100,0% | 5 | 75,0% |
| | 0 | 1 | 100,0% | 0 | 25,0% |
| | Totale | 4 | 100,0% | 4 | 100,0% |
| Ecografia Ostetrica | D | 2 | 100,0% | 8 | 1,0% |
| | P | 192 | 99,5% | 4 | 97,0% |
| | 0 | 4 | 100,0% | 4 | 2,0% |
| | Totale | 198 | 99,5% | 4 | 100,0% |
| Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa | B | 33 | 66,7% | 9 | 15,6% |
| | D | 145 | 22,8% | 147 | 68,4% |
| | P | 13 | 61,5% | 133 | 6,1% |
| | 0 | 21 | 28,6% | 126 | 9,9% |
| | Totale | 212 | 32,5% | 122 | 100,0% |
| Colonscopia | U | 1 | | 10 | 0,4% |
| | B | 76 | 9,2% | 21 | 33,9% |
| | D | 116 | 30,2% | 93 | 51,8% |
| | P | 12 | 41,7% | 181 | 5,4% |
| | 0 | 19 | 31,6% | 148 | 8,5% |
| | Totale | 224 | 23,7% | 78 | 100,0% |
| Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile | P | 1 | | 143 | 100,0% |
| | Totale | 1 | | 143 | 100,0% |
| Esofago-gastroduodenoscopia | B | 44 | 68,2% | 8 | 23,2% |
| | D | 131 | 45,8% | 49 | 68,9% |
| | P | 2 | 100,0% | 18 | 1,1% |
| | 0 | 13 | 69,2% | 32 | 6,8% |
| | Totale | 190 | 53,2% | 38 | 100,0% |
| Elettrocardiogramma | B | 207 | 96,6% | 3 | 10,5% |
| | D | 961 | 80,1% | 20 | 48,7% |
| | P | 308 | 99,0% | 9 | 15,6% |
| | 0 | 496 | 95,6% | 8 | 25,2% |
| | Totale | 1972 | 88,7% | 14 | 100,0% |
| Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | B | 54 | 55,6% | 9 | 29,3% |
| | D | 92 | 30,4% | 42 | 50,0% |
| | P | 9 | 88,9% | 50 | 4,9% |
| | 0 | 29 | 44,8% | 34 | 15,8% |
| | Totale | 184 | 42,9% | 31 | 100,0% |
| | U | 1 | 100,0% | 0 | 1,1% |

Zona di erogazione - Diagnostic

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|-----|--------|
| Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro | B | 21 | 100,0% | 6 | 23,6% |
| | D | 44 | 22,7% | 62 | 49,4% |
| | P | 9 | 100,0% | 52 | 10,1% |
| | O | 14 | 28,6% | 59 | 15,7% |
| | Totale | 89 | 50,6% | 46 | 100,0% |
| Esame audiometrico tonale | B | 8 | 100,0% | 3 | 3,8% |
| | D | 133 | 98,5% | 18 | 63,9% |
| | P | 29 | 96,6% | 24 | 13,9% |
| | O | 38 | 71,1% | 41 | 18,3% |
| | Totale | 208 | 93,3% | 23 | 100,0% |
| Spirometria semplice | D | 1 | 100,0% | 0 | 1,3% |
| | P | 28 | 100,0% | 16 | 36,8% |
| | O | 47 | 97,9% | 16 | 61,8% |
| | Totale | 76 | 98,7% | 16 | 100,0% |
| Spirometria globale | P | 2 | 100,0% | 0 | 18,2% |
| | O | 9 | 77,8% | 24 | 81,8% |
| | Totale | 11 | 81,8% | 19 | 100,0% |
| Fotografia del fundus | D | 2 | 100,0% | 13 | 50,0% |
| | O | 2 | 100,0% | 11 | 50,0% |
| | Totale | 4 | 100,0% | 12 | 100,0% |
| Esame del fundus oculi | B | 11 | 27,3% | 12 | 4,9% |
| | D | 139 | 43,9% | 36 | 61,8% |
| | P | 6 | 100,0% | 22 | 2,7% |
| | O | 69 | 29,0% | 42 | 30,7% |
| | Totale | 225 | 40,0% | 37 | 100,0% |
| Elettromiografia semplice | B | 69 | 18,8% | 15 | 16,5% |
| | D | 326 | 16,6% | 114 | 77,8% |
| | O | 24 | 16,7% | 104 | 5,7% |
| | Totale | 419 | 16,9% | 97 | 100,0% |
| Totale | | 7668 | 71,3% | | |

102 - della Piana di Lucca

| Prestazioni diagnostica | Priorità | N Prestazioni | % Garanzia tempi attesa I disponibilità | Giorni di attesa I disp | % Priorità |
|-------------------------|----------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------|
| Mammografia bilaterale | B | 19 | 78,9% | 6 | 9,3% |
| | D | 147 | 40,8% | 142 | 72,1% |
| | P | 17 | 47,1% | 237 | 8,3% |
| | O | 21 | 42,9% | 222 | 10,3% |

Zona di erogazione - Diagnostic

| | | | | | |
|------------------------------------------|--------|-----|--------|-----|--------|
| | Totale | 204 | 45,1% | 146 | 100,0% |
| Mammografia monolaterale | B | 3 | 66,7% | 9 | 8,6% |
| | D | 26 | 92,3% | 30 | 74,3% |
| | P | 1 | | 381 | 2,9% |
| | 0 | 5 | 80,0% | 108 | 14,3% |
| | Totale | 35 | 85,7% | 49 | 100,0% |
| TC delTorace | B | 59 | 84,7% | 7 | 31,6% |
| | D | 79 | 98,7% | 13 | 42,2% |
| | P | 3 | 100,0% | 19 | 1,6% |
| | 0 | 46 | 100,0% | 9 | 24,6% |
| | Totale | 187 | 94,7% | 10 | 100,0% |
| TC delTorace senza e con MDC | B | 68 | 47,1% | 16 | 45,9% |
| | D | 50 | 74,0% | 35 | 33,8% |
| | P | 11 | 81,8% | 26 | 7,4% |
| | 0 | 19 | 73,7% | 33 | 12,8% |
| | Totale | 148 | 62,2% | 26 | 100,0% |
| TC dell Addome superiore | 0 | 1 | 100,0% | 11 | 100,0% |
| | Totale | 1 | 100,0% | 11 | 100,0% |
| TC dell Addome superiore senza e con MDC | D | 3 | 100,0% | 2 | 75,0% |
| | 0 | 1 | 100,0% | 22 | 25,0% |
| | Totale | 4 | 100,0% | 7 | 100,0% |
| TC dell Addome inferiore | B | 1 | 100,0% | 6 | 16,7% |
| | D | 4 | 100,0% | 9 | 66,7% |
| | 0 | 1 | 100,0% | 20 | 16,7% |
| | Totale | 6 | 100,0% | 10 | 100,0% |
| TC dell Addome inferiore senza e con MDC | D | 2 | 100,0% | 8 | 100,0% |
| | Totale | 2 | 100,0% | 8 | 100,0% |
| TC dell Addome completo | B | 14 | 78,6% | 8 | 35,0% |
| | D | 14 | 100,0% | 15 | 35,0% |
| | P | 3 | 33,3% | 87 | 7,5% |
| | 0 | 9 | 88,9% | 24 | 22,5% |
| | Totale | 40 | 85,0% | 20 | 100,0% |
| TC dell Addome completo senza e con MDC | B | 66 | 51,5% | 15 | 36,5% |
| | D | 71 | 83,1% | 26 | 39,2% |
| | P | 17 | 88,2% | 25 | 9,4% |
| | 0 | 27 | 81,5% | 24 | 14,9% |
| | Totale | 181 | 71,8% | 22 | 100,0% |
| | U | 2 | 100,0% | 0 | 1,2% |
| | B | 57 | 96,5% | 6 | 34,1% |
| | D | 80 | 90,0% | 22 | 47,9% |

Zona di erogazione - Diagnostic

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------|--------|-----|--------|-----|--------|
| TC del Capo | P | 8 | 50,0% | 77 | 4,8% |
| | 0 | 20 | 85,0% | 23 | 12,0% |
| | Totale | 167 | 89,8% | 19 | 100,0% |
| | | | | | |
| TC del Capo senza e con MDC | B | 15 | 40,0% | 17 | 40,5% |
| | D | 16 | 62,5% | 48 | 43,2% |
| | 0 | 6 | 83,3% | 27 | 16,2% |
| | Totale | 37 | 56,8% | 32 | 100,0% |
| TC del Rachide e dello speco vertebrale | B | 26 | 100,0% | 5 | 31,0% |
| | D | 40 | 95,0% | 18 | 47,6% |
| | P | 3 | 66,7% | 63 | 3,6% |
| | 0 | 15 | 86,7% | 28 | 17,9% |
| | Totale | 84 | 94,0% | 17 | 100,0% |
| TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC | B | 2 | | 28 | 100,0% |
| | Totale | 2 | | 28 | 100,0% |
| TC di Bacino e articolazioni sacroiliache | B | 3 | 100,0% | 5 | 33,3% |
| | D | 3 | 100,0% | 15 | 33,3% |
| | P | 2 | 100,0% | 28 | 22,2% |
| | 0 | 1 | | 128 | 11,1% |
| | Totale | 9 | 88,9% | 27 | 100,0% |
| RM dell Encefalo e del tronco encefalico | B | 37 | 97,3% | 7 | 27,2% |
| | D | 87 | 100,0% | 28 | 64,0% |
| | P | 4 | 100,0% | 19 | 2,9% |
| | 0 | 8 | 100,0% | 14 | 5,9% |
| | Totale | 136 | 99,3% | 21 | 100,0% |
| RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC | B | 45 | 88,9% | 8 | 21,0% |
| | D | 99 | 99,0% | 11 | 46,3% |
| | P | 10 | 20,0% | 262 | 4,7% |
| | 0 | 60 | 90,0% | 35 | 28,0% |
| | Totale | 214 | 90,7% | 28 | 100,0% |
| RM di addome inferiore e scavo pelvico | D | 1 | | 144 | 100,0% |
| | Totale | 1 | | 144 | 100,0% |
| RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC | B | 6 | 83,3% | 9 | 46,2% |
| | D | 5 | 80,0% | 33 | 38,5% |
| | P | 1 | 100,0% | 0 | 7,7% |
| | 0 | 1 | | 150 | 7,7% |
| | Totale | 13 | 76,9% | 28 | 100,0% |
| RM della Colonna | B | 135 | 94,1% | 6 | 20,9% |
| | D | 432 | 98,6% | 15 | 66,9% |
| | P | 13 | 92,3% | 49 | 2,0% |
| | 0 | 66 | 100,0% | 10 | 10,2% |
| | Totale | 646 | 97,7% | 13 | 100,0% |

Zona di erogazione - Diagnostic

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------|--------|------|--------|-----|--------|
| RM della Colonna senza e con MDC | U | 1 | 100,0% | 0 | 1,9% |
| | B | 18 | 100,0% | 6 | 33,3% |
| | D | 11 | 100,0% | 12 | 20,4% |
| | P | 3 | 33,3% | 244 | 5,6% |
| | 0 | 21 | 85,7% | 51 | 38,9% |
| | Totale | 54 | 90,7% | 38 | 100,0% |
| RM Muscoloscheletrica | U | 1 | 100,0% | 0 | 0,2% |
| | B | 117 | 98,3% | 6 | 22,3% |
| | D | 353 | 99,4% | 17 | 67,2% |
| | P | 10 | 100,0% | 12 | 1,9% |
| | 0 | 44 | 100,0% | 14 | 8,4% |
| | Totale | 525 | 99,2% | 14 | 100,0% |
| RM Muscoloscheletrica senza e con MDC | B | 3 | 100,0% | 9 | 33,3% |
| | D | 3 | 66,7% | 51 | 33,3% |
| | 0 | 3 | 100,0% | 7 | 33,3% |
| | Totale | 9 | 88,9% | 22 | 100,0% |
| Eco(color)dopplergrafia cardiaca | B | 76 | 100,0% | 6 | 12,1% |
| | D | 409 | 26,2% | 39 | 65,2% |
| | P | 19 | 31,6% | 187 | 3,0% |
| | 0 | 123 | 39,0% | 43 | 19,6% |
| | Totale | 627 | 37,8% | 40 | 100,0% |
| Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici | B | 44 | 100,0% | 5 | 4,7% |
| | D | 703 | 98,0% | 24 | 75,5% |
| | P | 31 | 45,2% | 205 | 3,3% |
| | 0 | 153 | 93,5% | 38 | 16,4% |
| | Totale | 931 | 95,6% | 32 | 100,0% |
| Diagnostica ecografica del Capo e del collo | B | 46 | 97,8% | 4 | 5,8% |
| | D | 481 | 91,9% | 15 | 61,0% |
| | P | 32 | 65,6% | 70 | 4,1% |
| | 0 | 230 | 95,2% | 11 | 29,2% |
| | Totale | 789 | 92,1% | 15 | 100,0% |
| Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo) | B | 240 | 93,3% | 7 | 15,0% |
| | D | 925 | 62,1% | 30 | 57,7% |
| | P | 84 | 78,6% | 61 | 5,2% |
| | 0 | 353 | 66,3% | 28 | 22,0% |
| | Totale | 1602 | 68,5% | 28 | 100,0% |
| Ecografia della Mammella bilaterale | B | 52 | 51,9% | 11 | 40,3% |
| | D | 49 | 36,7% | 58 | 38,0% |
| | P | 2 | 100,0% | 5 | 1,6% |
| | 0 | 26 | 69,2% | 33 | 20,2% |
| | Totale | 129 | 50,4% | 33 | 100,0% |

Zona di erogazione - Diagnostic

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|-----|--------|
| Ecografia della Mammella monolaterale | B | 2 | 100,0% | 0 | 100,0% |
| | Totale | 2 | 100,0% | 0 | 100,0% |
| Ecografia Ostetrica | B | 2 | 100,0% | 4 | 1,1% |
| | D | 4 | 75,0% | 10 | 2,2% |
| | P | 90 | 100,0% | 8 | 50,0% |
| | 0 | 84 | 64,3% | 40 | 46,7% |
| | Totale | 180 | 82,8% | 23 | 100,0% |
| Ecografia Ginecologica | B | 1 | 100,0% | 10 | 8,3% |
| | D | 5 | 100,0% | 3 | 41,7% |
| | P | 4 | 100,0% | 27 | 33,3% |
| | 0 | 2 | | 45 | 16,7% |
| | Totale | 12 | 83,3% | 19 | 100,0% |
| Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa | U | 3 | 100,0% | 0 | 0,5% |
| | B | 115 | 97,4% | 5 | 18,6% |
| | D | 345 | 100,0% | 19 | 55,7% |
| | P | 37 | 54,1% | 73 | 6,0% |
| | 0 | 119 | 97,5% | 15 | 19,2% |
| | Totale | 619 | 96,3% | 19 | 100,0% |
| Colonscopia | U | 1 | 100,0% | 0 | 0,2% |
| | B | 169 | 27,8% | 15 | 28,3% |
| | D | 313 | 22,4% | 63 | 52,3% |
| | P | 56 | 80,4% | 66 | 9,4% |
| | 0 | 59 | 35,6% | 57 | 9,9% |
| | Totale | 598 | 30,8% | 49 | 100,0% |
| Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile | B | 8 | 62,5% | 9 | 61,5% |
| | D | 2 | 50,0% | 68 | 15,4% |
| | P | 2 | 50,0% | 181 | 15,4% |
| | 0 | 1 | 100,0% | 4 | 7,7% |
| | Totale | 13 | 61,5% | 44 | 100,0% |
| Esofago-gastroduodenoscopia | B | 80 | 88,8% | 7 | 29,9% |
| | D | 161 | 36,6% | 55 | 60,1% |
| | P | 6 | 83,3% | 39 | 2,2% |
| | 0 | 21 | 57,1% | 40 | 7,8% |
| | Totale | 268 | 54,9% | 39 | 100,0% |
| Elettrocardiogramma | B | 179 | 99,4% | 2 | 17,0% |
| | D | 559 | 98,6% | 2 | 53,2% |
| | P | 100 | 99,0% | 4 | 9,5% |
| | 0 | 212 | 99,5% | 2 | 20,2% |
| | Totale | 1050 | 99,0% | 2 | 100,0% |
| | B | 50 | 40,0% | 15 | 24,8% |
| | D | 97 | 30,9% | 45 | 48,0% |

Zona di erogazione - Diagnostic

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | P | 23 | 87,0% | 60 | 11,4% |
| | 0 | 32 | 40,6% | 45 | 15,8% |
| | Totale | 202 | 41,1% | 39 | 100,0% |
| Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro | B | 18 | 16,7% | 16 | 23,4% |
| | D | 48 | 29,2% | 75 | 62,3% |
| | P | 5 | 40,0% | 230 | 6,5% |
| | 0 | 6 | 33,3% | 128 | 7,8% |
| | Totale | 77 | 27,3% | 75 | 100,0% |
| Esame audiometrico tonale | B | 5 | 80,0% | 4 | 2,4% |
| | D | 63 | 92,1% | 10 | 30,0% |
| | P | 69 | 95,7% | 10 | 32,9% |
| | 0 | 73 | 93,2% | 10 | 34,8% |
| | Totale | 210 | 93,3% | 10 | 100,0% |
| Spirometria semplice | B | 2 | | 19 | 7,7% |
| | D | 12 | | 129 | 46,2% |
| | P | 5 | 20,0% | 143 | 19,2% |
| | 0 | 7 | 28,6% | 102 | 26,9% |
| | Totale | 26 | 11,5% | 116 | 100,0% |
| Spirometria globale | B | 13 | 23,1% | 12 | 9,4% |
| | D | 69 | 33,3% | 88 | 49,6% |
| | P | 14 | 35,7% | 97 | 10,1% |
| | 0 | 43 | 62,8% | 54 | 30,9% |
| | Totale | 139 | 41,7% | 71 | 100,0% |
| Fotografia del fundus | D | 3 | 100,0% | 11 | 100,0% |
| | Totale | 3 | 100,0% | 11 | 100,0% |
| Esame del fundus oculi | D | 5 | 80,0% | 37 | 4,8% |
| | P | 88 | 30,7% | 132 | 83,8% |
| | 0 | 12 | 91,7% | 24 | 11,4% |
| | Totale | 105 | 40,0% | 115 | 100,0% |
| Elettromiografia semplice | B | 88 | 72,7% | 8 | 19,1% |
| | D | 309 | 65,0% | 53 | 67,0% |
| | P | 16 | 100,0% | 10 | 3,5% |
| | 0 | 48 | 75,0% | 45 | 10,4% |
| | Totale | 461 | 68,8% | 42 | 100,0% |
| Totale | | 10748 | 76,7% | | |

Zona di erogazione - Diagnostic

| Prestazioni diagnostica | Priorità | N Prestazioni | % Garanzia tempi attesa I disponibilità | Giorni di attesa I disp | % Priorità |
|------------------------------------------|----------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------|
| Mammografia bilaterale | B | 3 | 33,3% | 9 | 75,0% |
| | D | 1 | 100,0% | 5 | 25,0% |
| | Totale | 4 | 50,0% | 8 | 100,0% |
| TC delTorace | B | 2 | 100,0% | 3 | 11,1% |
| | D | 11 | 45,5% | 59 | 61,1% |
| | P | 1 | | 172 | 5,6% |
| | 0 | 4 | 100,0% | 12 | 22,2% |
| | Totale | 18 | 61,1% | 49 | 100,0% |
| TC delTorace senza e con MDC | B | 2 | | 27 | 8,0% |
| | D | 15 | 86,7% | 24 | 60,0% |
| | P | 1 | 100,0% | 4 | 4,0% |
| | 0 | 7 | 85,7% | 25 | 28,0% |
| | Totale | 25 | 80,0% | 24 | 100,0% |
| TC dell Addome superiore senza e con MDC | D | 1 | | 131 | 100,0% |
| | Totale | 1 | | 131 | 100,0% |
| TC dell Addome completo | B | 1 | 100,0% | 4 | 100,0% |
| | Totale | 1 | 100,0% | 4 | 100,0% |
| TC dell Addome completo senza e con MDC | B | 4 | 50,0% | 14 | 15,4% |
| | D | 17 | 70,6% | 46 | 65,4% |
| | P | 1 | 100,0% | 21 | 3,8% |
| | 0 | 4 | 100,0% | 6 | 15,4% |
| | Totale | 26 | 73,1% | 34 | 100,0% |
| TC del Capo | B | 3 | 100,0% | 4 | 18,8% |
| | D | 10 | 80,0% | 31 | 62,5% |
| | P | 2 | 50,0% | 69 | 12,5% |
| | 0 | 1 | | 126 | 6,3% |
| | Totale | 16 | 75,0% | 37 | 100,0% |
| TC del Capo senza e con MDC | B | 3 | 100,0% | 1 | 30,0% |
| | D | 6 | 33,3% | 93 | 60,0% |
| | 0 | 1 | 100,0% | 7 | 10,0% |
| | Totale | 10 | 60,0% | 57 | 100,0% |
| TC del Rachide e dello speco vertebrale | B | 2 | 100,0% | 2 | 16,7% |
| | D | 3 | 33,3% | 74 | 25,0% |
| | P | 2 | 100,0% | 0 | 16,7% |
| | 0 | 5 | 60,0% | 53 | 41,7% |
| | Totale | 12 | 66,7% | 41 | 100,0% |
| | B | 22 | 100,0% | 6 | 14,0% |
| | D | 74 | 91,9% | 20 | 47,1% |

Zona di erogazione - Diagnostic

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|-----|--------|
| Eco(color)dopplergrafia cardiaca | P | 5 | 40,0% | 86 | 3,2% |
| | 0 | 56 | 100,0% | 7 | 35,7% |
| | Totale | 157 | 94,3% | 15 | 100,0% |
| Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici | B | 2 | 100,0% | 5 | 2,2% |
| | D | 71 | 100,0% | 13 | 78,0% |
| | P | 1 | 100,0% | 13 | 1,1% |
| | 0 | 17 | 100,0% | 9 | 18,7% |
| | Totale | 91 | 100,0% | 13 | 100,0% |
| Diagnostica ecografica del Capo e del collo | B | 6 | 100,0% | 4 | 1,8% |
| | D | 107 | 99,1% | 6 | 32,1% |
| | P | 63 | 93,7% | 17 | 18,9% |
| | 0 | 157 | 98,7% | 5 | 47,1% |
| | Totale | 333 | 97,9% | 8 | 100,0% |
| Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo) | B | 46 | 58,7% | 10 | 33,8% |
| | D | 65 | 66,2% | 47 | 47,8% |
| | P | 2 | 50,0% | 96 | 1,5% |
| | 0 | 23 | 56,5% | 63 | 16,9% |
| | Totale | 136 | 61,8% | 38 | 100,0% |
| Ecografia Ostetrica | P | 72 | 100,0% | 10 | 93,5% |
| | 0 | 5 | 80,0% | 8 | 6,5% |
| | Totale | 77 | 98,7% | 9 | 100,0% |
| Ecografia Ginecologica | B | 1 | 100,0% | 3 | 3,3% |
| | D | 22 | 59,1% | 22 | 73,3% |
| | P | 3 | 100,0% | 46 | 10,0% |
| | 0 | 4 | 50,0% | 19 | 13,3% |
| | Totale | 30 | 63,3% | 24 | 100,0% |
| Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa | B | 12 | 100,0% | 5 | 24,0% |
| | D | 27 | 100,0% | 10 | 54,0% |
| | P | 1 | 100,0% | 2 | 2,0% |
| | 0 | 10 | 100,0% | 7 | 20,0% |
| | Totale | 50 | 100,0% | 8 | 100,0% |
| Colonscopia | B | 4 | 50,0% | 13 | 4,1% |
| | D | 23 | 56,5% | 59 | 23,7% |
| | P | 49 | 63,3% | 101 | 50,5% |
| | 0 | 21 | 19,0% | 87 | 21,6% |
| | Totale | 97 | 51,5% | 84 | 100,0% |
| Esofago-gastroduodenoscopia | B | 12 | 100,0% | 5 | 18,8% |
| | D | 36 | 33,3% | 59 | 56,3% |
| | P | 11 | 90,9% | 96 | 17,2% |
| | 0 | 5 | 60,0% | 22 | 7,8% |
| | Totale | 64 | 57,8% | 52 | 100,0% |

Zona di erogazione - Diagnostic

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| Elettrocardiogramma | U | 1 | 100,0% | 0 | 0,2% |
| | B | 71 | 100,0% | 1 | 13,0% |
| | D | 265 | 100,0% | 2 | 48,5% |
| | P | 33 | 100,0% | 2 | 6,0% |
| | 0 | 176 | 100,0% | 1 | 32,2% |
| | Totale | 546 | 100,0% | 1 | 100,0% |
| Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | B | 21 | 33,3% | 15 | 15,8% |
| | D | 61 | 27,9% | 45 | 45,9% |
| | P | 12 | 91,7% | 65 | 9,0% |
| | 0 | 39 | 33,3% | 39 | 29,3% |
| | Totale | 133 | 36,1% | 40 | 100,0% |
| Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro | B | 3 | 66,7% | 6 | 13,0% |
| | D | 12 | 41,7% | 83 | 52,2% |
| | 0 | 8 | | 115 | 34,8% |
| | Totale | 23 | 30,4% | 84 | 100,0% |
| Esame audiometrico tonale | D | 4 | 100,0% | 2 | 11,1% |
| | P | 1 | 100,0% | 12 | 2,8% |
| | 0 | 31 | 100,0% | 2 | 86,1% |
| | Totale | 36 | 100,0% | 2 | 100,0% |
| Spirometria globale | D | 20 | 50,0% | 68 | 83,3% |
| | P | 2 | | 131 | 8,3% |
| | 0 | 2 | 100,0% | 6 | 8,3% |
| | Totale | 24 | 50,0% | 68 | 100,0% |
| Esame del fundus oculi | B | 1 | 100,0% | 5 | 4,0% |
| | D | 9 | | 190 | 36,0% |
| | P | 4 | | 186 | 16,0% |
| | 0 | 11 | 27,3% | 133 | 44,0% |
| | Totale | 25 | 16,0% | 157 | 100,0% |
| Elettromiografia semplice | B | 24 | 33,3% | 16 | 75,0% |
| | D | 4 | 100,0% | 21 | 12,5% |
| | 0 | 4 | 100,0% | 17 | 12,5% |
| | Totale | 32 | 50,0% | 17 | 100,0% |
| Totale | | 1967 | 82,8% | | |

105 - Alta Val di Cecina - Val d'Era

| Prestazioni diagnostica | Priorità | N Prestazioni | % Garanzia tempi attesa I disponibilità | Giorni di attesa I disp | % Priorità |
|-------------------------|----------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------|
|-------------------------|----------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------|

Zona di erogazione - Diagnostic

| | | | | | |
|------------------------------------------|--------|-----|--------|----|--------|
| Mammografia bilaterale | B | 15 | 66,7% | 8 | 8,3% |
| | D | 56 | 98,2% | 18 | 30,9% |
| | P | 16 | 100,0% | 25 | 8,8% |
| | O | 94 | 66,0% | 48 | 51,9% |
| | Totale | 181 | 79,0% | 34 | 100,0% |
| Mammografia monolaterale | D | 1 | 100,0% | 4 | 5,6% |
| | P | 1 | 100,0% | 4 | 5,6% |
| | O | 16 | 75,0% | 43 | 88,9% |
| | Totale | 18 | 77,8% | 38 | 100,0% |
| TC delTorace | B | 15 | 100,0% | 4 | 25,4% |
| | D | 15 | 100,0% | 16 | 25,4% |
| | P | 4 | 100,0% | 5 | 6,8% |
| | O | 25 | 100,0% | 12 | 42,4% |
| | Totale | 59 | 100,0% | 10 | 100,0% |
| TC delTorace senza e con MDC | B | 31 | 100,0% | 4 | 22,6% |
| | D | 10 | 100,0% | 13 | 7,3% |
| | P | 14 | 100,0% | 4 | 10,2% |
| | O | 82 | 98,8% | 8 | 59,9% |
| | Totale | 137 | 99,3% | 7 | 100,0% |
| TC dell Addome superiore senza e con MDC | O | 1 | 100,0% | 22 | 100,0% |
| | Totale | 1 | 100,0% | 22 | 100,0% |
| TC dell Addome inferiore | D | 1 | 100,0% | 5 | 100,0% |
| | Totale | 1 | 100,0% | 5 | 100,0% |
| TC dell Addome inferiore senza e con MDC | B | 1 | 100,0% | 5 | 100,0% |
| | Totale | 1 | 100,0% | 5 | 100,0% |
| TC dell Addome completo | B | 2 | 100,0% | 3 | 16,7% |
| | D | 4 | 100,0% | 11 | 33,3% |
| | O | 6 | 100,0% | 14 | 50,0% |
| | Totale | 12 | 100,0% | 11 | 100,0% |
| TC dell Addome completo senza e con MDC | B | 49 | 95,9% | 5 | 28,8% |
| | D | 23 | 100,0% | 16 | 13,5% |
| | P | 17 | 100,0% | 4 | 10,0% |
| | O | 81 | 97,5% | 8 | 47,6% |
| | Totale | 170 | 97,6% | 8 | 100,0% |
| TC del Capo | B | 18 | 100,0% | 3 | 41,9% |
| | D | 15 | 100,0% | 6 | 34,9% |
| | P | 1 | 100,0% | 7 | 2,3% |
| | O | 9 | 100,0% | 5 | 20,9% |
| | Totale | 43 | 100,0% | 4 | 100,0% |
| | B | 10 | 100,0% | 5 | 23,8% |

Zona di erogazione - Diagnostic

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------|--------|-----|--------|----|--------|
| TC del Capo senza e con MDC | D | 5 | 100,0% | 18 | 11,9% |
| | P | 3 | 100,0% | 2 | 7,1% |
| | 0 | 24 | 100,0% | 6 | 57,1% |
| | Totale | 42 | 100,0% | 7 | 100,0% |
| TC del Rachide e dello speco vertebrale | B | 17 | 100,0% | 3 | 56,7% |
| | D | 11 | 100,0% | 2 | 36,7% |
| | 0 | 2 | 100,0% | 4 | 6,7% |
| | Totale | 30 | 100,0% | 3 | 100,0% |
| TC di Bacino e articolazioni sacroiliache | B | 2 | 100,0% | 6 | 50,0% |
| | D | 2 | 100,0% | 15 | 50,0% |
| | Totale | 4 | 100,0% | 10 | 100,0% |
| RM dell Encefalo e del tronco encefalico | B | 36 | 77,8% | 8 | 25,5% |
| | D | 79 | 88,6% | 16 | 56,0% |
| | P | 7 | 100,0% | 9 | 5,0% |
| | 0 | 19 | 89,5% | 13 | 13,5% |
| | Totale | 141 | 86,5% | 13 | 100,0% |
| RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC | B | 18 | 55,6% | 10 | 20,5% |
| | D | 25 | 96,0% | 12 | 28,4% |
| | P | 18 | 88,9% | 44 | 20,5% |
| | 0 | 27 | 96,3% | 14 | 30,7% |
| | Totale | 88 | 86,4% | 19 | 100,0% |
| RM di addome inferiore e scavo pelvico | B | 1 | | 11 | 14,3% |
| | D | 4 | 75,0% | 38 | 57,1% |
| | P | 2 | 100,0% | 51 | 28,6% |
| | Totale | 7 | 71,4% | 38 | 100,0% |
| RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC | B | 4 | 75,0% | 6 | 30,8% |
| | D | 5 | 40,0% | 55 | 38,5% |
| | P | 2 | 100,0% | 23 | 15,4% |
| | 0 | 2 | 100,0% | 15 | 15,4% |
| | Totale | 13 | 69,2% | 29 | 100,0% |
| RM della Colonna | B | 74 | 91,9% | 7 | 21,3% |
| | D | 137 | 89,1% | 16 | 39,5% |
| | P | 46 | 97,8% | 18 | 13,3% |
| | 0 | 90 | 92,2% | 17 | 25,9% |
| | Totale | 347 | 91,6% | 15 | 100,0% |
| RM della Colonna senza e con MDC | B | 10 | 40,0% | 12 | 27,0% |
| | D | 2 | 100,0% | 15 | 5,4% |
| | P | 11 | 100,0% | 21 | 29,7% |
| | 0 | 14 | 78,6% | 32 | 37,8% |
| | Totale | 37 | 75,7% | 23 | 100,0% |
| | B | 83 | 43,4% | 15 | 27,1% |

Zona di erogazione - Diagnostic

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------|--------|-----|--------|-----|--------|
| RM Muscoloscheletrica | D | 126 | 88,9% | 26 | 41,2% |
| | P | 65 | 100,0% | 23 | 21,2% |
| | 0 | 32 | 93,8% | 33 | 10,5% |
| | Totale | 306 | 79,4% | 23 | 100,0% |
| RM Muscoloscheletrica senza e con MDC | B | 4 | 25,0% | 13 | 80,0% |
| | P | 1 | 100,0% | 18 | 20,0% |
| | Totale | 5 | 40,0% | 14 | 100,0% |
| Eco(color)dopplergrafia cardiaca | B | 51 | 80,4% | 8 | 11,9% |
| | D | 66 | 42,4% | 81 | 15,4% |
| | P | 178 | 88,8% | 41 | 41,6% |
| | 0 | 133 | 83,5% | 30 | 31,1% |
| | Totale | 428 | 79,0% | 40 | 100,0% |
| Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici | U | 3 | 100,0% | 0 | 1,0% |
| | B | 23 | 100,0% | 7 | 7,6% |
| | D | 78 | 52,6% | 85 | 25,7% |
| | P | 144 | 31,9% | 286 | 47,4% |
| | 0 | 56 | 48,2% | 218 | 18,4% |
| | Totale | 304 | 46,1% | 198 | 100,0% |
| Diagnostica ecografica del Capo e del collo | B | 22 | 86,4% | 7 | 10,6% |
| | D | 41 | 85,4% | 35 | 19,7% |
| | P | 78 | 79,5% | 61 | 37,5% |
| | 0 | 67 | 59,7% | 45 | 32,2% |
| | Totale | 208 | 75,0% | 45 | 100,0% |
| Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo) | B | 108 | 82,4% | 8 | 13,4% |
| | D | 203 | 77,3% | 22 | 25,1% |
| | P | 176 | 98,3% | 20 | 21,8% |
| | 0 | 321 | 72,3% | 31 | 39,7% |
| | Totale | 808 | 80,6% | 23 | 100,0% |
| Ecografia della Mammella bilaterale | B | 34 | 82,4% | 8 | 58,6% |
| | D | 6 | 100,0% | 12 | 10,3% |
| | P | 3 | 100,0% | 3 | 5,2% |
| | 0 | 15 | 100,0% | 5 | 25,9% |
| | Totale | 58 | 89,7% | 7 | 100,0% |
| Ecografia Ostetrica | P | 185 | 99,5% | 3 | 92,5% |
| | 0 | 15 | 93,3% | 7 | 7,5% |
| | Totale | 200 | 99,0% | 3 | 100,0% |
| Ecografia Ginecologica | B | 4 | 75,0% | 9 | 4,8% |
| | D | 5 | 80,0% | 19 | 6,0% |
| | P | 53 | 98,1% | 31 | 63,9% |
| | 0 | 21 | 71,4% | 20 | 25,3% |
| | Totale | 83 | 89,2% | 26 | 100,0% |

Zona di erogazione - Diagnostic

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|-----|--------|
| Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa | B | 24 | 91,7% | 8 | 35,3% |
| | D | 7 | 42,9% | 77 | 10,3% |
| | P | 20 | 100,0% | 8 | 29,4% |
| | 0 | 17 | 82,4% | 30 | 25,0% |
| | Totale | 68 | 86,8% | 20 | 100,0% |
| Colonscopia | B | 31 | 77,4% | 9 | 13,1% |
| | D | 39 | 30,8% | 47 | 16,5% |
| | P | 75 | 90,7% | 51 | 31,6% |
| | 0 | 92 | 43,5% | 63 | 38,8% |
| | Totale | 237 | 60,8% | 50 | 100,0% |
| Esofago-gastroduodenoscopia | B | 18 | 77,8% | 9 | 13,6% |
| | D | 48 | 41,7% | 55 | 36,4% |
| | P | 36 | 83,3% | 50 | 27,3% |
| | 0 | 30 | 80,0% | 26 | 22,7% |
| | Totale | 132 | 66,7% | 41 | 100,0% |
| Elettrocardiogramma | U | 2 | 100,0% | 2 | 0,2% |
| | B | 109 | 95,4% | 6 | 11,8% |
| | D | 198 | 68,7% | 45 | 21,5% |
| | P | 326 | 87,7% | 30 | 35,4% |
| | 0 | 285 | 93,3% | 15 | 31,0% |
| | Totale | 920 | 86,3% | 25 | 100,0% |
| Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | B | 11 | 100,0% | 3 | 6,6% |
| | D | 16 | 31,3% | 40 | 9,6% |
| | P | 81 | 72,8% | 59 | 48,8% |
| | 0 | 58 | 55,2% | 38 | 34,9% |
| | Totale | 166 | 64,5% | 46 | 100,0% |
| Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro | B | 1 | 100,0% | 2 | 3,7% |
| | D | 1 | 100,0% | 1 | 3,7% |
| | P | 9 | 100,0% | 5 | 33,3% |
| | 0 | 16 | 100,0% | 5 | 59,3% |
| | Totale | 27 | 100,0% | 4 | 100,0% |
| Esame audiometrico tonale | B | 3 | 100,0% | 2 | 2,0% |
| | D | 35 | 100,0% | 3 | 23,0% |
| | P | 60 | 100,0% | 4 | 39,5% |
| | 0 | 54 | 98,1% | 5 | 35,5% |
| | Totale | 152 | 99,3% | 4 | 100,0% |
| Spirometria semplice | B | 9 | 55,6% | 13 | 13,6% |
| | D | 9 | 44,4% | 180 | 13,6% |
| | P | 46 | 89,1% | 37 | 69,7% |
| | 0 | 2 | | 202 | 3,0% |
| | Totale | 66 | 75,8% | 58 | 100,0% |

Zona di erogazione - Diagnostic

| | | | | | |
|---------------------------|--------|------|--------|-----|--------|
| Spirometria globale | B | 13 | 69,2% | 10 | 15,5% |
| | D | 13 | 61,5% | 147 | 15,5% |
| | P | 28 | 75,0% | 94 | 33,3% |
| | O | 30 | 53,3% | 160 | 35,7% |
| | Totale | 84 | 64,3% | 113 | 100,0% |
| Esame del fundus oculi | D | 9 | 44,4% | 49 | 12,7% |
| | P | 12 | 100,0% | 38 | 16,9% |
| | O | 50 | 58,0% | 36 | 70,4% |
| | Totale | 71 | 63,4% | 38 | 100,0% |
| Elettromiografia semplice | B | 44 | 90,9% | 6 | 13,1% |
| | D | 136 | 96,3% | 31 | 40,6% |
| | P | 40 | 100,0% | 58 | 11,9% |
| | O | 115 | 93,0% | 27 | 34,3% |
| | Totale | 335 | 94,9% | 29 | 100,0% |
| Totale | | 5990 | 81,8% | | |

105 - Pisana

| Prestazioni diagnostica | Priorità | N Prestazioni | % Garanzia tempi attesa I disponibilità | Giorni di attesa I disp | % Priorità |
|------------------------------|----------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------|
| Mammografia bilaterale | B | 14 | 100,0% | 7 | 1,9% |
| | D | 179 | 40,2% | 70 | 24,5% |
| | P | 379 | 81,3% | 73 | 51,9% |
| | O | 158 | 44,3% | 66 | 21,6% |
| | Totale | 730 | 63,6% | 69 | 100,0% |
| Mammografia monolaterale | P | 6 | 50,0% | 101 | 31,6% |
| | O | 13 | 38,5% | 83 | 68,4% |
| | Totale | 19 | 42,1% | 89 | 100,0% |
| TC delTorace | B | 7 | 85,7% | 5 | 36,8% |
| | D | 6 | 100,0% | 29 | 31,6% |
| | P | 4 | 100,0% | 19 | 21,1% |
| | O | 2 | 100,0% | 2 | 10,5% |
| | Totale | 19 | 94,7% | 15 | 100,0% |
| TC delTorace senza e con MDC | B | 5 | 60,0% | 13 | 26,3% |
| | D | 9 | 100,0% | 31 | 47,4% |
| | P | 3 | 100,0% | 43 | 15,8% |
| | O | 2 | 100,0% | 23 | 10,5% |
| | Totale | 19 | 89,5% | 27 | 100,0% |
| TC dell Addome superiore | P | 1 | 100,0% | 35 | 33,3% |
| | O | 2 | 100,0% | 37 | 66,7% |

Zona di erogazione - Diagnostic

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------|--------|----|--------|----|--------|
| | Totale | 3 | 100,0% | 36 | 100,0% |
| TC dell Addome superiore senza e con MDC | B | 1 | | 24 | 100,0% |
| | Totale | 1 | | 24 | 100,0% |
| TC dell Addome inferiore senza e con MDC | B | 1 | | 26 | 100,0% |
| | Totale | 1 | | 26 | 100,0% |
| TC dell Addome completo | B | 2 | 50,0% | 15 | 28,6% |
| | D | 2 | 100,0% | 24 | 28,6% |
| | P | 1 | 100,0% | 6 | 14,3% |
| | 0 | 2 | 100,0% | 36 | 28,6% |
| | Totale | 7 | 85,7% | 22 | 100,0% |
| TC dell Addome completo senza e con MDC | B | 23 | 30,4% | 18 | 50,0% |
| | D | 9 | 100,0% | 27 | 19,6% |
| | P | 7 | 100,0% | 30 | 15,2% |
| | 0 | 7 | 85,7% | 38 | 15,2% |
| | Totale | 46 | 63,0% | 24 | 100,0% |
| TC del Capo | B | 3 | 66,7% | 7 | 33,3% |
| | D | 2 | 100,0% | 4 | 22,2% |
| | P | 3 | 100,0% | 4 | 33,3% |
| | 0 | 1 | 100,0% | 35 | 11,1% |
| | Totale | 9 | 88,9% | 8 | 100,0% |
| TC del Capo senza e con MDC | B | 2 | | 26 | 100,0% |
| | Totale | 2 | | 26 | 100,0% |
| TC del Rachide e dello speco vertebrale | B | 1 | 100,0% | 1 | 16,7% |
| | P | 2 | 100,0% | 19 | 33,3% |
| | 0 | 3 | 100,0% | 12 | 50,0% |
| | Totale | 6 | 100,0% | 13 | 100,0% |
| TC di Bacino e articolazioni sacroiliache | 0 | 1 | 100,0% | 35 | 100,0% |
| | Totale | 1 | 100,0% | 35 | 100,0% |
| RM dell Encefalo e del tronco encefalico | B | 8 | 100,0% | 4 | 8,4% |
| | D | 24 | 100,0% | 7 | 25,3% |
| | P | 30 | 100,0% | 16 | 31,6% |
| | 0 | 33 | 100,0% | 7 | 34,7% |
| | Totale | 95 | 100,0% | 10 | 100,0% |
| RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC | B | 13 | 84,6% | 10 | 27,1% |
| | D | 20 | 95,0% | 20 | 41,7% |
| | P | 5 | 100,0% | 34 | 10,4% |
| | 0 | 10 | 90,0% | 19 | 20,8% |
| | Totale | 48 | 91,7% | 18 | 100,0% |
| RM di addome inferiore e scavo pelvico | B | 1 | | 30 | 50,0% |
| | D | 1 | 100,0% | 6 | 50,0% |

Zona di erogazione - Diagnostic

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------|--------|-----|--------|----|--------|
| | Totale | 2 | 50,0% | 18 | 100,0% |
| RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC | B | 4 | 25,0% | 22 | 66,7% |
| | D | 1 | 100,0% | 41 | 16,7% |
| | 0 | 1 | 100,0% | 4 | 16,7% |
| | Totale | 6 | 50,0% | 22 | 100,0% |
| RM della Colonna | B | 44 | 72,7% | 13 | 21,9% |
| | D | 69 | 95,7% | 14 | 34,3% |
| | P | 49 | 100,0% | 54 | 24,4% |
| | 0 | 39 | 97,4% | 9 | 19,4% |
| | Totale | 201 | 92,0% | 23 | 100,0% |
| RM della Colonna senza e con MDC | B | 4 | 100,0% | 10 | 28,6% |
| | D | 2 | 100,0% | 10 | 14,3% |
| | P | 3 | 100,0% | 43 | 21,4% |
| | 0 | 5 | 100,0% | 9 | 35,7% |
| | Totale | 14 | 100,0% | 17 | 100,0% |
| RM Muscoloscheletrica | B | 18 | 27,8% | 20 | 17,6% |
| | D | 34 | 91,2% | 30 | 33,3% |
| | P | 39 | 100,0% | 49 | 38,2% |
| | 0 | 11 | 81,8% | 30 | 10,8% |
| | Totale | 102 | 82,4% | 36 | 100,0% |
| RM Muscoloscheletrica senza e con MDC | B | 3 | 33,3% | 17 | 33,3% |
| | D | 4 | 100,0% | 41 | 44,4% |
| | P | 2 | 100,0% | 51 | 22,2% |
| | Totale | 9 | 77,8% | 35 | 100,0% |
| Eco(color)dopplergrafia cardiaca | B | 9 | 100,0% | 6 | 5,5% |
| | D | 39 | 66,7% | 19 | 23,8% |
| | P | 63 | 100,0% | 14 | 38,4% |
| | 0 | 53 | 100,0% | 19 | 32,3% |
| | Totale | 164 | 92,1% | 16 | 100,0% |
| Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici | B | 5 | 100,0% | 8 | 1,5% |
| | D | 106 | 99,1% | 16 | 31,8% |
| | P | 138 | 100,0% | 19 | 41,4% |
| | 0 | 84 | 98,8% | 16 | 25,2% |
| | Totale | 333 | 99,4% | 17 | 100,0% |
| Diagnostica ecografica del Capo e del collo | B | 19 | 68,4% | 12 | 15,6% |
| | D | 26 | 96,2% | 10 | 21,3% |
| | P | 42 | 100,0% | 8 | 34,4% |
| | 0 | 35 | 94,3% | 9 | 28,7% |
| | Totale | 122 | 92,6% | 9 | 100,0% |
| | U | 1 | 100,0% | 2 | 0,1% |
| | B | 86 | 59,3% | 15 | 10,7% |

Zona di erogazione - Diagnostic

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|----|--------|
| Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo) | D | 188 | 92,6% | 13 | 23,4% |
| | P | 328 | 100,0% | 15 | 40,9% |
| | 0 | 199 | 91,0% | 13 | 24,8% |
| | Totale | 802 | 91,6% | 14 | 100,0% |
| Ecografia della Mammella bilaterale | D | 10 | 100,0% | 9 | 33,3% |
| | P | 14 | 100,0% | 10 | 46,7% |
| | 0 | 6 | 100,0% | 8 | 20,0% |
| | Totale | 30 | 100,0% | 9 | 100,0% |
| Ecografia della Mammella monolaterale | 0 | 1 | 100,0% | 10 | 100,0% |
| | Totale | 1 | 100,0% | 10 | 100,0% |
| Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa | B | 26 | 96,2% | 7 | 8,3% |
| | D | 98 | 98,0% | 14 | 31,2% |
| | P | 122 | 100,0% | 23 | 38,9% |
| | 0 | 68 | 92,6% | 22 | 21,7% |
| | Totale | 314 | 97,5% | 19 | 100,0% |
| Elettrocardiogramma | B | 41 | 92,7% | 6 | 9,0% |
| | D | 122 | 97,5% | 8 | 26,7% |
| | P | 204 | 99,0% | 7 | 44,6% |
| | 0 | 90 | 96,7% | 9 | 19,7% |
| | Totale | 457 | 97,6% | 8 | 100,0% |
| Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | B | 1 | | 13 | 5,3% |
| | D | 2 | 100,0% | 19 | 10,5% |
| | P | 7 | 100,0% | 6 | 36,8% |
| | 0 | 9 | 100,0% | 9 | 47,4% |
| | Totale | 19 | 94,7% | 9 | 100,0% |
| Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro | D | 1 | 100,0% | 2 | 7,1% |
| | P | 8 | 100,0% | 19 | 57,1% |
| | 0 | 5 | 80,0% | 34 | 35,7% |
| | Totale | 14 | 92,9% | 23 | 100,0% |
| Esame audiometrico tonale | P | 1 | 100,0% | 0 | 100,0% |
| | Totale | 1 | 100,0% | 0 | 100,0% |
| Spirometria semplice | B | 3 | 33,3% | 18 | 33,3% |
| | P | 1 | 100,0% | 3 | 11,1% |
| | 0 | 5 | 100,0% | 0 | 55,6% |
| | Totale | 9 | 77,8% | 7 | 100,0% |
| Esame del fundus oculi | B | 1 | 100,0% | 10 | 0,8% |
| | D | 20 | 40,0% | 55 | 15,2% |
| | P | 37 | 100,0% | 47 | 28,0% |
| | 0 | 74 | 58,1% | 39 | 56,1% |
| | Totale | 132 | 67,4% | 43 | 100,0% |

Zona di erogazione - Diagnostic

| | | | |
|--------|--|------|-------|
| Totale | | 3738 | 86,5% |
|--------|--|------|-------|

106 - Bassa Val di Cecina - Val di Cornia

| Prestazioni diagnostica | Priorità | N Prestazioni | % Garanzia tempi attesa I disponibilità | Giorni di attesa I disp | % Priorità |
|------------------------------------------|----------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------|
| Mammografia bilaterale | B | 18 | 100,0% | 6 | 12,6% |
| | D | 64 | 54,7% | 72 | 44,8% |
| | P | 33 | 36,4% | 176 | 23,1% |
| | O | 28 | 50,0% | 106 | 19,6% |
| | Totale | 143 | 55,2% | 94 | 100,0% |
| Mammografia monolaterale | D | 2 | 100,0% | 42 | 22,2% |
| | P | 7 | 42,9% | 173 | 77,8% |
| | Totale | 9 | 55,6% | 144 | 100,0% |
| TC delTorace | B | 27 | 100,0% | 2 | 24,8% |
| | D | 60 | 100,0% | 2 | 55,0% |
| | P | 7 | 100,0% | 5 | 6,4% |
| | O | 15 | 100,0% | 4 | 13,8% |
| | Totale | 109 | 100,0% | 3 | 100,0% |
| TC delTorace senza e con MDC | B | 68 | 97,1% | 5 | 40,0% |
| | D | 31 | 100,0% | 5 | 18,2% |
| | P | 43 | 97,7% | 15 | 25,3% |
| | O | 28 | 100,0% | 8 | 16,5% |
| | Totale | 170 | 98,2% | 8 | 100,0% |
| TC dell Addome superiore | D | 1 | 100,0% | 3 | 100,0% |
| | Totale | 1 | 100,0% | 3 | 100,0% |
| TC dell Addome superiore senza e con MDC | B | 2 | 100,0% | 6 | 50,0% |
| | D | 2 | 100,0% | 3 | 50,0% |
| | Totale | 4 | 100,0% | 5 | 100,0% |
| TC dell Addome inferiore | B | 3 | 100,0% | 3 | 100,0% |
| | Totale | 3 | 100,0% | 3 | 100,0% |
| TC dell Addome inferiore senza e con MDC | B | 1 | 100,0% | 6 | 100,0% |
| | Totale | 1 | 100,0% | 6 | 100,0% |
| TC dell Addome completo | B | 7 | 100,0% | 4 | 33,3% |
| | D | 11 | 100,0% | 3 | 52,4% |
| | O | 3 | 100,0% | 5 | 14,3% |
| | Totale | 21 | 100,0% | 4 | 100,0% |
| | B | 77 | 97,4% | 5 | 44,3% |

Zona di erogazione - Diagnostic

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------|--------|-----|--------|----|--------|
| TC dell Addome completo senza e con MDC | D | 28 | 100,0% | 6 | 16,1% |
| | P | 43 | 97,7% | 14 | 24,7% |
| | 0 | 26 | 100,0% | 8 | 14,9% |
| | Totale | 174 | 98,3% | 8 | 100,0% |
| TC del Capo | B | 20 | 100,0% | 4 | 35,7% |
| | D | 28 | 100,0% | 4 | 50,0% |
| | P | 2 | 100,0% | 14 | 3,6% |
| | 0 | 6 | 100,0% | 4 | 10,7% |
| | Totale | 56 | 100,0% | 4 | 100,0% |
| TC del Capo senza e con MDC | B | 20 | 95,0% | 7 | 51,3% |
| | D | 8 | 100,0% | 9 | 20,5% |
| | P | 3 | 100,0% | 19 | 7,7% |
| | 0 | 8 | 100,0% | 7 | 20,5% |
| | Totale | 39 | 97,4% | 8 | 100,0% |
| TC del Rachide e dello speco vertebrale | B | 12 | 100,0% | 4 | 34,3% |
| | D | 20 | 100,0% | 3 | 57,1% |
| | 0 | 3 | 100,0% | 3 | 8,6% |
| | Totale | 35 | 100,0% | 3 | 100,0% |
| TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC | B | 2 | 100,0% | 7 | 66,7% |
| | 0 | 1 | 100,0% | 3 | 33,3% |
| | Totale | 3 | 100,0% | 6 | 100,0% |
| TC di Bacino e articolazioni sacroiliache | B | 3 | 100,0% | 3 | 75,0% |
| | D | 1 | 100,0% | 7 | 25,0% |
| | Totale | 4 | 100,0% | 4 | 100,0% |
| RM dell Encefalo e del tronco encefalico | B | 19 | 100,0% | 7 | 16,7% |
| | D | 79 | 100,0% | 11 | 69,3% |
| | 0 | 16 | 100,0% | 9 | 14,0% |
| | Totale | 114 | 100,0% | 10 | 100,0% |
| RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC | B | 13 | 84,6% | 8 | 68,4% |
| | D | 6 | 100,0% | 7 | 31,6% |
| | Totale | 19 | 89,5% | 7 | 100,0% |
| RM di addome inferiore e scavo pelvico | B | 3 | 100,0% | 6 | 60,0% |
| | P | 1 | 100,0% | 5 | 20,0% |
| | 0 | 1 | 100,0% | 5 | 20,0% |
| | Totale | 5 | 100,0% | 6 | 100,0% |
| RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC | B | 9 | 100,0% | 4 | 45,0% |
| | D | 8 | 100,0% | 6 | 40,0% |
| | P | 1 | 100,0% | 11 | 5,0% |
| | 0 | 2 | 100,0% | 5 | 10,0% |
| | Totale | 20 | 100,0% | 5 | 100,0% |

Zona di erogazione - Diagnostic

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------|--------|-----|--------|----|--------|
| RM della Colonna | B | 60 | 100,0% | 5 | 15,4% |
| | D | 299 | 100,0% | 5 | 76,7% |
| | P | 3 | 100,0% | 2 | 0,8% |
| | 0 | 28 | 100,0% | 5 | 7,2% |
| | Totale | 390 | 100,0% | 5 | 100,0% |
| RM della Colonna senza e con MDC | B | 11 | 100,0% | 4 | 36,7% |
| | D | 9 | 100,0% | 4 | 30,0% |
| | P | 1 | 100,0% | 48 | 3,3% |
| | 0 | 9 | 100,0% | 6 | 30,0% |
| | Totale | 30 | 100,0% | 6 | 100,0% |
| RM Muscoloscheletrica | B | 56 | 96,4% | 5 | 29,8% |
| | D | 117 | 100,0% | 8 | 62,2% |
| | P | 2 | 100,0% | 3 | 1,1% |
| | 0 | 13 | 100,0% | 8 | 6,9% |
| | Totale | 188 | 98,9% | 7 | 100,0% |
| RM Muscoloscheletrica senza e con MDC | B | 2 | 100,0% | 3 | 33,3% |
| | D | 3 | 100,0% | 6 | 50,0% |
| | 0 | 1 | 100,0% | 2 | 16,7% |
| | Totale | 6 | 100,0% | 4 | 100,0% |
| Eco(color)dopplergrafia cardiaca | B | 64 | 67,2% | 9 | 36,2% |
| | D | 71 | 85,9% | 18 | 40,1% |
| | P | 9 | 100,0% | 3 | 5,1% |
| | 0 | 33 | 75,8% | 16 | 18,6% |
| | Totale | 177 | 78,0% | 14 | 100,0% |
| Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici | B | 8 | 100,0% | 6 | 6,1% |
| | D | 76 | 78,9% | 48 | 57,6% |
| | P | 30 | 86,7% | 51 | 22,7% |
| | 0 | 18 | 83,3% | 36 | 13,6% |
| | Totale | 132 | 82,6% | 44 | 100,0% |
| Diagnostica ecografica del Capo e del collo | B | 25 | 92,0% | 5 | 13,2% |
| | D | 111 | 93,7% | 9 | 58,4% |
| | P | 20 | 85,0% | 57 | 10,5% |
| | 0 | 34 | 85,3% | 45 | 17,9% |
| | Totale | 190 | 91,1% | 20 | 100,0% |
| Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo) | B | 79 | 87,3% | 8 | 14,2% |
| | D | 281 | 89,0% | 15 | 50,4% |
| | P | 106 | 99,1% | 11 | 19,0% |
| | 0 | 92 | 87,0% | 15 | 16,5% |
| | Totale | 558 | 90,3% | 13 | 100,0% |
| | B | 19 | 89,5% | 6 | 31,1% |
| | D | 31 | 100,0% | 5 | 50,8% |

Zona di erogazione - Diagnostic

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|-----|--------|
| Ecografia della Mammella bilaterale | P | 7 | 100,0% | 7 | 11,5% |
| | O | 4 | 100,0% | 3 | 6,6% |
| | Totale | 61 | 96,7% | 5 | 100,0% |
| Ecografia della Mammella monolaterale | B | 2 | 100,0% | 5 | 100,0% |
| | Totale | 2 | 100,0% | 5 | 100,0% |
| Ecografia Ostetrica | D | 150 | 50,7% | 41 | 72,8% |
| | P | 25 | 100,0% | 35 | 12,1% |
| | O | 31 | 64,5% | 29 | 15,0% |
| | Totale | 206 | 58,7% | 39 | 100,0% |
| Ecografia Ginecologica | B | 1 | | 14 | 11,1% |
| | D | 3 | 66,7% | 25 | 33,3% |
| | P | 3 | 100,0% | 27 | 33,3% |
| | O | 2 | 100,0% | 13 | 22,2% |
| | Totale | 9 | 77,8% | 22 | 100,0% |
| Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa | B | 11 | 81,8% | 10 | 24,4% |
| | D | 8 | 87,5% | 40 | 17,8% |
| | P | 12 | 100,0% | 18 | 26,7% |
| | O | 14 | 92,9% | 21 | 31,1% |
| | Totale | 45 | 91,1% | 21 | 100,0% |
| Colonscopia | B | 52 | 86,5% | 8 | 29,5% |
| | D | 92 | 62,0% | 35 | 52,3% |
| | P | 17 | 17,6% | 144 | 9,7% |
| | O | 15 | 46,7% | 60 | 8,5% |
| | Totale | 176 | 63,6% | 40 | 100,0% |
| Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile | B | 1 | 100,0% | 3 | 100,0% |
| | Totale | 1 | 100,0% | 3 | 100,0% |
| Esofago-gastroduodenoscopia | B | 34 | 58,8% | 9 | 17,4% |
| | D | 133 | 52,6% | 27 | 68,2% |
| | P | 11 | 63,6% | 90 | 5,6% |
| | O | 17 | 64,7% | 30 | 8,7% |
| | Totale | 195 | 55,4% | 27 | 100,0% |
| Elettrocardiogramma | B | 96 | 77,1% | 7 | 17,1% |
| | D | 298 | 99,3% | 8 | 52,9% |
| | P | 53 | 100,0% | 7 | 9,4% |
| | O | 116 | 94,8% | 10 | 20,6% |
| | Totale | 563 | 94,7% | 8 | 100,0% |
| Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | B | 49 | 83,7% | 9 | 53,8% |
| | D | 25 | 44,0% | 79 | 27,5% |
| | P | 10 | 100,0% | 5 | 11,0% |
| | O | 7 | 71,4% | 33 | 7,7% |
| | Totale | 91 | 73,6% | 30 | 100,0% |

Zona di erogazione - Diagnostic

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|----|--------|
| Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro | B | 11 | 81,8% | 6 | 32,4% |
| | D | 14 | 100,0% | 15 | 41,2% |
| | P | 6 | 100,0% | 4 | 17,6% |
| | O | 3 | 100,0% | 3 | 8,8% |
| | Totale | 34 | 94,1% | 9 | 100,0% |
| Esame audiometrico tonale | B | 1 | 100,0% | 3 | 0,7% |
| | D | 143 | 100,0% | 2 | 94,1% |
| | P | 5 | 100,0% | 4 | 3,3% |
| | O | 3 | 100,0% | 4 | 2,0% |
| | Totale | 152 | 100,0% | 2 | 100,0% |
| Spirometria semplice | B | 2 | 100,0% | 6 | 13,3% |
| | D | 10 | 70,0% | 28 | 66,7% |
| | O | 3 | 100,0% | 20 | 20,0% |
| | Totale | 15 | 80,0% | 23 | 100,0% |
| Spirometria globale | B | 8 | 12,5% | 23 | 6,3% |
| | D | 43 | 23,3% | 85 | 33,9% |
| | P | 9 | 100,0% | 48 | 7,1% |
| | O | 67 | 89,6% | 32 | 52,8% |
| | Totale | 127 | 63,0% | 51 | 100,0% |
| Esame del fundus oculi | B | 3 | 100,0% | 8 | 6,1% |
| | D | 13 | 84,6% | 13 | 26,5% |
| | P | 14 | 100,0% | 9 | 28,6% |
| | O | 19 | 63,2% | 33 | 38,8% |
| | Totale | 49 | 81,6% | 20 | 100,0% |
| Elettromiografia semplice | B | 6 | 33,3% | 13 | 16,2% |
| | D | 21 | 100,0% | 12 | 56,8% |
| | P | 5 | 100,0% | 5 | 13,5% |
| | O | 5 | 100,0% | 10 | 13,5% |
| | Totale | 37 | 89,2% | 11 | 100,0% |
| Totale | | 4364 | 86,8% | | |

106 - dell'Elba

| Prestazioni diagnostica | Priorità | N Prestazioni | % Garanzia tempi attesa I disponibilità | Giorni di attesa I disp | % Priorità |
|-------------------------|----------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------|
| Mammografia bilaterale | B | 2 | 100,0% | 6 | 8,3% |
| | D | 6 | 50,0% | 66 | 25,0% |
| | P | 3 | | 300 | 12,5% |
| | O | 13 | 38,5% | 57 | 54,2% |
| | Totale | 24 | 41,7% | 85 | 100,0% |

Zona di erogazione - Diagnostic

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------|--------|----|--------|----|--------|
| TC delTorace | B | 1 | 100,0% | 2 | 9,1% |
| | D | 2 | 100,0% | 2 | 18,2% |
| | 0 | 8 | 100,0% | 3 | 72,7% |
| | Totale | 11 | 100,0% | 2 | 100,0% |
| TC delTorace senza e con MDC | B | 6 | 66,7% | 7 | 23,1% |
| | D | 2 | 100,0% | 4 | 7,7% |
| | P | 1 | 100,0% | 13 | 3,8% |
| | 0 | 17 | 100,0% | 3 | 65,4% |
| | Totale | 26 | 92,3% | 5 | 100,0% |
| TC dell Addome superiore senza e con MDC | D | 1 | 100,0% | 4 | 100,0% |
| | Totale | 1 | 100,0% | 4 | 100,0% |
| TC dell Addome inferiore senza e con MDC | B | 2 | 50,0% | 12 | 100,0% |
| | Totale | 2 | 50,0% | 12 | 100,0% |
| TC dell Addome completo | B | 1 | 100,0% | 2 | 14,3% |
| | D | 3 | 100,0% | 3 | 42,9% |
| | 0 | 3 | 100,0% | 2 | 42,9% |
| | Totale | 7 | 100,0% | 2 | 100,0% |
| TC dell Addome completo senza e con MDC | B | 10 | 90,0% | 6 | 32,3% |
| | D | 6 | 100,0% | 3 | 19,4% |
| | P | 1 | 100,0% | 13 | 3,2% |
| | 0 | 14 | 100,0% | 3 | 45,2% |
| | Totale | 31 | 96,8% | 5 | 100,0% |
| TC del Capo | B | 3 | 66,7% | 9 | 16,7% |
| | D | 11 | 100,0% | 3 | 61,1% |
| | P | 2 | 100,0% | 2 | 11,1% |
| | 0 | 2 | 100,0% | 4 | 11,1% |
| | Totale | 18 | 94,4% | 4 | 100,0% |
| TC del Capo senza e con MDC | D | 2 | 100,0% | 10 | 28,6% |
| | 0 | 5 | 100,0% | 6 | 71,4% |
| | Totale | 7 | 100,0% | 7 | 100,0% |
| TC del Rachide e dello speco vertebrale | B | 1 | 100,0% | 4 | 14,3% |
| | D | 4 | 100,0% | 2 | 57,1% |
| | 0 | 2 | 100,0% | 2 | 28,6% |
| | Totale | 7 | 100,0% | 2 | 100,0% |
| RM dell Encefalo e del tronco encefalico | B | 7 | 100,0% | 8 | 58,3% |
| | D | 5 | 100,0% | 30 | 41,7% |
| | Totale | 12 | 100,0% | 17 | 100,0% |
| RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC | B | 1 | | 20 | 14,3% |
| | D | 4 | 100,0% | 7 | 57,1% |
| | P | 2 | 100,0% | 8 | 28,6% |

Zona di erogazione - Diagnostic

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------|--------|-----|--------|-----|--------|
| | Totale | 7 | 85,7% | 9 | 100,0% |
| RM di addome inferiore e scavo pelvico | B | 1 | 100,0% | 8 | 100,0% |
| | Totale | 1 | 100,0% | 8 | 100,0% |
| RM della Colonna | B | 17 | 100,0% | 5 | 45,9% |
| | D | 16 | 100,0% | 6 | 43,2% |
| | 0 | 4 | 100,0% | 6 | 10,8% |
| | Totale | 37 | 100,0% | 6 | 100,0% |
| RM della Colonna senza e con MDC | D | 7 | 100,0% | 7 | 100,0% |
| | Totale | 7 | 100,0% | 7 | 100,0% |
| RM Muscoloscheletrica | B | 21 | 90,5% | 8 | 72,4% |
| | D | 6 | 100,0% | 15 | 20,7% |
| | 0 | 2 | 100,0% | 12 | 6,9% |
| | Totale | 29 | 93,1% | 10 | 100,0% |
| RM Muscoloscheletrica senza e con MDC | B | 1 | | 12 | 25,0% |
| | D | 1 | 100,0% | 7 | 25,0% |
| | P | 2 | 100,0% | 7 | 50,0% |
| | Totale | 4 | 75,0% | 8 | 100,0% |
| Eco(color)dopplergrafia cardiaca | B | 1 | 100,0% | 6 | 14,3% |
| | D | 1 | 100,0% | 28 | 14,3% |
| | P | 5 | 100,0% | 3 | 71,4% |
| | Totale | 7 | 100,0% | 7 | 100,0% |
| Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici | B | 4 | 100,0% | 5 | 11,4% |
| | D | 17 | 17,6% | 124 | 48,6% |
| | P | 3 | | 236 | 8,6% |
| | 0 | 11 | 63,6% | 112 | 31,4% |
| | Totale | 35 | 40,0% | 116 | 100,0% |
| Diagnostica ecografica del Capo e del collo | B | 6 | 100,0% | 2 | 7,1% |
| | D | 31 | 93,5% | 8 | 36,5% |
| | P | 42 | 100,0% | 4 | 49,4% |
| | 0 | 6 | 100,0% | 8 | 7,1% |
| | Totale | 85 | 97,6% | 5 | 100,0% |
| Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo) | B | 19 | 100,0% | 5 | 15,0% |
| | D | 60 | 100,0% | 4 | 47,2% |
| | P | 8 | 100,0% | 4 | 6,3% |
| | 0 | 40 | 97,5% | 5 | 31,5% |
| | Totale | 127 | 99,2% | 5 | 100,0% |
| Ecografia della Mammella bilaterale | B | 3 | 100,0% | 4 | 6,7% |
| | D | 23 | 100,0% | 5 | 51,1% |
| | P | 11 | 100,0% | 4 | 24,4% |
| | 0 | 8 | 100,0% | 4 | 17,8% |

Zona di erogazione - Diagnostic

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | Totale | 45 | 100,0% | 4 | 100,0% |
| Ecografia della Mammella monolaterale | B | 2 | 100,0% | 3 | 66,7% |
| | D | 1 | 100,0% | 10 | 33,3% |
| | Totale | 3 | 100,0% | 5 | 100,0% |
| | | | | | |
| Ecografia Ostetrica | D | 22 | 95,5% | 6 | 81,5% |
| | P | 4 | 100,0% | 1 | 14,8% |
| | 0 | 1 | 100,0% | 7 | 3,7% |
| | Totale | 27 | 96,3% | 6 | 100,0% |
| | | | | | |
| Ecografia Ginecologica | B | 1 | 100,0% | 9 | 25,0% |
| | D | 1 | | 36 | 25,0% |
| | 0 | 2 | 100,0% | 24 | 50,0% |
| | Totale | 4 | 75,0% | 23 | 100,0% |
| | | | | | |
| Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa | B | 6 | 50,0% | 10 | 26,1% |
| | D | 7 | 85,7% | 37 | 30,4% |
| | P | 3 | | 255 | 13,0% |
| | 0 | 7 | 14,3% | 85 | 30,4% |
| | Totale | 23 | 43,5% | 73 | 100,0% |
| | | | | | |
| Colonscopia | B | 4 | 100,0% | 4 | 14,3% |
| | D | 19 | 47,4% | 52 | 67,9% |
| | P | 1 | 100,0% | 13 | 3,6% |
| | 0 | 4 | 75,0% | 32 | 14,3% |
| | Totale | 28 | 60,7% | 41 | 100,0% |
| | | | | | |
| Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile | P | 2 | | 146 | 100,0% |
| | Totale | 2 | | 146 | 100,0% |
| | | | | | |
| Esofago-gastroduodenoscopia | B | 10 | 40,0% | 11 | 29,4% |
| | D | 16 | 56,3% | 22 | 47,1% |
| | P | 2 | 100,0% | 51 | 5,9% |
| | 0 | 6 | 83,3% | 14 | 17,6% |
| | Totale | 34 | 58,8% | 19 | 100,0% |
| | | | | | |
| Elettrocardiogramma | B | 17 | 100,0% | 5 | 14,7% |
| | D | 44 | 100,0% | 14 | 37,9% |
| | P | 31 | 100,0% | 8 | 26,7% |
| | 0 | 24 | 100,0% | 15 | 20,7% |
| | Totale | 116 | 100,0% | 11 | 100,0% |
| | | | | | |
| Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | B | 1 | 100,0% | 8 | 3,7% |
| | D | 20 | 40,0% | 79 | 74,1% |
| | P | 2 | 100,0% | 85 | 7,4% |
| | 0 | 4 | | 81 | 14,8% |
| | Totale | 27 | 40,7% | 77 | 100,0% |
| | | | | | |
| | D | 1 | 100,0% | 31 | 8,3% |

Zona di erogazione - Diagnostic

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|-----|--------|
| Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro | 0 | 11 | 9,1% | 123 | 91,7% |
| | Totale | 12 | 16,7% | 116 | 100,0% |
| Esame audiometrico tonale | D | 10 | 100,0% | 2 | 83,3% |
| | 0 | 2 | 100,0% | 3 | 16,7% |
| | Totale | 12 | 100,0% | 2 | 100,0% |
| Spirometria semplice | B | 6 | 100,0% | 8 | 19,4% |
| | D | 13 | 61,5% | 53 | 41,9% |
| | 0 | 12 | 16,7% | 115 | 38,7% |
| | Totale | 31 | 51,6% | 68 | 100,0% |
| Esame del fundus oculi | D | 5 | 40,0% | 43 | 19,2% |
| | P | 7 | 100,0% | 36 | 26,9% |
| | 0 | 14 | 42,9% | 42 | 53,8% |
| | Totale | 26 | 57,7% | 40 | 100,0% |
| Elettromiografia semplice | B | 3 | | 26 | 15,8% |
| | D | 9 | 22,2% | 92 | 47,4% |
| | P | 6 | 66,7% | 59 | 31,6% |
| | 0 | 1 | | 148 | 5,3% |
| | Totale | 19 | 31,6% | 74 | 100,0% |
| Totale | | 894 | 82,8% | | |

106 - Livornese

| Prestazioni diagnostica | Priorità | N Prestazioni | % Garanzia tempi attesa I disponibilità | Giorni di attesa I disp | % Priorità |
|--------------------------|----------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------|
| Mammografia bilaterale | B | 7 | 100,0% | 2 | 2,0% |
| | D | 265 | 38,5% | 128 | 75,3% |
| | P | 26 | 61,5% | 120 | 7,4% |
| | 0 | 54 | 87,0% | 32 | 15,3% |
| | Totale | 352 | 48,9% | 110 | 100,0% |
| Mammografia monolaterale | U | 1 | 100,0% | 0 | 2,6% |
| | B | 5 | 100,0% | 7 | 13,2% |
| | D | 12 | 91,7% | 23 | 31,6% |
| | P | 4 | 50,0% | 132 | 10,5% |
| | 0 | 16 | 100,0% | 5 | 42,1% |
| | Totale | 38 | 92,1% | 24 | 100,0% |
| TC delTorace | B | 32 | 100,0% | 1 | 18,3% |
| | D | 114 | 99,1% | 3 | 65,1% |
| | P | 8 | 100,0% | 4 | 4,6% |
| | 0 | 21 | 100,0% | 2 | 12,0% |
| | Totale | 175 | 99,4% | 3 | 100,0% |

Zona di erogazione - Diagnostic

| | | | | | |
|------------------------------------------|--------|-----|--------|----|--------|
| TC delTorace senza e con MDC | B | 69 | 98,6% | 4 | 17,1% |
| | D | 272 | 99,6% | 5 | 67,3% |
| | P | 22 | 100,0% | 14 | 5,4% |
| | 0 | 41 | 97,6% | 7 | 10,1% |
| | Totale | 404 | 99,3% | 5 | 100,0% |
| TC dell Addome superiore senza e con MDC | B | 1 | 100,0% | 3 | 12,5% |
| | D | 3 | 100,0% | 4 | 37,5% |
| | P | 1 | 100,0% | 3 | 12,5% |
| | 0 | 3 | 100,0% | 2 | 37,5% |
| | Totale | 8 | 100,0% | 3 | 100,0% |
| TC dell Addome inferiore | D | 2 | 100,0% | 1 | 100,0% |
| | Totale | 2 | 100,0% | 1 | 100,0% |
| TC dell Addome inferiore senza e con MDC | B | 3 | 100,0% | 4 | 75,0% |
| | D | 1 | 100,0% | 4 | 25,0% |
| | Totale | 4 | 100,0% | 4 | 100,0% |
| TC dell Addome completo | B | 13 | 100,0% | 1 | 34,2% |
| | D | 19 | 100,0% | 4 | 50,0% |
| | P | 1 | 100,0% | 0 | 2,6% |
| | 0 | 5 | 100,0% | 4 | 13,2% |
| | Totale | 38 | 100,0% | 3 | 100,0% |
| TC dell Addome completo senza e con MDC | B | 79 | 92,4% | 4 | 19,2% |
| | D | 254 | 99,6% | 5 | 61,8% |
| | P | 28 | 100,0% | 14 | 6,8% |
| | 0 | 50 | 98,0% | 8 | 12,2% |
| | Totale | 411 | 98,1% | 6 | 100,0% |
| TC del Capo | B | 27 | 100,0% | 2 | 23,9% |
| | D | 65 | 100,0% | 2 | 57,5% |
| | P | 4 | 100,0% | 4 | 3,5% |
| | 0 | 17 | 100,0% | 1 | 15,0% |
| | Totale | 113 | 100,0% | 2 | 100,0% |
| TC del Capo senza e con MDC | B | 14 | 78,6% | 7 | 36,8% |
| | D | 16 | 100,0% | 9 | 42,1% |
| | P | 1 | 100,0% | 4 | 2,6% |
| | 0 | 7 | 100,0% | 7 | 18,4% |
| | Totale | 38 | 92,1% | 8 | 100,0% |
| TC del Rachide e dello speco vertebrale | B | 16 | 100,0% | 2 | 18,6% |
| | D | 59 | 100,0% | 1 | 68,6% |
| | P | 4 | 100,0% | 3 | 4,7% |
| | 0 | 7 | 100,0% | 2 | 8,1% |
| | Totale | 86 | 100,0% | 2 | 100,0% |

Zona di erogazione - Diagnostic

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------|--------|-----|--------|----|--------|
| TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC | B | 2 | 50,0% | 8 | 50,0% |
| | D | 1 | 100,0% | 43 | 25,0% |
| | 0 | 1 | 100,0% | 34 | 25,0% |
| | Totale | 4 | 75,0% | 23 | 100,0% |
| TC di Bacino e articolazioni sacroiliache | B | 3 | 100,0% | 2 | 60,0% |
| | D | 1 | 100,0% | 0 | 20,0% |
| | 0 | 1 | 100,0% | 1 | 20,0% |
| | Totale | 5 | 100,0% | 1 | 100,0% |
| RM dell Encefalo e del tronco encefalico | B | 41 | 95,1% | 7 | 29,5% |
| | D | 75 | 96,0% | 16 | 54,0% |
| | P | 8 | 100,0% | 6 | 5,8% |
| | 0 | 15 | 100,0% | 13 | 10,8% |
| | Totale | 139 | 96,4% | 13 | 100,0% |
| RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC | U | 1 | 100,0% | 1 | 0,6% |
| | B | 42 | 54,8% | 13 | 25,5% |
| | D | 67 | 97,0% | 23 | 40,6% |
| | P | 32 | 100,0% | 19 | 19,4% |
| | 0 | 23 | 95,7% | 20 | 13,9% |
| | Totale | 165 | 86,7% | 19 | 100,0% |
| RM di addome inferiore e scavo pelvico | B | 1 | | 14 | 50,0% |
| | D | 1 | 100,0% | 7 | 50,0% |
| | Totale | 2 | 50,0% | 11 | 100,0% |
| RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC | B | 3 | 100,0% | 3 | 50,0% |
| | D | 1 | 100,0% | 2 | 16,7% |
| | 0 | 2 | 100,0% | 2 | 33,3% |
| | Totale | 6 | 100,0% | 3 | 100,0% |
| RM della Colonna | B | 99 | 98,0% | 5 | 18,9% |
| | D | 401 | 100,0% | 5 | 76,5% |
| | P | 4 | 100,0% | 4 | 0,8% |
| | 0 | 20 | 100,0% | 6 | 3,8% |
| | Totale | 524 | 99,6% | 5 | 100,0% |
| RM della Colonna senza e con MDC | B | 26 | 53,8% | 11 | 33,8% |
| | D | 19 | 100,0% | 19 | 24,7% |
| | P | 25 | 100,0% | 25 | 32,5% |
| | 0 | 7 | 85,7% | 21 | 9,1% |
| | Totale | 77 | 83,1% | 19 | 100,0% |
| RM Muscoloscheletrica | U | 1 | 100,0% | 1 | 0,2% |
| | B | 86 | 96,5% | 5 | 20,8% |
| | D | 296 | 100,0% | 9 | 71,7% |
| | P | 4 | 100,0% | 5 | 1,0% |
| | 0 | 26 | 100,0% | 7 | 6,3% |

Zona di erogazione - Diagnostic

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|
| | Totale | 413 | 99,3% | 8 | 100,0% |
| RM Muscoloscheletrica senza e con MDC | B | 3 | 100,0% | 5 | 42,9% |
| | D | 2 | 100,0% | 17 | 28,6% |
| | 0 | 2 | 100,0% | 21 | 28,6% |
| | Totale | 7 | 100,0% | 13 | 100,0% |
| Eco(color)dopplergrafia cardiaca | B | 49 | 98,0% | 7 | 15,9% |
| | D | 101 | 57,4% | 67 | 32,7% |
| | P | 5 | 80,0% | 55 | 1,6% |
| | 0 | 154 | 27,3% | 98 | 49,8% |
| | Totale | 309 | 49,2% | 73 | 100,0% |
| Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici | B | 57 | 100,0% | 6 | 22,7% |
| | D | 106 | 97,2% | 8 | 42,2% |
| | P | 24 | 66,7% | 89 | 9,6% |
| | 0 | 64 | 42,2% | 69 | 25,5% |
| | Totale | 251 | 80,9% | 31 | 100,0% |
| Diagnostica ecografica del Capo e del collo | B | 37 | 91,9% | 6 | 3,6% |
| | D | 345 | 89,9% | 11 | 33,8% |
| | P | 34 | 100,0% | 5 | 3,3% |
| | 0 | 605 | 96,0% | 10 | 59,3% |
| | Totale | 1021 | 93,9% | 10 | 100,0% |
| Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo) | B | 160 | 94,4% | 7 | 10,6% |
| | D | 875 | 96,0% | 17 | 57,9% |
| | P | 59 | 100,0% | 13 | 3,9% |
| | 0 | 417 | 95,7% | 17 | 27,6% |
| | Totale | 1511 | 95,9% | 16 | 100,0% |
| Ecografia della Mammella bilaterale | B | 20 | 95,0% | 5 | 24,1% |
| | D | 36 | 100,0% | 4 | 43,4% |
| | P | 9 | 100,0% | 0 | 10,8% |
| | 0 | 18 | 100,0% | 3 | 21,7% |
| | Totale | 83 | 98,8% | 3 | 100,0% |
| Ecografia della Mammella monolaterale | B | 4 | 100,0% | 5 | 33,3% |
| | D | 3 | 100,0% | 5 | 25,0% |
| | 0 | 5 | 100,0% | 4 | 41,7% |
| | Totale | 12 | 100,0% | 5 | 100,0% |
| Ecografia Ostetrica | B | 1 | | 15 | 0,4% |
| | D | 136 | 97,8% | 12 | 50,4% |
| | P | 133 | 100,0% | 12 | 49,3% |
| | Totale | 270 | 98,5% | 12 | 100,0% |
| Ecografia Ginecologica | B | 1 | 100,0% | 0 | 50,0% |
| | D | 1 | 100,0% | 5 | 50,0% |
| | Totale | 2 | 100,0% | 3 | 100,0% |

Zona di erogazione - Diagnostic

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|-----|--------|
| Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa | B | 104 | 49,0% | 11 | 18,4% |
| | D | 335 | 62,4% | 42 | 59,4% |
| | P | 26 | 73,1% | 63 | 4,6% |
| | 0 | 99 | 57,6% | 73 | 17,6% |
| | Totale | 564 | 59,6% | 43 | 100,0% |
| Colonscopia | U | 1 | 100,0% | 0 | 0,3% |
| | B | 69 | 89,9% | 5 | 19,0% |
| | D | 159 | 46,5% | 50 | 43,8% |
| | P | 94 | 96,8% | 9 | 25,9% |
| | 0 | 40 | 75,0% | 28 | 11,0% |
| | Totale | 363 | 71,1% | 29 | 100,0% |
| Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile | D | 1 | | 95 | 50,0% |
| | 0 | 1 | 100,0% | 1 | 50,0% |
| | Totale | 2 | 50,0% | 48 | 100,0% |
| Esofago-gastroduodenoscopia | U | 3 | 100,0% | 0 | 1,0% |
| | B | 71 | 73,2% | 6 | 23,4% |
| | D | 169 | 52,1% | 27 | 55,8% |
| | P | 26 | 100,0% | 13 | 8,6% |
| | 0 | 34 | 82,4% | 15 | 11,2% |
| | Totale | 303 | 65,0% | 19 | 100,0% |
| Elettrocardiogramma | B | 114 | 97,4% | 5 | 12,0% |
| | D | 649 | 90,0% | 19 | 68,2% |
| | P | 35 | 100,0% | 18 | 3,7% |
| | 0 | 154 | 53,9% | 81 | 16,2% |
| | Totale | 952 | 85,4% | 27 | 100,0% |
| Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | B | 21 | 100,0% | 9 | 13,1% |
| | D | 104 | 13,5% | 123 | 65,0% |
| | P | 7 | 100,0% | 9 | 4,4% |
| | 0 | 28 | 25,0% | 75 | 17,5% |
| | Totale | 160 | 30,6% | 95 | 100,0% |
| Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro | D | 50 | 2,0% | 193 | 76,9% |
| | P | 7 | 100,0% | 2 | 10,8% |
| | 0 | 8 | 25,0% | 150 | 12,3% |
| | Totale | 65 | 15,4% | 167 | 100,0% |
| Esame audiometrico tonale | U | 2 | 100,0% | 0 | 1,1% |
| | B | 2 | 100,0% | 0 | 1,1% |
| | D | 171 | 100,0% | 2 | 94,0% |
| | P | 1 | 100,0% | 4 | 0,5% |
| | 0 | 6 | 100,0% | 1 | 3,3% |
| | Totale | 182 | 100,0% | 1 | 100,0% |
| | D | 11 | 100,0% | 0 | 26,8% |

Zona di erogazione - Diagnostic

| | | | | | |
|---------------------------|--------|------|--------|----|--------|
| Spirometria semplice | P | 7 | 100,0% | 0 | 17,1% |
| | O | 23 | 100,0% | 0 | 56,1% |
| | Totale | 41 | 100,0% | 0 | 100,0% |
| Spirometria globale | B | 1 | 100,0% | 0 | 0,7% |
| | D | 43 | 97,7% | 4 | 31,2% |
| | P | 86 | 97,7% | 9 | 62,3% |
| | O | 8 | 100,0% | 1 | 5,8% |
| | Totale | 138 | 97,8% | 7 | 100,0% |
| Esame del fundus oculi | D | 166 | 26,5% | 59 | 64,1% |
| | P | 17 | 100,0% | 53 | 6,6% |
| | O | 76 | 76,3% | 18 | 29,3% |
| | Totale | 259 | 45,9% | 47 | 100,0% |
| Elettromiografia semplice | D | 78 | 34,6% | 99 | 72,2% |
| | O | 30 | 33,3% | 69 | 27,8% |
| | Totale | 108 | 34,3% | 90 | 100,0% |
| Totale | | 9607 | 84,0% | | |

112 - della Versilia

| Prestazioni diagnostica | Priorità | N Prestazioni | % Garanzia tempi attesa I disponibilità | Giorni di attesa I disp | % Priorità |
|------------------------------|----------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------|
| Mammografia bilaterale | B | 15 | 93,3% | 5 | 5,4% |
| | D | 126 | 66,7% | 65 | 45,3% |
| | P | 2 | 100,0% | 10 | 0,7% |
| | O | 135 | 88,9% | 42 | 48,6% |
| | Totale | 278 | 79,1% | 51 | 100,0% |
| Mammografia monolaterale | B | 1 | 100,0% | 0 | 14,3% |
| | D | 4 | 100,0% | 1 | 57,1% |
| | O | 2 | 100,0% | 0 | 28,6% |
| | Totale | 7 | 100,0% | 1 | 100,0% |
| TC delTorace | B | 30 | 50,0% | 12 | 24,8% |
| | D | 56 | 100,0% | 11 | 46,3% |
| | P | 5 | 100,0% | 6 | 4,1% |
| | O | 30 | 100,0% | 8 | 24,8% |
| | Totale | 121 | 87,6% | 10 | 100,0% |
| TC delTorace senza e con MDC | B | 36 | 94,4% | 4 | 22,0% |
| | D | 54 | 100,0% | 6 | 32,9% |
| | P | 17 | 100,0% | 9 | 10,4% |
| | O | 57 | 87,7% | 18 | 34,8% |
| | Totale | 164 | 94,5% | 10 | 100,0% |

Zona di erogazione - Diagnostic

| | | | | | |
|------------------------------------------|--------|-----|--------|----|--------|
| TC dell Addome superiore | D | 1 | 100,0% | 9 | 100,0% |
| | Totale | 1 | 100,0% | 9 | 100,0% |
| TC dell Addome superiore senza e con MDC | D | 4 | 100,0% | 14 | 57,1% |
| | 0 | 3 | 66,7% | 40 | 42,9% |
| | Totale | 7 | 85,7% | 25 | 100,0% |
| TC dell Addome inferiore | B | 1 | 100,0% | 3 | 33,3% |
| | 0 | 2 | 100,0% | 5 | 66,7% |
| | Totale | 3 | 100,0% | 4 | 100,0% |
| TC dell Addome inferiore senza e con MDC | B | 1 | 100,0% | 2 | 14,3% |
| | D | 4 | 100,0% | 7 | 57,1% |
| | 0 | 2 | 100,0% | 0 | 28,6% |
| | Totale | 7 | 100,0% | 4 | 100,0% |
| TC dell Addome completo | U | 1 | 100,0% | 0 | 4,2% |
| | B | 10 | 80,0% | 7 | 41,7% |
| | D | 5 | 100,0% | 3 | 20,8% |
| | P | 3 | 100,0% | 0 | 12,5% |
| | 0 | 5 | 100,0% | 2 | 20,8% |
| | Totale | 24 | 91,7% | 4 | 100,0% |
| TC dell Addome completo senza e con MDC | U | 1 | 100,0% | 0 | 0,5% |
| | B | 55 | 87,3% | 4 | 27,1% |
| | D | 61 | 100,0% | 8 | 30,0% |
| | P | 20 | 100,0% | 18 | 9,9% |
| | 0 | 66 | 81,8% | 26 | 32,5% |
| | Totale | 203 | 90,6% | 14 | 100,0% |
| TC del Capo | U | 1 | 100,0% | 0 | 1,9% |
| | B | 17 | 70,6% | 9 | 32,1% |
| | D | 21 | 100,0% | 9 | 39,6% |
| | P | 4 | 100,0% | 0 | 7,5% |
| | 0 | 10 | 100,0% | 6 | 18,9% |
| | Totale | 53 | 90,6% | 7 | 100,0% |
| TC del Capo senza e con MDC | B | 4 | 100,0% | 4 | 15,4% |
| | D | 14 | 100,0% | 12 | 53,8% |
| | P | 2 | 100,0% | 17 | 7,7% |
| | 0 | 6 | 83,3% | 22 | 23,1% |
| | Totale | 26 | 96,2% | 14 | 100,0% |
| TC del Rachide e dello speco vertebrale | B | 9 | 55,6% | 11 | 28,1% |
| | D | 16 | 100,0% | 6 | 50,0% |
| | 0 | 7 | 100,0% | 6 | 21,9% |
| | Totale | 32 | 87,5% | 8 | 100,0% |
| | D | 2 | 100,0% | 12 | 66,7% |

Zona di erogazione - Diagnostic

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|----|--------|
| TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC | 0 | 1 | 100,0% | 4 | 33,3% |
| | Totale | 3 | 100,0% | 9 | 100,0% |
| TC di Bacino e articolazioni sacroiliache | B | 1 | 100,0% | 9 | 100,0% |
| | Totale | 1 | 100,0% | 9 | 100,0% |
| RM dell Encefalo e del tronco encefalico | B | 20 | 100,0% | 5 | 26,3% |
| | D | 36 | 100,0% | 14 | 47,4% |
| | 0 | 20 | 100,0% | 9 | 26,3% |
| | Totale | 76 | 100,0% | 10 | 100,0% |
| RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC | B | 30 | 83,3% | 8 | 31,3% |
| | D | 36 | 100,0% | 21 | 37,5% |
| | P | 4 | 100,0% | 11 | 4,2% |
| | 0 | 26 | 100,0% | 12 | 27,1% |
| | Totale | 96 | 94,8% | 14 | 100,0% |
| RM di addome inferiore e scavo pelvico | D | 1 | 100,0% | 0 | 33,3% |
| | P | 1 | 100,0% | 0 | 33,3% |
| | 0 | 1 | 100,0% | 0 | 33,3% |
| | Totale | 3 | 100,0% | 0 | 100,0% |
| RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC | B | 5 | 100,0% | 3 | 25,0% |
| | D | 4 | 100,0% | 1 | 20,0% |
| | P | 3 | 100,0% | 0 | 15,0% |
| | 0 | 8 | 100,0% | 0 | 40,0% |
| | Totale | 20 | 100,0% | 1 | 100,0% |
| RM della Colonna | B | 73 | 100,0% | 5 | 24,5% |
| | D | 150 | 98,0% | 14 | 50,3% |
| | P | 15 | 100,0% | 11 | 5,0% |
| | 0 | 60 | 100,0% | 6 | 20,1% |
| | Totale | 298 | 99,0% | 10 | 100,0% |
| RM della Colonna senza e con MDC | B | 8 | 100,0% | 6 | 44,4% |
| | D | 3 | 100,0% | 20 | 16,7% |
| | P | 2 | 100,0% | 0 | 11,1% |
| | 0 | 5 | 100,0% | 9 | 27,8% |
| | Totale | 18 | 100,0% | 9 | 100,0% |
| RM Muscoloscheletrica | B | 57 | 91,2% | 7 | 23,5% |
| | D | 113 | 97,3% | 17 | 46,5% |
| | P | 6 | 100,0% | 11 | 2,5% |
| | 0 | 67 | 98,5% | 10 | 27,6% |
| | Totale | 243 | 96,3% | 13 | 100,0% |
| RM Muscoloscheletrica senza e con MDC | D | 2 | 100,0% | 16 | 50,0% |
| | 0 | 2 | 100,0% | 1 | 50,0% |
| | Totale | 4 | 100,0% | 8 | 100,0% |

Zona di erogazione - Diagnostic

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|----|--------|
| Eco(color)dopplergrafia cardiaca | U | 3 | 100,0% | 0 | 0,3% |
| | B | 60 | 95,0% | 7 | 6,6% |
| | D | 407 | 24,1% | 45 | 44,5% |
| | P | 89 | 86,5% | 68 | 9,7% |
| | 0 | 356 | 49,4% | 56 | 38,9% |
| | Totale | 915 | 44,9% | 49 | 100,0% |
| Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici | B | 13 | 100,0% | 8 | 6,9% |
| | D | 104 | 49,0% | 57 | 55,0% |
| | P | 14 | 92,9% | 96 | 7,4% |
| | 0 | 58 | 79,3% | 26 | 30,7% |
| | Totale | 189 | 65,1% | 47 | 100,0% |
| Diagnostica ecografica del Capo e del collo | B | 21 | 66,7% | 10 | 5,8% |
| | D | 135 | 75,6% | 34 | 37,5% |
| | P | 16 | 81,3% | 40 | 4,4% |
| | 0 | 188 | 76,6% | 38 | 52,2% |
| | Totale | 360 | 75,8% | 35 | 100,0% |
| Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo) | B | 104 | 42,3% | 15 | 12,4% |
| | D | 416 | 77,6% | 24 | 49,6% |
| | P | 39 | 97,4% | 25 | 4,7% |
| | 0 | 279 | 92,5% | 16 | 33,3% |
| | Totale | 838 | 79,1% | 20 | 100,0% |
| Ecografia della Mammella bilaterale | U | 1 | 100,0% | 0 | 0,5% |
| | B | 22 | 59,1% | 13 | 10,7% |
| | D | 20 | 70,0% | 19 | 9,8% |
| | P | 3 | 100,0% | 3 | 1,5% |
| | 0 | 159 | 99,4% | 3 | 77,6% |
| | Totale | 205 | 92,2% | 6 | 100,0% |
| Ecografia della Mammella monolaterale | 0 | 2 | 100,0% | 0 | 100,0% |
| | Totale | 2 | 100,0% | 0 | 100,0% |
| Ecografia Ostetrica | D | 67 | 100,0% | 2 | 31,6% |
| | P | 132 | 100,0% | 2 | 62,3% |
| | 0 | 13 | 100,0% | 3 | 6,1% |
| | Totale | 212 | 100,0% | 2 | 100,0% |
| Ecografia Ginecologica | B | 3 | 100,0% | 6 | 10,7% |
| | D | 20 | 60,0% | 89 | 71,4% |
| | P | 3 | 100,0% | 12 | 10,7% |
| | 0 | 2 | 50,0% | 23 | 7,1% |
| | Totale | 28 | 67,9% | 67 | 100,0% |
| Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, | B | 57 | 94,7% | 8 | 21,0% |
| | D | 131 | 54,2% | 62 | 48,3% |
| | P | 23 | 78,3% | 93 | 8,5% |

Zona di erogazione - Diagnostic

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|--------|------|--------|-----|--------|
| fetoplacentare arteriosa o venosa | 0 | 60 | 75,0% | 38 | 22,1% |
| | Totale | 271 | 69,4% | 48 | 100,0% |
| Colonscopia | B | 65 | 81,5% | 12 | 39,2% |
| | D | 60 | 21,7% | 113 | 36,1% |
| | P | 1 | | 150 | 0,6% |
| | 0 | 40 | 82,5% | 34 | 24,1% |
| | Totale | 166 | 59,6% | 55 | 100,0% |
| Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile | B | 1 | | 20 | 100,0% |
| | Totale | 1 | | 20 | 100,0% |
| Esofago-gastroduodenoscopia | B | 36 | 100,0% | 7 | 26,7% |
| | D | 72 | 37,5% | 90 | 53,3% |
| | 0 | 27 | 85,2% | 26 | 20,0% |
| | Totale | 135 | 63,7% | 55 | 100,0% |
| Elettrocardiogramma | U | 4 | 100,0% | 0 | 0,3% |
| | B | 106 | 95,3% | 4 | 6,9% |
| | D | 688 | 69,9% | 23 | 44,9% |
| | P | 93 | 88,2% | 54 | 6,1% |
| | 0 | 640 | 75,9% | 30 | 41,8% |
| | Totale | 1531 | 75,4% | 26 | 100,0% |
| Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | B | 10 | | 25 | 8,5% |
| | D | 63 | 15,9% | 66 | 53,4% |
| | P | 8 | 75,0% | 90 | 6,8% |
| | 0 | 37 | 45,9% | 65 | 31,4% |
| | Totale | 118 | 28,0% | 64 | 100,0% |
| Esame audiometrico tonale | B | 12 | 58,3% | 9 | 9,0% |
| | D | 60 | 51,7% | 55 | 44,8% |
| | P | 18 | 11,1% | 190 | 13,4% |
| | 0 | 44 | 36,4% | 75 | 32,8% |
| | Totale | 134 | 41,8% | 75 | 100,0% |
| Spirometria semplice | B | 14 | 28,6% | 21 | 6,0% |
| | D | 168 | 42,9% | 64 | 71,5% |
| | P | 9 | 100,0% | 65 | 3,8% |
| | 0 | 44 | 45,5% | 60 | 18,7% |
| | Totale | 235 | 44,7% | 61 | 100,0% |
| Spirometria globale | B | 2 | 50,0% | 14 | 1,9% |
| | D | 48 | 27,1% | 75 | 45,3% |
| | P | 6 | 100,0% | 68 | 5,7% |
| | 0 | 50 | 30,0% | 72 | 47,2% |
| | Totale | 106 | 33,0% | 72 | 100,0% |
| | B | 2 | 50,0% | 10 | 4,1% |
| | D | 22 | 77,3% | 44 | 44,9% |

Zona di erogazione - Diagnostic

| | | | | | |
|---------------------------|--------|------|--------|----|--------|
| Esame del fundus oculi | P | 2 | 100,0% | 6 | 4,1% |
| | 0 | 23 | 43,5% | 40 | 46,9% |
| | Totale | 49 | 61,2% | 40 | 100,0% |
| Elettromiografia semplice | B | 2 | 50,0% | 16 | 1,0% |
| | D | 151 | 53,0% | 58 | 73,3% |
| | 0 | 53 | 79,2% | 44 | 25,7% |
| | Totale | 206 | 59,7% | 54 | 100,0% |
| Totale | | 7389 | 72,5% | | |