

Checklist caso sospetto COVID-19)
 All. n. 3
Rev. 3
del 17/02/2022

Criteri di individuazione dei pazienti con sospetto di malattia infettiva da nuovo coronavirus (COVID-19)

CRITERI CLINICI	SI	NO
Presenza di almeno uno dei seguenti sintomi: tosse, febbre, dispnea, esordio acuto di anosmia, ageusia o disgeusia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altri sintomi meno specifici: cefalea, brividi, mialgia, astenia, vomito e/o diarrea	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CRITERI RADIOLOGICI	SI	NO
Quadro radiologico compatibile con COVID-19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CRITERI DI LABORATORIO	SI	NO
Tampone antigenico o molecolare positivo negli ultimi 10 giorni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CRITERI EPIDEMIOLOGICI	SI	NO
di essere residente/operatore in contesti sanitari e socioassistenziali/sociosanitari) in cui vi sia trasmissione di SARS-CoV-2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
contatto stretto* con un caso confermato di infezione da COVID-19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Classificazione dei casi

- ☐ **A. Caso possibile:** una persona che soddisfi i criteri clinici.
- ☐ **B. Caso probabile:** una persona che soddisfi i criteri clinici con un link epidemiologico, OPPURE una persona che soddisfi i criteri radiologici.
- ☐ **C. Caso confermato:** una persona che soddisfi il criterio di laboratorio.

Dati del paziente:

Nome e cognome paziente: _____

Data di nascita: __/__/____

Nome e cognome operatore sanitario: _____

Firma _____ Data di compilazione __/__/____

NB: la checklist compilata va conservata all'interno della documentazione clinica

Checklist caso sospetto COVID-19)

All. n. 3
Rev. 3
del 17/02/2022

*** Contatto stretto ad alto rischio è una persona che**

- è un operatore sanitario o di interesse sanitario che fornisce assistenza a un caso di Covid-19, oppure tecnici di laboratorio che trattano campioni ottenuti da un caso di Covid-19, **senza indossare i dispositivi di protezione individuale previsti dal DVR o qualora tali dispositivi siano stati compromessi;**
- si è trovata faccia a faccia con un caso di Covid-19 a una **distanza < a 1,5 metri per un tempo > 15 minuti;**
- ha avuto un contatto fisico con un caso di Covid-19 (es.: convivente)
- ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni infettive di un caso di Covid-19 (ad esempio, le ha tossito addosso);
- ha condiviso un ambiente chiuso (per esempio abitazione, aula scolastica, sala riunioni, sala d'attesa ospedaliera e così via) con un caso di Covid-19 per **per un tempo > 15 minuti.**

Nel caso di:

Identificazione in contesto domiciliare o extra-ospedaliero

Se le condizioni del paziente NON richiedono il ricovero, è gestito a domicilio come indicato nel protocollo nella sezione della gestione territoriale

Se le condizioni del paziente richiedono il ricovero, si chiama il 118 per decidere la destinazione del paziente come indicato nel protocollo nella sezione della gestione emergenza territoriale

Identificazione in contesto ospedaliero

Se il paziente è individuato al PS o in contesto ospedaliero, si procede alla gestione dello stesso come indicato nella sezione del protocollo relativa alla gestione ospedaliera

Nell'ambito dell'assistenza primaria o nel pronto soccorso ospedaliero, tutti i pazienti con sintomatologia di infezione respiratoria acuta devono essere considerati caso possibile se in quell'area o nel Paese è stata segnalata trasmissione locale.