



INFORMAZIONI SUL PERCORSO DI INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA-URDU

رزاکا بنار طور پر لفظ حمل کے بارے میں موعیات۔

Dal 1978, in base alla legge 194, ogni donna ha la possibilità di richiedere l'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) entro i primi 90 giorni di gestazione per motivi di salute, familiari, sociali, economici. L'IVG avviene all'interno delle strutture sanitarie pubbliche, la richiesta di interruzione di gravidanza deve essere firmata dalla donna richiedente e dal medico che effettua consulenza e visita medica. Il percorso è gratuito

1978 سے 194 کے مطابق ہر عورت کو صحت، خاندانی، معاشی و اجتماعی وجوہات کی بناء پر حمل کے ابتدائی 90 دن کے اندر رضاکارانہ طور پر لفظ حمل (یا وجہ کی درخواست کا موقع ملا ہے) ای و وجہ صحت عمارت کی سہولیات کے اندر ہوتا ہے، حمل کے ختم ہونے کی درخواست پر حاملہ عورت کے معاشی و اجتماعی مسائل کو لا ٹکنر کے معاشی و اجتماعی مسائل کو لا ضروری ہے، یہ سارا عمل ختم ہوگا۔

Dopo i 90 giorni di gestazione la valutazione di un'eventuale interruzione di gravidanza avviene in caso di gravi compromissioni dello stato di salute della madre o del feto, sempre da parte di personale medico.

صرف وار صرف ماں یا باپ کے کسی صحت کی سنگین خرابی کی صورت میں کیا جائے گا وہ
مح 90 ندرے کدعب طاقسا مح
ل
ہی طبی المہ وار کاٹر کے طور پر ذریعہ سے۔

In caso di richiesta di IVG da parte di minori è necessaria l'autorizzazione di entrambi i genitori aventi la potestà genitoriale, nel caso in cui manca il consenso genitoriale la situazione viene sottoposta al giudice tutelare attraverso una relazione dei Servizi.

ایلاغ عورتوں کے لفظ حمل کی درخواست میں سرپرست لائسنس کی طرف سے اجازت نامہ ضروری ہے۔ اجازت نامہ لہے کی صورت میں سرپرست لادعت جج کے پاس پیش کی جائے گی۔

Come si accede al percorso dell'Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG) ?

Puoi rivolgerti al Consultorio, preferibilmente della tua Zona di residenza, dove riceverai accoglienza, informazioni sul percorso, counselling e verrà fissato un appuntamento con il Ginecologo che ti fornirà tutte le informazioni necessarie sulle metodiche di esecuzione dell'IVG e rilascerà un documento dove si prende atto sia del tuo stato di gravidanza che della tua volontà di interromperla. Se hai tra 14 e 24 anni rivolgiti al Consultorio Giovani, uno spazio dedicato a questa fascia d'età attivo in tutte le Zone.

رضکارانہ لفظ حمل کو کسے کوا جاسکتا ہے؟

آپ نرجی ہیاد پر لی ہر ہلکی علقے کے لکے سے رابطہ کر سکتے ہیں، جہاں آپ کا خرچہ منکوا جائے گا، مہمات نراہم کی جائیں گی، اور توار ناغون کوا جائے گا مزید امراض و سوا کے ٹکنر سے ہولڈنٹ لکے مقلات کروائی جائے گی جو آپ کو

ای ووجی کے سارے موجدہ طریقے وار ان سے مقلع ساری ضروری ملو امت نرام کرے گی وار لکو لک ہٹاؤنز جاری کرے گی جس مل آپ کے حمل کی لاحت وار لکی حمل خم کرن کے خواش درج ہوگی گر لکی عمر 14 سے 24 کے درملان ہے نو براہ مریلی نو کوئی رنگ سٹڈر سے ر بلطہ کریں۔ یہ جگہ خاص وطر پر اس عمر کے لگوں کے لیے بنائی گی ہے وار امت عملوں مل سرگرم ہے

Il Consultorio garantisce anche colloqui e consulenza per rimuovere eventuali cause che portano alla decisione di ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza e fornisce assistenza psicologica e sociale e, su richiesta, informazioni su associazioni di volontariato.

رضاکار لہ لقطا حمل کرن کے درخولرت کے بدلکن کی ادمذری ہوئی ہے کہ وہ رضاکار لہ لمج ہون کی مدد سے لٹرو و اور مل اورت کے ذریعے مل غرنی وار لٹری مل مدد نرام کرے وج طاقسا لمح کی وجوہات سے مقلع ملو امت حاصل کرے ان کو ممکن حد تک ودر کرن کے کویش کرے۔

Viene assicurato anche il collegamento con i reparti ospedalieri e gli ambulatori di riferimento per l'effettuazione dell'IVG.

Visti i limiti temporali per l'effettuazione dell'IVG e sulla scelta della metodica, è importante non ritardare nel rivolgersi al Consultorio per avere il tempo necessario di prendere la decisione con calma e la possibilità di accedere all'IVG farmacologica

ای ووجی کے لیے ہٹال کے مچملوں وار ریریس لکن کے سے بلیر بلطہ ہٹنی بنائی گیا ہے

ای ووجی/ لقطا حمل کرن کے کانہلہ کرن وار طریقہ کار کے لٹخاب کے لیے مہرہ مدت کے پیش ظنر ہ بہت ضروری ہے کہ لکن کے سے ر بلطہ کرن مل ہر نہ موناکہ ساری کارو لی کے بعد ولزازی لمر ملاوچل حمل ضلع کے مراحل قوت پر لجام ہو سکیں۔

Cosa devo portare per il rilascio del documento/certificato?

- Test di gravidanza refertato di laboratorio sulle urine oppure esame del sangue che misura il dosaggio delle Beta HCG (ormone della gravidanza)
- Documento di riconoscimento in corso di validità
- per i Cittadini Italiani e Stranieri iscritti al SSN: tessera sanitaria in corso di validità
- per i Cittadini Stranieri non iscritti al SSN, appartenenti all'Unione Europea o a Paesi Convenzionati: valgono le norme previste dai reciproci Accordi
- per i Cittadini Extracomunitari non in regola con il visto ed il soggiorno, privi di risorse economiche: documento STP

سٹاؤنز مل رٹیکوٹ جاری کرن کے لیے مچملے کوا لیا ہے؟

- لہارٹری سے پیشاب یا خون کی ج لچ کی رپورٹ جو بیٹا لچ سی جی (حمل وار مون) کی ملور کو ملہا ہو۔
- شناخت کی لک درست ہٹاؤنز

In qualsiasi momento del percorso puoi richiedere consulenza psicologica e sociale

ہم حمل ضائع کرنے کی سرجری / عمل درآمد کب کروا سکتے ہیں؟

افزونہ ایک مطابق ہسپتال کے جاری ہونے والے حمل کے ختم ہونے کے بعد عمل درآمد ہونے کے سات دن کے اندر ضروری ہونا ہے۔ ان دنوں میں کئی بھی قوت و بارہ ہفتوں پر غور کرنا چاہیے۔

ہسپتال یا لائی نولمی ٹکنٹر کے طور پر وار ملنے سے بھی جاری کروا سکتے ہیں۔
پا لائی ہسپتال کے کسی بھی وار لکھ کر

ان 7 دنوں میں آپ لطمہ بہ ہسپتال یا لائی ہسپتال کے ای وو جی کلینک میں سرجری کے دن کا شیڈول طے کرنے کے لیے ہسپتال آجنا اور رابطہ کرنا ضروری ہے۔ ڈکٹر لکھنیل شمس کرے گا وار تمام ضروری حلوامت و توضاحت فراہم کرے گا۔ وار نحریری رضامندی حاصل کرے گا۔ اگر حمل ختم ہونے سے پہلے وار لکھی شہاد پر حمل کے طے کیا جائے گا۔ آپ کئی بھی قوت اس سارے عمل کے دوران لکھی وار سماجی م دیکھی درخواست کر سکتے ہیں۔

In che modo posso interrompere la gravidanza?

La gravidanza può essere interrotta con due metodiche:

- aborto chirurgico
- aborto farmacologico

Hai facoltà di scegliere la metodica che preferisci se non sussistono controindicazioni mediche al metodo scelto e se rientri nei tempi previsti.

ہم حمل کس سے ختم کر سکتے ہیں؟

محمل و د طریقوں سے ختم کیا جا سکتا ہے۔

• سرجیکل طریقہ حمل

• یزاساود طاقسا لمح

اگر آپ کے منتخب کردہ طریقہ کار سے کوئی صحت کا خطرہ نہیں ہے وار اگر طریقہ حمل کے لیے دی گئی مدت کے مطابق ہوتا ہے تو آپ کو وہ طریقہ منتخب کرنے کا حق ہے جو آپ پسند کرتے ہو۔

Come avviene l'aborto farmacologico?

Potrai scegliere la via farmacologica se la tua gravidanza è inferiore a 63gg (9 settimane) dall'ultima mestruazione e se non ci sono controindicazioni all'uso dei farmaci previsti. È un procedimento che avviene a livello ambulatoriale in due fasi. Nella prima si assume un farmaco (Mifepristone, meglio noto con il nome di Ru486) che interrompe la gravidanza. Successivamente, per la precisione dopo 48 ore, si passa al secondo farmaco, un analogo delle prostaglandine, che facilita il distacco e l'espulsione del prodotto del concepimento. La sintomatologia sarà assimilabile a quella di un aborto spontaneo nelle fasi iniziali di gravidanza. Rimarrai sotto osservazione per alcune ore e, prima di tornare a casa, ti saranno fornite tutte le informazioni e i riferimenti necessari.

Dopo circa due settimane dalla seconda somministrazione è necessario effettuare una visita con ecografia di controllo

per verificare l'avvenuto aborto ed escludere la necessità di ulteriori trattamenti.

دواسزی لوقاط حمل کیسے ہوتا ہے؟

رگا پاک لمح یرخا یراوبام سے 63 دن (9 سہوں) سے کم ہے وار گرنج ویز کردہ دولیوں کے لینعامل سے کوئی نقصان یا
ہلکاہ زوں سے منو آپ دولیازی لوقاط حمل کا انتخاب کریں گی۔ یہ ود مرحلہ میں وٹاٹ پٹ عمل - یہ پہلے میں ایک دولی
ام (پریگنٹون) سے رو 486 کے نام سے جلا جاتا ہے (یہ لقا جاتا ہے جو حمل میں رکاوٹ ڈالتا - یہ اس کے عن 48 گھنٹوں کے
بعد ود سری دوالی (اچھی ہے ،) لک پروسیڈنگ لکٹریکے (گلان) ، جو حمل کی لایوار کو ختم کرنا ہے واریس لکٹلے میں
سمیت نرام کرنا - یہ حمل کے ابتدائی مراحل میں عاملت اچلک لوقاط حمل کی طرح ہی ہوں گی۔ آپ کچھ گھنٹوں تک شادہ
کریں گے وار گھر وپس آئے سے پہلے آپ کو نام ضروری مغمومت وار حوالہ جات نرام کیے جائیں گے۔
ٹوریا ود سہوں کے بعد ، لوقاط حمل کی تصدیق کرنے کے لیے لک ضروری چیک اپ لارل اور ڈکھا جئے گا جس میں اوضوح ہوگا
کہ لوقاط حمل ہو چکا ہے یا مزید جلاع کی ضرورت - یہ

Come avviene l'aborto chirurgico?

L'intervento medico-chirurgico comporta un ricovero in day hospital. Si entra la mattina presto e si viene dimesso nel pomeriggio dello stesso giorno, salvo complicazioni. L'intervento, effettuato in anestesia, avviene in sala operatoria. Contestualmente all'intervento potrai gratuitamente avere, se lo richiedi, per la contraccezione, l'inserimento della spirale o dell'impianto sottocutaneo.

Dopo circa 20 giorni dall'intervento dovrai ripetere un test di gravidanza di laboratorio.

سرجیکل لوقاط حمل کیسے ہوتا ہے؟

سرجیکل لوقاط حمل میں لک دن کے لیٹال میں اندر شامل ہے - آپ صبح سویرے داخل ہو جائے وں گر کوئی پیچیدگی نہ ہو تو
لری دن کی سہ پہر میں آپ کو چھٹی سے دی جائے گی۔ آپریشن آپریٹنگ روم میں اینسٹھیوایک سسٹم کا جلا ہے آپریشن کے سلسلہ
ہی آپ کی درخواست پر منع حمل کے لیے لیورالے یا ایڈاواکازو میں کپسول (ختم کھواسکتے ہیں۔
سرجری کے ٹوریا 20 دن بعد آپ کو لیارٹری حمل کی جلاچ پٹال (کروٹا ہوگی۔

Posso interrompere la gravidanza dopo il terzo mese ?

L'interruzione di gravidanza dopo i primi 90 giorni dalla data del concepimento è possibile solo quando "la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna" o, nei limiti previsti dall'art 7 della L194/78, quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni fetali, "che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna". Il Ginecologo del presidio dove viene effettuata l'IVG potrà avvalersi per la documentazione e la certificazione della collaborazione di specialisti.

کوا ہیں تیسرے مہینے کے بعد حمل ختم کرسکتی ہ نو؟

احلم ہ ہونے کی تاریخ سے پہلے 90 دن کے بعد حمل کا ختم ہ لہی قوت مکن ے جب حمل یا لاوت سے عورت کی زندگی کو شدید خطرہ لاحق ہوا ے یا "ریٹل 7 کے 194 78/ے کذ رئے قائم کردہ حدود میں جس میں معلوم شدہ /نصیق شدہ یا مریوں کا عمل ہوش مول چھن کی خرابی یا لہی خرابی جو عورت کی چھن کی ذوی صحت کے لئے سنگین خطرہ ہوا شامل ے۔ ای وو جی کی ٹونٹ کی مہر امراض ہواں طبی ہناویزات کا مہرہ کرے کوا ر مہرین کی ہواورت ک سلسلہ لفظ حمل کا سرٹیکوٹ ہا سکتی ے وار کر بھی سکتی ے۔

Cosa fare dopo l'Interruzione Volontaria di Gravidanza?

Dopo l'IVG dovrai effettuare i controlli che ti saranno programmati dal Ginecologo.

Al Consultorio, oltre al controllo ginecologico, potrai usufruire della consulenza psicologica e di attivazione di interventi di sostegno contattando il Servizio.

È importante inoltre, per ridurre il rischio di gravidanze indesiderate, pianificare e iniziare subito la contraccezione che nei due anni successivi all'IVG è gratuita per le donne iscritte al SSN, residenti o domiciliate in Toscana, o in possesso di codice STP (Stranieri Temporaneamente Presenti) e per le studentesse fino ai 25 anni di età iscritte alle Università toscane. Il counselling contraccettivo e l'avvio della contraccezione viene garantito già dai Reparti e dagli Ambulatori dove viene effettuata l'IVG. Per proseguirla potrai essere successivamente seguita dal Consultorio.

رضکار لہ لفظ حمل کے بعد کوا کریں؟

ای وو جی کے بعد لہو مہر امراض ہواں جو آپ کے لئے ہرر ہوں گے لکن چھ کرول ہڑے گا ۔

لکن کھویرلہو ہواں میں امراض ہواں کی ج لچ کے علاوہ آپ کی خدمت کے لئے لہو ہواں اور مہرین ہواں کے لئے لوگ موجود ے۔ آپ ان سے رابطہ کر کہ نفاذہ لہا سکتے ے۔

ہبھی ضروری ے کہ ہرر ہواں حمل کے خطرے کو کم کرنے کے لئے وار ہرر ہواں کی کرن کے لئے لفظ حمل / یا وو جی

یک نورابہد و ہرلوں کے لئے مہر حمل کا لہاظم کوا جئے جو کہ لہس لہس لہس لہس رچہرڈ ہویرکل ایک شہری وار ہلہی ، عارضی رہلش ہرر غر لہی جن کے پاس لہس ٹی ہرر ہواں ے وار 25 سال سے کم عمر طلبات جو ہویرکل کی ہویررہووں میں ہڑہی ہوں کے لئے لکل ہت ے۔ ای وو جی لکھس میں مہر حمل کے ہرر وار مہر حمل کے آغاز کو ہلہی ہواں گوا ے روا۔ وکسا ہراج ے نہ کر کے ہل آپ کے سلسلہ ہواں ہواں ہواں عمل جاری رہے۔ اگ